



Z. P. METCALF  
PROPERTY OF



LIBRARY OF  
*Dr Z P Metcalf*  
1885-1956



IOH. CHRIST. FABRICII

HIST. NAT. OECON. ET CAMERAL. P. P. O. SOC. HAFN.  
NORW. LVND. PETROP. OECON. ET PARIS.  
AGVLT. MEMBR.


MANTISSA  
INSECTORVM

SISTENS

SPECIES NVPER DETECTAS

A D I E C T I S

SYNONYMIS, OBSERVATIONIBVS, DESCRIPTIONIBVS,  
EMENDATIONIBVS.




---

T O M. II.

---

H A F N I A E,

IMPENSIS CHRIST. GOTTL. PROFT,  
MDCCIXXXVII.





## CLASSIS VI.

### G L O S S A T A.

147. PAPILIO. *Palpi duo reflexi.*

*Lingua spiralis exserta.*

*Antennae extrorsum crassiores.*

\* *Equites Troes.*

1. P. E. T. alis caudatis nigris: posticis macula cyanea *Papilio*: ocelloque purpureo subtus lunulis septem.  
Iablonsk. Pap. 2. tab. 14. fig. 1. 2.
2. P. E. T. alis caudatis subconcoloribus nigris: posticis *Bianor*. lunulis quinque rufis.
3. P. E. T. alis caudatis nigris: posticis macula alba lunulae duplice purpurea.  
*Papilio Seuerus* Cram. Inf. 24. tab. 277. fig. A. B. C.  
tab. 278. fig. A. B.  
Iablonsk. Pap. 2. tab. 14. fig. 4.
4. P. E. T. alis caudatis concoloribus fuscis: posticis lunulis nouem rubris albo punctatis.  
Iablonsk. Pap. 2. tab. 14. fig. 3.
5. P. E. T. alis caudatis concoloribus nigris: posticis macula quintuplici alba lunulisque rubris, corpore nigro.  
Cram. Inf. 23. tab. 265. fig. A. B. C.  
Iablonsk. Pap. 2. tab. 15. fig. 2.
6. P. E. T. alis caudatis concoloribus nigris: anticis fascia *Hector*. alba, posticis maculis rubris.  
Iablonsk. Pap. 2. tab. 13. fig. 2.

2 CLAS. VI. GLOSSATA. Papilio.

*Ascanius.* 7. P. E. T. alis caudatis concoloribus atris: fascia communis alba; posticarum rubro nebulosa

*Antenor.* 8. P. E. T. alis caudatis concoloribus atris albo maculatis: posticis lunulis marginalibus rubris.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 13. fig. 1.

*Troilus.* 9. P. E. T. alis caudatis nigris: anticis punctis marginalibus pallidis, posticis supra pallido subtus fulvo maculatis.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 17. fig. 3. 4.

Habitat in America boreali.

*Palinurus.* 10. P. E. T. alis caudatis nigris atomis viridi aureis: fascia communis coeruleo viridi.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

*Medius.* Corpus atomis viridi aureis nitentibus. Antennae nigrae. Alae atrae atomis numerosissimis viridibus. Fascia lata communis, continua, viridi coerulea. Subtus omnes nigrae atomis albis, anticae apice cinereae, postice maculis marginalibus subocellaribus fuluis.

*Deiphobus.* 11. P. E. T. alis caudatis nigris: subtus basi rubro maculatis, posticis maculis septem rubris subannularibus.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 18. fig. 2. 3.

*Pelaus.* 12. P. E. T. alis caudatis atris: anticis fascia, posticis lunulis marginalibus albis punctisque duobus rubris.

*Asterias.* 13. P. E. T. alis caudatis atris: fasciis duabus macularibus flavis, angulo ani fulvo: punto atro.

*Papilio Polyxenes* Sp. Inf. 2. 4. 13.

*Papilio Asterias* Cram. Inf. 35. tab. 385. fig. C. D.

Clerk. Icon. tab. 33. fig. 5. 6.

Drury Inf. 1. tab. 11. fig. 2.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 18. fig. 1.

*Phorbas.* 14. P. E. T. alis caudatis nigris coeruleo maculatis: posticarum fascia interrupta subtus alba.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 12. fig. 3.

*Philenor.* 15. P. E. T. alis caudatis nigris: posticis virescenti nitidis, subtus maculis septem rubris subocellaribus.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 12. fig. 2. 3.

16. P. E. T. alis caudatis concoloribus nigris margin'e ma- *Pammon*  
culatis: posticis maculis septem albis.  
Iablonsk. Pap. 2. tab. 19. fig. 4.  
Inuenitur rarius ecaudatus.
17. P. E. T. alis caudatis nigris: fascia communi alba, po- *Afius.*  
sticis subtus basi apiceque rubro maculatis.
18. P. E. T. alis caudatis concoloribus nebulosis: anticis *Glaucus.*  
macula fiaua, posticis macula ani fulua.  
Iabl. Pap. 2. tab. 17. fig. 1. 2.
19. P. E. T. alis caudatis subconcoloribus nigris basi rufis, *Achates.*  
posticis macula octuplici alba.  
Iablonsk. Pap. 2. tab. 15. fig. 1.
- β. *Papilio Alphenor* alis caudatis concoloribus fuscis  
basi atris: maculis anticarum rufa, posticarum albis  
Sp. Inf. 2. 4. II.
- Papilio Alcenor* Cram. Inf. 14. tab. 166. fig. A.  
Iabl. Pap. 2. tab. 16. fig. 1.  
β. Vix distinctus videtur.
20. P. E. T. alis caudatis atris: anticis striga alba, posti- *Lysander.*  
cis macula media alba lunulisque rubris.
21. P. E. T. alis caudatis concoloribus nigris: posticis ma- *Polydo-*  
cula alba futuris sexfida lunulisque septem rubris. *russ.*  
Iabl. Pap. 2. tab. 15. fig. 3.
22. P. E. T. alis denticulatis holosericeis: anticis supra vi- *Priamus.*  
ridibus; macula atra, posticis maculis sex nigris.  
Iabl. Pap. 1. tab. L fig. 1. 2.
23. P. E. T. alis dentatis concoloribus nigris: anticis ma- *Ampiri-*  
culis, posticis disco flauis. *sius.*  
*Papilio Amphiensis* Cram. Inf. 19. tab. 219. fig. A.  
Iabl. Pap. I. tab. 1. fig. 3.  
Habitat in India orientali.  
Maculae alae anticae radiatae. Punctum nigrum ad au-  
gulum ani. Affinis videtur P. Astenoo.
24. P. E. T. alis dentatis subconcoloribus nigris: posticis *Remus.*  
vtrinque maculis flauis marginalibus.  
*Papilio Antenor* Jaqu. Misc. Austr. 2. tab. 23. fig. 4.  
Iabl. Pap. I. tab. 2. fig. 1. 2.  
tab. 3. fig. 1.

*Conf. Papilio Panthous* mas Clerk. Icon. tab. 18.  
*vti et Papilio Remus* Cram. Inf. 12. tab. 135. fig. A.  
tab. 136. fig. A. vix  
differunt.

*Meninon.* 25. P.E.T. alis dentatis omnibus subtus basi rubro no-  
tatis.

Iabl. Pap. 1. tab. 6. fig. 2. 3.

*Protenor.* 26. P.E.T. alis dentatis nigris: posticis subtus macula dif-  
formi rubra anguli ani.

Iabl. Pap. 2. tab. 7. fig. 1. 2.

*Agenor.* 27. P.E.T. alis dentatis nigris basi sanguineis: posticis  
disco albo; maculis nigris.

Iabl. Pap. 1. tab. 8. fig. 3.

*Anchises.* 28. P.E.T. alis dentatis concoloribus nigris: posticis ma-  
culis septem coccineo ouatis.

Cram. Inf. 27. tab. 318. fig. A. B. C. D.

Iabl. Pap. 2. tab. 9. fig. 1. 2. 3.

*Aftyanax.* 29. P.E.T. alis dentatis nigris: posticis limbo coerule-  
scente; fascia nigra, subtus fuluo maculatis.

*Sarpedon.* 30. P.E.T. alis dentatis fuscis fascia viridi, posticis subtus  
linea baseos maculisque quinque rubris.

Iabl. Pap. 2. tab. 10 fig. 4. 5.

Roel. Inf. 4. tab. 6. fig. 1.

*Polyda-* 31. P.E.T. alis dentatis nigro aeneis: fascia maculari fla-  
mas. ua, posticis subtus lunulis fluxuosis rubris.

Iabl. Pap. 2. tab. 10. fig. 6. 7.

*Andro-* 32. P.E.T. alis dentatis nigro aeneis: posticis subtus lu-  
geus. nulis rubris cyaneis flauisque.

*Papilio Androgeus* Cram. Inf. 29. tab. 350. fig. A. B.

Iabl. Pap. 2. tab. 11. fig. 2. 3.

*Peran-* 33. P.E.T. alis dentato caudatis nigris supra basi viridibus  
 thus. | subtus apice pallidis: posticis lunulis septem fuluis.

Habitat in Cochin China Mus. Dom. Banks.

*Medius.* Antennae nigrae. Corpus supra viride nitidum ore albo. Alae omnes supra basi virides, nitidae apice nigrae maculis obsoletis viridibus. Sinus marginales albidi. Subtus basi nigrae atomis numerosis flavis, apice pallidae et ante hanc apicem in anticis lunula magna pallida et in posticis lunulae se-  
ptem

ptem fuluae, quarum exterior linea media alba, re-  
liquae lunula opposita coerulea.

34. P. E. T. alis dentatis concoloribus fuscis: anticis albo *Amphi-*  
*radiatis*, posticis macula quinquefida rubra lunulis-*medon.*  
que albis.

Iabl. Pap. 1. tab. 4. fig. 1.

35. P. E. T. alis dentatis nigris: anticis supra macula vi-*Aeneas.*  
ridi, posticis macula palmata sanguinea.

Iabl. Pap. 2. tab. 9. fig. 5. 6.

36. P. E. T. alis dentatis virescentibus; posticis margine *Belus.*  
interiori pallido, subtus fuscis: lunulis rubris.

Iabl. Pap. 2. tab. 11. fig. 1.

37. P. E. T. alis dentatis concoloribus nigris: posticis ma.*Pompe-*  
culis sanguineis. *ius.*

*Papilio Panthonus* Cram. Ins. 24. tab. 278. fig. C, D.

Habitat Surinami.

Medius statura P. Aeneae. Thorax et pectus sangu-  
neo maculata. Alae omnes concolores, nigrae, an-  
ticeae immaculatae, posticae striga e maculis sex fan-  
guineis. Margo posticus inter dentes sanguineo ma-  
culatus.

38. P. E. T. alis dentatis subconcoloribus nigris: posticis *Polymne-*  
disco coerulecentibus nigro maculatis. *stor.*

Iabl. Pap. 2. tab. 7. fig. 3. 4.

39. P. E. T. alis dentatis concoloribus nigris: anticis albo *Panthous*  
maculatis, posticis maculis albis nigro foetis.

Iabl. Pap. 1. tab. 5. fig. 1. 2.

40. P. E. T. alis subdentatis concoloribus nigricantibus al-*Panda-*  
bo maculatis, posticis flauis: ocellis septem nigris. *russ.*

41. P. E. T. alis dentatis concoloribus nigris: anticis ma-*Astenous.*  
cula radiata alba, posticis disco flauo.

Iabl. Pap. 1. tab. 2. fig. 3.

42. P. E. T. alis dentatis concoloribus atris: posticis disco *Helena.*  
communi aurato.

Iabl. Pap. 1. tab. 3. fig. 2.

Habitat et in India orientali Mus. Dom. Banks.

In specimine Indiae Orientalis maculae aliquot atrae in  
disco aureo.

\*\* *Equites Archiui.*

*Rhipheus.* 43. P. E. A. alis sexdentato caudatis nigris viridi fasciatis: posticis subtus macula ani ferruginei nigro punctata.

*Papilio Rhipheus* Cram. Inf. 33. tab. 385. fig. A. B.

*Papilio Rhipheus* Drury Inf. 2. tab. 23. fig. 1. 2. at ecaudatus.

Habitat in Coromandel.

*Magnus.* Alae nigrae lineolis transuersis fascia media antice bifida, postice terminata macula magna ferruginea nigro maculata, postice maculis viridibus. Posticae sexdentato caudatae. Subtus virides, nigro maculatae, macula magna anguli ani ferruginea, nigro punctata.

*Iasius.* 44. P. E. A. alis bicaudatis fuscis postice lutescentibus subtus fascia characteribusque albis.

Cram. Inf. 28. tab. 329. fig. A. B.

*Pyrrhus.* 45. P. E. A. alis bicaudatis fuscis: fascia communi alba anticarum dimidiata.

*Camillus.* 46. P. E. A. alis bicaudatis albis: fasciis fuluis nigro marginatis, posticis macula caudali atra.

*Tiridates* 47. P. E. A. alis dentato bicaudatis supra nigris coeruleo maculatis margineque albo punctato.

Drury Inf. 3. tab. 23. fig. 1. 2.

*Castor.* 48. P. E. A. alis dentato bicaudatis fuluis margine nigris: subtus fascia maculisque albis nigra foetis.

*Papilio Camillus* Drury Inf. 3. tab. 30. fig. 1. 2.

Conf. *Papilio Eudoxus* Drury Inf. 3. tab. 33. fig. 1. 2.  
Vix differre videtur.

*Pollux.* 49. P. E. A. alis dentato bicaudatis fuscis: fascia flava, subtus fascia maculisque albis nigra foetis.

*Aeclius.* 50. P. E. A. alis dentato bicaudatis supra nigris: subtus cinereis nigro vndatis: macula ocellari fulua.

*Papilio Aeclius* Cram. Inf. 27. tab. 317. fig. A. B.

Habitat in Amboina.

Alae supra nigrae anticis punctis aliquot albis, posticis immaculatis,

*Etheocles.* 51. P. E. A. alis bicaudatis coeruleo fuscis: vtrinque fascia alba, posticis margine viridi.

52. P.E.A. alis dentato bicaudatis fuscis flavo fasciatis: *Fabius.*  
subtus basi nigro vndatis apice punctis fuluis.

53. P.E.A. alis subbicaudatis albo flavescentique strigosis: *Cocles.*  
fascia media alba, posticis subtus striga punctorum  
ocellatorum.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Medius, tenerimus. Antennae nigrae albo annula-  
tae. Corpus cinereum. Alae omnes albo flavescenti-  
que strigosae. In medio fascia lata, communis  
alba et versus marginem posticum striga atra  
subtus omnes albidae strigis flavescentibus strigaque  
marginali atra. Punctum unicum ocellare atrum ver-  
sus marginem interiorem alae anticae, et in posticis  
et striga e punctis sex albis iride flavescente pupilla-  
que atra, in quinque exterioribus oblonga, in inte-  
riori orbiculata. Caudae duae exteriore acuta, in-  
terior brevissima rotundata, supra lunulis coeru-  
leis, subtus macula atra.

54. P.E.A. alis caudatis concoloribus nigris: fascia stri- *Leilus.*  
gisque viridibus nitentibus numerosis.

55. P.E.A. alis caudatis nigris viridi fasciatis: subtus ar- *Lauinia.*  
gentatis: strigis fuluis.

56. P.E.A. alis caudatis albis: limbo nigro, posticis subtus *Brutus.*  
fascia fusca.

Cram. Ins. 32. tab. 378. fig. D.E.

57. P.E.A. alis caudatis albis: limbo communi nigro, po- *Dolicuon.*  
sticis vtrinque punctis marginalibus albis.

58. P.E.A. alis caudatis nigris: disco coeruleo radiante, *Vlysses.*  
posticis subtus ocellis septem.

59. P.E.A. alis caudatis concoloribus fuscis: fascia linearis *Patroclus*  
obliqua alba apicibusque albis.

60. P.E.A. alis caudatis nigris supra introrsum viridi- *Diomedes*  
bus: posticis lunulis cyaneis.

61. B.E.A. alis caudatis supra fuscis fulvo nigroque macu- *Varares.*  
latis basi albis.

Cram. Ins. 33. tab. 388. fig. A.B.

62. P.E.A. alis caudatis subconcoloribus albis: fasciis fu- *Protefi-*  
scis, vnicam subtus sanguinea, angulo ani rubro. *laus.*

- Antilochus.* 63. P. E. A. alis caudatis concoloribus flavis: fasciis marginaque nigris, caudis albis longitudine alae.
- Podalirius.* 64. P. E. A. alis caudatis subconcoloribus flavescentibus: fasciis fuscis geminatis, posticis subtus linea sanguinea.
- Alcibiaades.* 65. P. E. A. alis caudatis albis: anticis margine nigro fasciato, postice subtus apice ferrugineis nigro punctatis.
- Habitat Tranquebariae Dom. Lund.
- Minor et similis P. Podalirio. Antennae nigrae. Caput fuluum linea media lata atra. Thorax cinereo tomentosus, maculis duabus anticis fuluis. Abdomen albidum linea maculari laterali atra. Alae anticae albae basi parum virescentes margine exteriori nigro fasciato. Posticae albae macula anuli lunulique marginalibus atris. Cauda elongata, atra apice alba. Subtus anticae subconcolores. Posticae basi virescentes, nigro striatae, apice fuluae nigro punctatae.
- Pompiilius.* 66. P. E. A. alis caudatis albis: limbo nigro albo fasciato, posticis subtus maculis ferrugineis nigro notatis.
- Papilio Pollicenes* Cram. Ins. 4. tab. 57. fig. A. B.
- Habitat in India Mus. Dr. Hunter.
- Statura et magnitudo omnino P. Sinon. Corpus supra albidum linea dorsali nigra. Alae anticae albae margine exteriori, et postico nigro fasciis septem albis, subtus concolores. Posticae supra albae margine nigro sinibus albis. Lunula analis rufescens. Cauda elongata nigra margine albo. Subtus basi virescentes nigro fasciatae apice albidae maculis rufescentibus nigro notatis lunulisque nigris.
- Sinon.* 67. P. E. A. alis caudatis nigris viridi fasciatis maculatisque: posticis subtus linea sanguinea.
- Papilio Sinon* Cram. Ins. 27. Tab. 317. fig. C. D. E. F.
- Chiron.* 68. P. E. A. alis caudatis nigris fusco fasciatis: subtus ante albis; strigis ferrugineis.
- Crithon.* 69. P. E. A. alis caudatis supra fuscis subtus glaucis: fascia vtrinque alba.
- Orsilochus.* 70. P. E. A. alis caudatis: anticis fasciis duabus posticis vnicia albis: fascia fulua.

71. P. E. A. alis caudatis concoloribus atris: anticis fasciis *Curius*.  
duabus hyalinis, posticis vnicā alba.  
Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.  
Corpus paruum supra fuscum subtus albidum abdomi-  
nis lateribus nigro punctatis. Alae anticae conco-  
lores, nigrae fasciis duabus hyalinis posteriori latio-  
ri venis nigris. Posticae atrae fascia abbreviata al-  
ba. Cauda longissima nigra margine exteriori apice-  
que albis.
72. P. E. A. alis caudatis hyalinis: margine strigaque rubris. *Ottavius*,  
*Papilio Faunus* Sp. Ins. 2. 16. 63.  
Angulus ani ruber.
73. P. E. A. alis caudatis atris: fasciis duabus albis, angulo *Licarjis*.  
ani rubro bimaculato.
74. P. E. A. alis caudatis concoloribus albis flavo fasciatis *Perian-*  
apice fuscis albo strigosis. *der.*  
Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.  
Parvus. Corpus album antennis nigris. Alae anticae  
subangustatae albae fasciis quinque flavis, quarum  
prima baseos, tertia abbreviata, quarta extus dupli-  
cata, quinta macularis, apice fuscae strigis duabus  
albis. Posticae albae fasciis flavis, quarum posterior  
multo latior. Margo posticus fuscus strigis tribus  
flexuosis albis et ante marginem maculae aliquot al-  
bae lunula nigra.
75. P. E. A. alis caudatis fuscis: anticis striga, posticis *Meliboeus*  
duabus sanguineis, subtus cyaneo nitidissimis.
76. P. E. A. alis caudatis concoloribus flavis: margine fa- *Turnus*.  
stiisque abbreviatis nigris, angulo ani fuluo.
77. P. E. A. alis caudatis concoloribus flavis: limbo fusco; *Machaon*.  
lunulis flavis, angulo ani fuluo.  
*Tentacula* duo brevia lutea capitis Larvae odorem spar-  
gunt tetrum, quo Ichneumones fugant.
78. P. E. A. alis caudatis flavis: limbo nigro, posticis lu- *Theristes*.  
nulis flavis.
79. P. E. A. alis caudatis supra atris subtus fuscis: anticis *Codrus*.  
vtrinque fascia maculari alba.
80. P. E. A. alis caudatis nigris: fasciis duabus maculari- *Chalcus*.  
bus flavis, posticis subtus vitta flava lunulisque rufis.

- Decius.* 81. P. E. A. alis caudatis fascia communi alba, posticis apice rufis, ocellis punctisque duobus albis.
- Sabinus.* 82. P. E. A. alis caudatis fuscis: fascia fulua, subtus griseis: fascia alba punctisque ocellaribus. Sp. Inf. App. 505.
- Doreus.* 83. P. E. A. alis caudatis: fascia supra viridi subtus alba.
- Palame-* 84. P. E. A. alis caudatis nigris: lunulis marginalibus flaves.
- Mene-* 85. P. E. A. alis caudatis nigris subtus albido striato maculatis, posticis lunulis rufis coerulescentibusque.
- stheus.*
- Xathus.* 86. P. E. A. alis caudatis nigris albo striato maculatis, posticis subtus ocellis coeruleis fuluisque subfasciatis. Faemina maculis obscurioribus.
- Thoas.* 87. P. E. A. alis caudatis nigris flavo fasciatis, posticis subtus flaves: fascia nigra; lunulis cyaneis.
- Cresphon-* 88. P. E. A. alis caudatis atris fascia viridi, posticis subtus tes.
- Polycaon.* 89. P. E. A. alis dentato caudatis nigris: fascia flava, posticis subtus lunulis fuluis coeruleis flauisque.
- Ajax.* 90. P. E. A. alis obtuse caudatis concoloribus fuscis: fasciis flauescientibus, angulo ani fuluo.  
*Papilio Marcellus* Cram. Pap. tab. 98. fig. G. H.  
Esp. Papil. I. tab. 51. fig. I.
- Orontes.* 91. P. E. A. alis caudatis nigris: fasciis duabus virescentibus, caudis albis distantibus.
- Agame-* 92. P. E. A. alis caudatis nigris viridi maculatis, posticis mnon. subtus lunulis tribus rufis.
- Aegisthus* 93. P. E. A. alis caudatis fusco luteoque vndulatis, ocellis caudalibus subternis.
- Empedo-* 94. P. E. A. alis caudatis fuscis: anticis fascia abbreviata cles. maculari viridi, posticis subtus maculis duabus anguli ani.
- Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.
- Magnus.* Antennae nigrae. Caput et thorax fusca. Corpus lana alba tectum. Alae anticae vtrinque fuscae fascia in medio abbreviata e maculis sex viridibus, quarum quarta et sexta minutissimae. Posticae caudatae supra fuscae basi pallidiores. Apex caudae alibi-

bicat. Subtus fuscae angulo ani maculis duabus atris lunula rufa.

95. P. E. A. alis caudatis nigris: posticis ante marginem *Euryalus*: coeruleis; maculis nigris: pupilla alba.

96. P. E. A. alis caudatis nigris: anticis fascia fulua, posticis alba submarginali. *Nifus.*

97. P. E. A. alis subcaudatis fuscis: subtus fasciis albis biorocellatis caudaeque ocellis geminis. *Phidippus.*

Fascina mare multo maior.

98. P. E. A. alis dentato caudatis nigris: anticis albo maculatis, posticis fascia flava. *Xiphares*

*Papilio Xiphares* Cram. Pap. 32. tab. 377. fig. A. B.

Habitat in Africa.

Statura P. Pyrrhi. Alae dentatae dente postico elongato, caudato. Corpus nigrum. Alae anticae nigrae maculis aliquot albis. Posticae nigrae fascia lata, dentata lunulisque marginalibus flauis. Subtus cinerascentes fascia alba striga vndata flaua.

99. P. E. A. alis subcaudatis fuscis apice atris albo maculatis, posticis subtus ocellis duobus. *Aurelius.*

100. P. E. A. alis dentatis nigris flavo maculatis: posticis ocello coeruleo rufoque. *Demoleus.*

Cram. Inf. 20. tab. 231. fig. A. B.

*Papilio Erithonius* Cram. Inf. 20. tab. 232. fig. A. B. vix differre videtur.

101. P. E. A. alis dentatis supra nigris fascia coerulea, subtus *Achilles*. fuscis ocellis tribus quinise.

102. P. E. A. alis supra nigris: anticis fascia lutea apice Medon. que albis, posticis disco coerulescentibus.

103. P. E. A. alis nigris: posticis fascia coerulea, subtus *Erithonius*. viridibus: striga punctorum alborum.

Habitat in Africa Mus. Dr. Hunter.

Statura omnino P. Medon. Alae omnes supra fuscae anticis apice albis posticis fascia coerulea versus angulum ani dilatata. Subtus omnes virescentes punctis baseos nigris strigaeque media alba e punctis anticarum tribus, posticarum sex.

104. P. E. A. alis dentatis nigris: anticis fascia alba, posticis disco coerulescente; puncto atro. *Ceres.*

*Papilio Ceres* Sp. Inf. 2. 90. 396.

*Papilio Lucilla* Cram. Inf. 13. tab. 156. fig. A.C.

- Cato.* 105. P.E.A. alis dentatis nigris: disco communi virescente, subtus nigro punctatis, posticis macula baseos rufa.

*Papilio Cyparissa* Sp. Inf. 2. 33. 137.

- Philote-* 106. P.E.A. alis dentatis fuscis: posticis ocellis duobus, pupilla nigra punctisque tribus albis.

*Faemina* alis anticis subtus fasciculo pilorum elongatorum diuergentium.

- Lucretius* 107. P.E.A. alis dentatis atris fuluo fasciatis, subtus maculis atris linea coerulea cinctis.

- Stelenes.* 108. P.E.A. alis dentatis fuscis: fasciis duabus viridibus, altera posticarum integra.

- Nireus.* 119. P.E.A. alis dentatis nigris: fascia inaurata viridi, subtus nigricantibus.  
Cram. Inf. 32. tab. 378. fig. F.G.

- Amphi-*  
*machus.* 110. P.E.A. alis dentatis atris: fascia coerulea nitida subtus antice albis postice cinereis.

- Odius.* 111. P.E.A. alis falcatis subdentatis fuscis: anticis disco flauo.

- Amphi-*  
*trion.* 112. P.E.A. alis dentatis nigris: fascia inaequali flaua, posticis subtus striga e punctis flauis lunulisque cyaneis.

- Gambri-*  
*sus.* 113. P.E.A. alis dentatis supra nigris viridi maculatis striatisque: anticis fascia maculari niuea.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

*Medius.* Antennae extorsum crassiores, atrae. Caput atrum, albo punctatum. Thorax ater fasciis tribus cinereis. Abdomen atrum segmentorum marginibus albidis. Alae anticae fuscae basi viridi striatae, in medio maculae tres albohyalinae, pone has fascia magna, macularis albohyalina. Posticae fuscae viridi maculatae striataeque. Subtus anticae basi cinerascentes maculis fasciaque hyalino albis apice fuscis, posticae virescentes basi lineola medioque striga atris, apice fasciae indistinctae e maculis albis.

- Demo-*  
*phon.* 114. P.E.A. alis dentatis supra nigris, fascia viridi, subtus griseis albo strigosis.

Habitat Cajennae.

115. P. E. A. alis dentatis supra fuscis albo maculatis disco- *Nefstor.*  
que coeruleo: subtus ocellis tribus quatuorue.
116. P. E. A. alis dentatis pallido coeruleis apice atris fer- *Perseus.*  
ragineo inaculatis, subtus vndatis: ocellis tribus  
quatuorue.
117. P. E. A. alis dentatis fuscis: area communi coerulea *Telema-*  
radiata, singulis subtus ocellis.  
*Papilio Telemachus* Cram. Inf. 32. tab. 373. fig. A. B. C. *chus.*
118. P. E. A. alis dentatis coeruleis nitidissimis subtus ne- *Menelaus*  
bulosis: punctis fuscis.
119. P. E. A. alis subrepandis liuidiusculis subtus nebulo- *Teucer.*  
sis: posticis ocellis tribus: postremo maximo.
120. P. E. A. alis angulato repandis fuscis subtus liuidiuscu- *Autome-*  
culis, ocello anguli anni.  
Cram. Inf. 33. tab. 389. fig. A. B. *don.*
121. P. E. A. alis dentatis: anticis rubris, posticis nigris, *Hecuba.*  
subtus vtrinque ocellatis.  
Cram. Inf. 19. tab. 217. fig. A. B.
122. P. E. A. alis dentatis fuluis postice atris: subtus anti- *Metellus.*  
cis ocellis tribus, posticis quinque. Sp. Inf. App. 505.
123. P. E. A. alis subcrenatis fascis basi cyaneis subtus ne- *Idome-*  
bulosis: posticis ocello magno flauescente.  
Cram. Inf. tab. 390. fig. A. B. *neus.*
124. P. E. A. alis dentatis concoloribus nigris: fascia inter- *Euryypy-*  
rupta maculisque viridibus, posticis subtus rubro *lus.*  
maculatis.

---

\*\*\* *Heliconii.*

125. P. H. alis oblongis integerrimis luteis: anticis striis *Calliope.*  
tribus, posticis fasciis tribus nigris.  
Gram. Inf. 21. tab. 246. fig. C.
126. P. H. alis oblongis integerrimis flavis: anticis supra *Melite.*  
nigris; lineis duabus fasciisque flavis.
127. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus luteis *Mopsa.*  
nigrisque: margine albo punctato.
128. P. H. alis oblongis integerrimis fuluis nigro macula- *Mneme.*  
tis: anticis apice atris flavo maculatis.

- Lybia.* 129. P. H. alis oblongis integerrimis: anticis atris; fasciis duabus fuluis, posticis fuluis: fascia marginali atra.
- Vesta.* 130. P. H. alis oblongis integerrimis flavescentibus: margine nigro albo punctato.  
Habitat in China Dr. Pflug.  
Affinis *P. Violae* at distinctus et aliis. Corpus nigrum abdome cinereo collarique parvo fulvo. Alae anticae flavescentes maculis aliquot fuscis margineque postico fuso albo punctato. Posticae itidem flavescentes inimaculatae margine solo nigro punctis triangularibus albis. Subtus fere concolores.
- Violae.* 131. P. H. alis oblongis integerrimis fuluis nigro punctatis: posticis margine nigro punctis albis.  
*Papilio Cephea* Cram. Pap. 20. tab. 298. fig. D. E.  
Conf. *Papilio Hypetia* Drury Ins. 3. tab. 13. fig. 1. 2.
- Terpsichore.* 132. P. H. alis oblongis integerrimis fuluis: posticis nigro punctatis.
- Serena.* 133. P. H. alis oblongis integerrimis fuluis: posticis subtus basi nigro punctatis.  
*Papilio Eponina* Cram. Pap. 33. tab. 268. fig. A. B.
- Polymnia* 134. P. H. alis oblongis integerrimis: anticis fascia flava, posticis fasciis tribus nigris.
- Hippodamia.* 135. P. H. alis oblongis integerrimis: anticis nigris; fasciis tribus hyalinis, posticis hyalinis.
- Vrania.* 136. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis disco albis, posticis ocellis vtrinque binis.
- Doris.* 137. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis flavo maculatis, posticis supra basi coeruleis.  
*Papilio Doris* Cram. Pap. 29. tab. 337. fig. 6.
- Hecale.* 138. P. H. alis oblongis integerrimis nigris: anticis fascia, posticis subtus punctis marginalibus albis.
- Ricini.* 139. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: anticis vtrinque fasciis duabus flavis, posticis basi radiatis.  
*Papilio Ricini* Cram. Pap. 32. tab. 378. fig. A. B.
- Brassolis.* 140. P. H. alis oblongis integris fuscis: anticis flavo maculatis, posticis subtus sanguineo radiatis.
- Thales.* 141. P. H. alis oblongis subintegratis subconcoloribus atris basi rubro radiatis, anticis flavo maculatis.

142. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis fasciis *Myrti.*  
duabus flauis, posticis disco rufo.

143. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis fascia *Cepha.*  
abbreviata albida, posticis basi fuluis: subtus ra-  
diatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parvus. Corpus fuscum. Alae anticae supra atrae fa-  
scia media lata albida, quae tamen margines haud  
attingit. Ad marginem tenuorem macula communis  
fulua. Posticae basi fuluae apice atrae. Subtus  
omnes fuscae, anticae fascia albida maculaque baseos  
fulua, posticae basi fuluo radiatae apice maculis ali-  
quot obsoletis albis.

144. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: anticis fasciis *Psidii.*  
tribus, posticis duabus hyalinis.

Cram. Inf. 22. tab. 257. fig. F.

145. P. H. alis oblongis integerrimis atris hyalino striato *Aspasia.*  
maculatis, posticis basi flauis.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Medius. Caput et thorax atra albō punctata. Corpus  
fuscum. Alae anticae atrae basi hyalino striatae api-  
ce maculatae. Posticae basi fluae nervis nigris, api-  
ce nigrae hyalino punctatae.

146. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis macu- *Aegle.*  
lis, posticis disco hyalinis.

147. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus atris: *Charito-*  
anticis fasciis flavis tribus, posticis duabus. *nia.*

148. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis fascia *Melpome-*  
rubra, posticis basi subtus punctis sanguineis. *ne.*

149. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis fascia *Phyllis.*  
rubra, posticis flava.

150. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: anticis albo *Clio.*  
maculatis, posticis fascia alba.

Cram. Pap. 22. tab. 257. fig. D. E.

151. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: anticis flavo *Thalia.*  
maculatis, posticis striatis.

Cram. Pap. 21. tab. 246. fig. A.

152. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus fuluis: *Rosalia.*  
anticis malula flava, posticis strigis duabus nigris  
Sp. Inf. App. 505.

- Euryta.* 153. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus fuscis: fascia alba, posticis striatis basi nigro punctatis. Cram. Pap. 20. tab. 233. fig. A.B.C.
- Adea.* 154. P. H. alis oblongis integerrimis albo maculatis: anticis virescentibus, posticis fascia flava.
- Thallo.* 155. P. H. alis oblongis integerrimis nigris anticis fasciis duabus, posticis unica flavis.
- Antiocha.* 156. P. H. alis oblongis integerrimis nigris: anticis fasciis duabus albis.
- Camoena.* 157. P. H. alis subintegris fuscis nigro punctatis: posticis fascia rubra.
- Gea.* 158. P. H. alis oblongis integerrimis nigris: anticis maculatis duabus, posticis disco fulvo nigro striato, subtus basi nigro striatis.
- Lycia.* 159. P. H. alis integerrimis concoloribus fuscis albo maculatis: posticis disco albo; punctis nigris.
- Pyrrha.* 160. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus fuscis flavo maculatis: posticis disco ferrugineo nigro striato.
- Pasiphae.* 161. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis albo variis: maculis margineque atris.
- Murcia.* 162. P. H. alis oblongis integerrimis: anticis fuscis immaculatis, posticis flavescentibus nigro punctatis.
- Caecilia.* 163. P. H. alis oblongis medio albis nigro punctatis: posticis margine nigro subtus albo punctato.
- Bonasia.* 164. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: fascia communis fulva, posticis basi nigro punctatis.
- Euterpe.* 165. P. H. alis oblongis integerrimis nigris albo punctatis: fascia fulva.
- Susanna.* 166. P. H. alis oblongis integerrimis nigris albo punctatis: macula baseos fasciaque postica fuluis.
- Habitat in Africa. Mus. Dr. Hunter.  
 Corpus nigrum, punctis albis abdominisque lateribus fuluis. Alae anticae nigrae macula magna baseos fasciaque postica marginis haud attingente fuluis. Inter fasciam puncta tria aut quatuor alba. Margo albo punctatus. Subtus concolores at striga punctorum alborum ante marginem. Posticae nigrae macula baseos ad marginem exteriorem lobata fasciaque

que postica abbreviata sinuata fuluis. Puncta paucæ in disco et plura ad marginem tenuiorem. Margo posticus albo punctatus. Subtus concolores at puncta plura alba sparsa.

167. P. H. alis oblongis atris: anticis rubro fasciatis, posticis striatis. *Erithrea.*  
 168. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis flavo maculatis basi rubris, posticis rubro striatis. *Erato.*

\*\*\*\* *Parnassii.*

169. P. P. alis rotundatis integerrimis albis nigro maculatis: posticis supra ocellis quatuor subtus sex. *Apollo.*  
*Puppa* subfolliculata ouata.  
 170. P. P. alis rotundatis integerrimis albo nigro neruosis: anticis maculis duabus nigris marginalibus. *Mnemosyne.*  
 171. PP. alis rotundatis integerrimis albis: venis nigris. *Crataegi.*  
*Pluuiam sanguineam* saepe cauſat.  
 172. P. P. alis rotundatis integerrimis concoloribus nigro punctatis: anticis denudatis, posticis flavescentibus. *Andromacha.*  
 173. P. P. alis rotundatis integerrimis rubris: anticis apice hyalinis, posticis subtus albidis nigro punctatis. *Horta.*  
*Cram. Pap. 25. tab. 298. fig. F. G.*  
 174. P. P. alis rotundatis integerrimis hyalinis: posticis disco fulvo nigro punctato. *Quirina.*  
 175. P. P. alis rotundatis integerrimis hyalino diaphanis: posticis ocellis binis marginalibus. *Piera.*  
*Cram. Pap. 25. tab. 291. fig. C. D.*  
*Habitat in Americae Anacardio.*  
*Larua* alba pilosa: pilis longis deflexis.  
*Puppa* brunnea.  
 176. P. P. alis rotundatis nigris albo subradiatis: puncto centrali albo, posticis subtus luteis basi cruentatis. *Pasithoe.*  
*Papilio Porsenn. Cram. Inf. 30. tab. 342. fig. A. B.*  
 177. P. P. alis angulato caudatis fusco hyalinis: posticis apice nigris coeruleo variis subtus ocellis duobus. *Anacardii.*  
*Habitat in America meridionali.*  
 178. P. P. alis dentatis anticis hyalinis: maculis duabus nigris, posticis nigris: macula alba. *Cressida.*  
*Fabr. Infect. T. II.*

- Rhea.* 179. P. P. alis rotundatis integerrimis fusco hyalinis: posticis puncto quinque ocellaribus albis.  
Habitat Cajennae.
- Andromeda.* 180. P. P. alis rotundatis integerrimis hyalino albis: posticis ocello utrinque uno.
- Diaphanus.* 181. P. P. alis rotundatis integerrimis albohyalinis: marginibus fuscis.
- Idea.* 182. P. P. alis rotundatis integerrimis denudato albis: venis maculisque nigris.
- Cram. Pap. 31. tab. 362. fig. D.

\*\*\*\*\* *Danai Candidi.*

- Braffiae.* 183. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: anticis maculis duabus apicibusque nigris maior. Ova aggregata, erecta, obtusa.
- Rupae.* 184. P. D. C. alis integerrimis; anticis maculis duabus apicibusque nigris minor.
- Napi.* 185. P. D. C. alis integerrimis albis: subtus venis dilatatis virescentibus.
- Sinapis.* 186. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: apicibus fuscescentibus.
- Raphani.* 187. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis apice nigris albo maculatis: posticis subtus nigro venosis flauo puluerulentis.
- Papilio Raphani* Esp. Pap. tab. 84. fig. 3.  
Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.  
Statura et magnitudo omnino P. Sinapis. Antennae nigrae, albo annulatae. Caput et thorax fusca. Abdomen album dorso fusco. Alae anticae concolores, albae macula pone medium margineque nigris. Margo maculis tribus albis. Alae posticae supra albae punctis marginalibus fere obsoletis fuscis. Subtus nigro venosae puluere flauicante adspersae.
- Poppea.* 188. P. D. C. alis rotundatis integerrimis concoloribus albis: margine nigro maculato, anticis macula baseos ferruginea.
- Sylvia.* 189. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: anticis apice fuscis subtus macula baseos fulua.

190. P. D. C. alis integerrimis rotundatis fuluis; subtus *Argante*, ferrugineo irroratis.
191. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis margine *Monuste*, fuscis.
192. P. D. C. alis subintegris rotundatis albis: anticis puncto apiceque nigris. *Argia*.  
Margo interior alae anticae basi pilis plurimis elongatis, fasciculatis, erectis albis. An varietas sexus.
193. P. D. C. alis rotundatis albis apice nigris: posticis *Amanthonte*, subtus margine brunneo.
194. P. D. C. alis rotundatis integerrimis griseis: anticis *Phileta*, supra albis apice fuscis.
195. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: anticis costa baseos apiceque fuscis. *Libythea*.
196. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: anticis puncto apiceque nigris, posticis subtus flauescensibus: margine nigro punctato. *Calypso*.
197. P. D. C. alis rotundatis integris albis margine fuscis, *Daplidice* subtus griseo virescentibus albo maculatis.  
Habitat in Europae, Africæ Brassica, Reseda.  
*Larua* pilosa, coerulea, nigro punctata flavoque striata.
198. P. D. C. alis integris rotundatis albis: margine nigro; *Creona*. striga punctorum.
199. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: margine *Nerissa*. nigro, subtus nigro venosis.
200. P. D. C. alis rotundatis albis: fasciis duabus marginique fuscis, posticis subtus subincarnatis. *Demophile*.
201. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flavis extimo nigro, subtus fusco punctatis. *Hecuba*.
202. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flavis: anticis *Agave*, apice supra nigris subtus brunneis.

*Papilio Agave* Cram. Pap. 2. tab. 20. fig. H.I.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Alae supra flauissimæ anticis apice nigris posticis immaculatis, subtus itidem fluae macula brunnea apicis alae anticae et minor alae posticæ.

- Cardami-* 203. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: posticis nes. subitus viridi marmoratis.
- Xiphia.* 204. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: anticis macula apiceque nigris, posticis subtus viridi irroratis.
- Eucharis.* 205. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: anticis apice fuluis margine nigro, posticis immaculatis.
- Papilio Elorea* Cram. Pap. 30. tab. 352. fig. C. D. E. F.
- Nyja.* 206. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: posticis subtus fuscis; puncto albo lunulisque sex flavis.
- Chloris.* 207. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis apice nigris: posticis subtus fuluis: margine late nigro.
- Papilio Chloris* Drury. Inf. 3. tab. 32. fig. 3. 4.
- Rhodope.* 208. P. D. C. alis rotundatis integerrimis subconcoloribus externe nigris: anticis flavis, posticis albis.
- Elathea.* 209. P. D. C. alis rotundatis integerrimis extimo nigris anticis flavis posticis albis subtus cinereis.
- Licea.* 210. P. D. C. alis rotundatis integerrimis concoloribus extimo nigris: anticis albis posticis flavis.
- Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.
- Statura omnino praecedentium. Corpus nigro villosum. Alae anticae albae apice nigrae, posticae flavae margine tenuissime nigro et ante marginem parum fuluae. Subtus concolores at margo posticis alae posticae latus niger.
- Alcmeone* 211. P. D. C. alis rotundatis concoloribus basi flavis apice albis.
- Phryne.* 212. P. D. C. alis integerrimis albis: margine nigro posticis subtus flavis.
- Alium e Cap. B. spei vidimus in Mus. Dom. Banks. simillimum at subtus haud nigro venosum.
- Pyranthe* 213. P. D. C. alis rotundatis albis puncto apiceque nigris, subtus cinereo vndatis: puncto fuluo.
- Leucippe.* 214. P. D. C. alis integerrimis: anticis rubris, margine nigro, posticis flavis.
- Alae omnes subtus nebulosae.
- Callirhoe.* 215. P. D. C. alis integris albis: anticis apice, posticis margine punctisque sex nigris.

216. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: anticis apice nigris, posticis subtus cinereis fuscō vndatis. *Glaucippe*  
Variat rarius punctis marginalibus alae posticae nigris.
217. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauescens: anticis apice nigris, posticis subtus albis. *Euippe.*
218. P. D. C. alis integerrimis nigro venosis supra albis *Coronnis.* subtus virescentibus.
219. P. D. C. alis integerrimis albis nigro venosis: posticis *Hyparete* subtus flauis; margine rubro maculato.
220. P. D. C. alis integerrimis albis apice atris: posticis *Iphigenia* subtus flauescens: fascia media atra: striga ab breuiata fulua.
221. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: posticis *Teutonia.* subtus nigro venosis flauo maculatis.
222. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: posticis *Mysis.* subtus margine atro: fascia sanguinea.
223. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis apice nigris, *Nigrina.* subtus nigris: posticis striga flexuosa sanguinea.
224. P. D. C. alis rotundatis integerrimis nigris: fascia *Saba.* communi alba.
225. P. D. C. alis integerrimis albis: posticis subtus atris; *Pyrrha.* striga flaua rubraque fasciaque alba.
226. P. D. C. alis integerrimis albis margine nigris: subtus atris basi fuluo radiatis. *Coronea.*
- Cram. Inf. 31. tab. 361. fig. G. H.
227. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albidis apice nigris; posticis subtus obscure glaucis. *Melania.*
228. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauis: anticis *Scylla.* supra albis; limbo nigro, subtus omnibus nebulosis.
229. P. D. C. alis rotundatis integerrimis fuluis: anticis *Cornelia.* supra albis; marginē nigro.
- Habitat Tranquebariae Doni. Lund.
- Statura omnino praecedentis. Antennae nigrae. Corpus cinereum. Alae anticae supra albae margine exteriori nigro. Posticae lacte fuluae punctis marginalibus fuscis. Subtus omnes fuluae puncto medio ocellari atomisque aliquot fuscis.

- Iudith.* 230. P. D. C. alis integerrimis subconcoloribus: anticis albis venis margineque nigris, posticis fuluis margine nigro.  
**Habitat** in Pulicandor Mus. Dom. Banks.  
**Statura** et **magnitudo** praecedentium. **Corpus** hirtum, cinereum antennis nigris albo annulatis. Alae omnes subconcolores, anticae albae venis margineque nigris, posticae fuluae margine nigro et in hoc margine nigro maculae aliquot fuluae.
- Amata.* 231. P. D. C. alis rotundatis fuluis: limbo nigro, subtus virescentibus.
- Cypraea.* 232. P. D. C. alis integerrimis fuluis: margine nigro fuluo maculato: subtus virescentibus, puncto strigaque moniliformi fuluis.  
**Habitat** in India.  
**Statura** et **summa affinitas** P. Amata. Differt tamen alis subtus puncto strigaque moniliformi fuluis.
- Danae.* 233. P. D. C. alis rotundatis albis: anticis apice croceis margine fasciaque nigris, subtus striga moniliformia abbreviata.
- Sesia.* 234. P. D. C. alis rotundatis flavis apice (medio fuluo) nigris: posticis subtus maculis septem ocellaribus albis.  
*Papilio Marianna* Cram. Ins. 19. tab. 217. fig. D. E.
- Rahel.* 235. P. D. C. alis rotundatis integerrimis flavis supra margine nigris subtus immaculatis.  
**Habitat** in India Dom. Boeber.  
**Minuta** in hac familia. Caput et thorax fusca. Abdomen albidum dorso fusco. Alae flauissimae anticis margine exteriori et postico late nigris, posticis margine tantum postico. Subtus omnes immaculatae.
- Messalina* 236. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis apice nigris, subtus flavis: macula marginali brunnea.  
**Habitat** in India Dom. Boeber.  
**Statura** parua praecedentis. Alae anticae albae apice nigrae, posticae albae macula tantum marginali nigra. Subtus flavae, anticis macula apicis, posticis atomis maculaque marginali brunneis.
- Aenippe.* 237. P. D. C. alis rotundatis flavis; omnibus subtus punctis ocellaribus: anticis sex posticis septem.

238. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis apice (medio fuluis) nigris, singulis subtus puncto medio atro. *Rhexia.*

239. P. D. C. alis integerrimis flavis: anticis supra marginem nigris: singulis subtus striga ferruginea. *Trite.*

240. P. D. C. alis integerrimis fuluis: puncto margine que nigris subtus virescentibus: anticis puncto nigro, posticis argenteo. *Edusa.*

*Papilio Hyale* Esp. Pap. 1. tab. 4. fig. 1.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Nimis affinis *P. Hyale* at alae supra fuluae puncto anticarum medio apicibusque atris. Antennae fuluae.

*Mas* margine nigro immaculato. *Faemina* flavo maculato.

241. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flavis: anticis apice (medio fuluis) nigris, posticis subtus strigis tribus fuscis. Linn. Syst. Nat. 2. 726. 88. *Eupheno.*

Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

Statura omnino praecedentis.

242. P. D. C. alis integerrimis flavis apice nigris margine que fuluis: posticis subtus puncto argenteo. *Palaeno.*

*Papilio Europome* Esp. Pap. 1. tab. 4. fig. 2.

Cram. Inf. 29. tab. 340. fig. A. B.

Habitat in Coronilla varia.

*Larua* subuillosa, viridis, flavo lineata nigroque punctata.

Variat rarius alis albidis.

243. P. D. C. alis rotundatis flavis: posticis macula fulua, *Hyale*. subtus puncto sesquialtero argenteo.

*Papilio Palaeno* Esp. Pap. 1. tab. 4. fig. 4.

Cram. Inf. 30. tab. 351. fig. E. F. G. H.

*Mas* margine alarum nigro immaculato, *faemina* maculato.

Variat puncto paruo ferrugineo loco argentei.

*Larua* holosericea viridis: linea laterali alba flavo punctata.

*Puppa* viridis linea laterali flava.

244. P. D. C. alis integerrimis fuluis: anticis subtus puncto ocellari, posticis sequialtero argenteis. *Aurora.*

*Papilio Aurora* Esp. Pap. 1. tab. 83. fig. 3.

Habitat in Sibiria Dom. Boeber.

*Mera* varietas praecedentis videtur. Differt tantum colore supra fuluo. Vix distingui meretur.

*Lesbia.* 245. P. D. C. alis integerrimis fuluis: anticis puncto fusco, omnibus subtus pallidis: puncto niveo.

*Sennae.* 246. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauis: singulis subtus puncto gemino ferrugineo.

*Marcellina.* 247. P. D. C. alis integris rotundatis flauis: singulis subtus puncto genuino argenteo.

*Eubule.* 248. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauis: margine punctis nigris, posticis subtus puncto gemino ferrugineo argenteo.

*Proterapia.* 249. P. D. C. alis integerrimis angulatis fuluis: anticis margine exteriori nigro.

*Gnoma.* 250. P. D. C. alis integris rotundatis albis: anticis puncto atro, subtus omnibus puncto argenteo.

*Papilio Philippina* Cram. Inf. 30. tab. 361. fig. C. D.

*Drya.* 251. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauis subtus anticis puncto ferrugineo, posticis argenteo.

*ectlipfis.* 252. P. D. C. alis integerrimis angulatis flauis: anticis punctis duobus maculaque nigris, posticis ocello coeruleo.

*Rhamni.* 253. P. D. C. alis integerrimis angulatis flauis: singulis puncto ferrugineo.

Prouenit Imago mense Augusti, saepius hybernat primo vere volitans.

*Philea.* 254. P. D. C. alis integerrimis angulatis flauis: anticis macula, posticis limbo luteis.

*Maerula.* 255. P. D. C. alis integris angulatis flauis: anticis supra macula atra, reliquis ferruginea.

*Pomona.* 256. P. D. C. alis subangulatis albis: anticis puncto nigro, subtus flauis: posticis punctis duobus argenteis.

*Florella.* 257. P. D. C. alis subangulatis albis: anticis puncto fusco, posticis subtus punctis tribus argenteis.

*Cleopatra.* 258. P. D. C. alis integerrimis anticis supra disco fuluo, reliquis puncto ferrugineo.

\* *Danai festivii.*

259. P. D. F. alis integerrimis nigris: fasciis duabus albis: *Cyparisias.*  
anticarum obliquis, posticarum punctatis.
260. P. D. F. alis integerrimis nigris albo punctatis: anti- *Midamus*  
cis supra coerulecentibus, posticis supra punctorum  
alborum striga.  
*Papilio Midamus* Cram. Inf. 23. tab. 266. fig. A. B.  
*Papilio Eleusina* Cram. Inf. 23. tab. 266. fig. D.  
*Papilio Cora* Cram. Inf. 23. tab. 266. fig. E.
261. P. D. F. alis integerrimis nigris: anticis coeruleo mi- *Claudius.*  
cantibus albo punctatis, posticis lineatis.  
*Papilio Basilissa* Cram. Inf. 23. tab. 266. fig. C.  
Habitat Tranquebaria Dom. Lund.  
Nimis omnino affinis P. Midamus. Corpus nigrum al-  
bo punctatum. Alae anticae fuscae coeruleo mican-  
tes, albo punctatae. Posticae fuscae lineis variis in-  
terdum bifidis niueis. Striga e punctis albis versus  
marginem subtus subconcolor.
262. P. D. F. alis integerrimis nigris: anticis fascia alba, *Niavices.*  
posticis macula communi baseos alba.
263. P. D. F. alis integerrimis concoloribus atris: fascia *Cochrus.*  
maculari alba, abdomine sanguineo-cingulis atris.  
Habitat - - - - - Mus. Dr. Hunter.  
Magnus et crassus. Antennae clavatae nigrae clava  
apice acuminata. Thorax et pectus atra rubro  
maculata. Abdomen basi atrum apice rufum cingu-  
lis quatuor atris albo marginatis. Anus ater. Alae  
omnes concolores, atrae fascia abbreviata maculari  
alba. Pedes atri geniculis rufis.
264. P. D. F. alis integerrimis plumbeis: subtus anticis vi- *Liberius.*  
ridibus posticis fuluis.
265. P. D. F. alis integerrimis atris: anticis maculis tribus, *Zoilus.*  
posticis disco albis.
266. P. D. F. alis integerrimis atris coeruleo maculatis: *Arethu-*  
posticis subtus punctis sanguineis. *fus.*  
Drury Inf. 3. tab. 8. fig. 1. 2.
267. P. D. F. alis integris nigris albo maculatis: posticis *Eyia-*  
subtus disco flavo fasciaque baseos sanguinea,  
*teus.*  
*Papilio Eyialea* Cram. Inf. 16. tab. 189. fig. D. E.

*Papilio Dio Drury Inf. 2. tab. 8. fig. 3. 4. i*

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

**Medius.** Antennae mihi desunt. Corpus hirtum, fuscum. Alae anticae nigrae striis maculisque albis punctoque medio distincto. Posticae nigrae margine interiori albo. Subtus anticae concolores, posticae nigrae disco flavo nigro venoso et fascia lata baseos sanguinea.

**Clymen-**  
**nus.**

268. P. D. F. alis integris: fascia cyanea, subtus anticis sanguineis, posticis albis annulis punctisque atris.

**Lassus.**

269. P. D. F. alis integerrimis fuscis: strigis nigris anticis macula marginali alba, subtus pallidis: strigis fuscis. Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo P. Clymeni. Corpus supra fuscum, subtus cinereum. Alae omnes supra fuscae strigis plurimis obscurioribus. Praeterea macula alba ad marginem exteriorem alae anticae. Subtus omnes pallidae strigis plurimis fasciaque postica fuscis. Anticae margine fusco macula punctisque albis.

**Antio-**  
**chus.**

270. P. D. F. alis integerrimis rotundatis nigris: supra fascia communis fulua.

Drury Inf. 3. tab. 7. fig. 3. 4.

**Syphax.**

271. P. D. F. alis integerrimis atris: anticis fascia alba, posticis rubra marginali.

*Papilio Harmodius* Cram. Inf. 19. tab. 223. fig. C. D.

**Eccalithe-**  
**Eualte.**

272. P. D. F. alis integerrimis nigris: anticis fasciis duabus, posticis una flavis maculisque rubris, subtus rubris: fascia maculari flava.

**Licas.**

273. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis fasciis duabus, posticis una albis maculisque rubris subtus cinereis albo fasciatis.

*Papilio Licas* Cram. Inf. 19. tab. 223. fig. A. B.

Habitat Surinami Mus. Dom. Banks.

Affinis praecedenti. Antennae fuscae clava apice acuminata, ferruginea.

**Pelasgus.** 274. P. D. F. alis integerrimis concoloribus: anticis virescensibus; fascia fulua, posticis nigris immaculatis.

**Phaeton.** 275. P. D. F. alis integerrimis nigris albo rufoque maculatis.

276. P. D. F. alis integerrimis supra atris sanguineo fascia- *Galanthis*  
tis: anticis punctis duobus apicis albis.
277. P. D. I. alis integerrimis subfuscis: posticis subtus or- *Cinaeus.*  
be macularum nouem rubro.
278. P. D. F. alis integerrimis fuscis albo maculatis: anti- *Tytius.*  
cis punctis quatuor ocellaribus atris.)
279. P. D. F. alis integerrimis fuscis; posticis fascia coe- *Eupalus.*  
rulea, subtus viridibus: puncto atro.
280. P. D. F. alis integerrimis fuscis concoloribus: anticis *Pin-*  
maculis tribus flaguis, posticis dimidiato albis. *thaeus.*
281. P. D. F. alis integerrimis fuluis: venis nigris dilata- *Plexip-*  
tis, margine nigro: punctis albis. *pus.*
282. P. D. F. alis integerrimis obscure testaceis: margi- *Erippus.*  
ne nigro albo punctato: posticarum disco imma-  
culato subtus nigro venosi: punctis albis.

*Papilio Berenice* Cram. Pap. 18. tab. 205. fig. E.F.

Habitat in China Mus. Dr. Hunter.

Nimia affinitas P. Plexippi. Alae omnes supra obscure  
testaceae limbo omni nigro punctis paucis albis. Di-  
scus anticarum punctis aliquot albis ante apicem, po-  
sticarum omnino immaculatus. Subtus anticae con-  
colores, posticae nigro marginatae punctis plurimis  
albis. Discus nigro venosus punctis lineolisque albis.

283. P. D. F. alis subintegris fuluis: margine nigro albo *Misippus.*  
punctato, posticis arcu nigro.
284. P. D. F. alis integerrimis fuluis, margine nigro; pun- *Chrysip-*  
ctis albis, posticis disco punctis nigris. *pus.*
285. P. D. F. alis integerrimis fuluis: margine nigro; pun- *Alcippus.*  
ctis albis, posticis disco albo: punctis nigris.
286. P. D. F. alis integerrimis concoloribus fuluis albo *Gilippus.*  
maculatis: margine atro: punctis albis.
287. P. D. F. alis integerrimis concoloribus nigris albo ma- *Hegecip-*  
culatis: anticis basi fuluo, posticis albo lineatis. *pus.*
288. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis albo macula- *Darius.*  
tis, posticis subtus arcu nigro.
289. P. D. F. alis integerrimis fuscis albo maculatis, sub- *Daedalus*  
tus brunneis.

- Nicaeus.* 290. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis ocello, posticis supra fascia rubra marginali punctisque nigris ocellaribus.
- Numilius.* 291. P. D. F. alis integerrimis atris: anticis maculis duabus, posticis vnicis fuluis.
- Cedoman-* 292. P. D. F. alis integerrimis atris sanguineo fasciatiss, posticus subtus lineis annularibus flavis punctisque coeruleis.
- Hyda-* 293. P. D. F. alis integerrimis fuscis coeruleo micantibus: posticis subtus flavis; lineis annularibus nigris punctisque tribus coeruleis.
- Grispus.* 294. P. D. F. alis integerrimis subfuscis: subtus striga punctorum alborum.  
Habitat in China.  
Striga e punctis quinque albis in singula ala.
- Sophorae.* 295. P. D. F. alis integerrimis fuscis: fascia ferruginea, posticis subtus brunneis; ocellis tribus.  
Cram. Pap. 21. tab. 213. fig. A. B. C.
- Xanthus.* 296. P. D. F. alis integerrimis fuscis; fascia ferruginea, posticis subtus griseo marmoratis: ocellis duobus.  
Conf. *Papilio Quiteria* Cram. Pap. 27. tab. 313. fig. A. B. C. D. at alae dentatae.
- Cassiae.* 297. P. D. F. alis subintegris fuscis: fascia ferruginea apice bifida, posticis subtus cinereis: ocellis duobus.
- Berecyn-* 298. P. D. F. alis integerrimis supra atris: fascia marginali flava, subtus posticis maculis sex ocellaribus.
- Oethon.* 299. P. D. F. alis integerrimis fuscis: striga marginali fulua, posticis subtus subundatis: ocellis septem.
- Pirithous* 300. P. D. F. alis integerrimis supra fuscis: anticis fascia, posticis disco oninibusque subtus albis.
- Polixenes* 301. P. D. F. alis integris fuscis: posticis subtus griseo fuscoque nebulosiss.
- Cupanius* 302. P. D. F. alis integris atris albo maculatis: posticis subtus griseis; fascia vtrinque alba.
- Marthe-* 304. P. D. F. alis integris atris: anticis disco fulvo, posticis striga punctorum alborum.
- Arcesi-* 305. P. D. F. alis integerrimis supra ferrugineis immaculatis subtus fuscis: strigis duabus obscurioribus.  
Habi-

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Magnitudo P. Hyperanthi. Antennae mihi defunt.

Alae omnes supra ferrugineae omnino immaculatae,  
subtus fuscae strigis tantum duabus obscurioribus.

306. P. D. F. alis integerrimis supra nigris, subtus brun- *Polycar-*  
neis immaculatis. *mes.*

*Papilio Odilla* Cram. Pap. 28. tab. 329. fig. C. D.

Habitat Surinami.

307. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis falcatis; fa- *Chori-*  
scia fulua, posticis caudatis. *naeus.*

*Papilio Arcesilaus* Cram. Pap. 25. tab. 294. fig. A. B. Seb.  
Mus. 4. tab. 41. fig. 15. 16.

308. P. D. F. alis integerrimis subcaudatis fuluis basi coe- *Eribotes:*  
rulescensibus, subtus griseis.

309. P. D. F. alis subcaudatis fuluis apice flavo nigris, sub- *Itys.*  
tus variegatis: posticis basi coeruleis.

310. P. D. F. alis caudatis fuscis basi coeruleis posticis su- *Laertes.*  
pra punctis quinque albis, subtus quatuor ocellaribus.

311. P. D. F. alis integris caudatis supra fuscis basi coe- *Morus.*  
reis, subtus griseo virescentibus.

312. P. D. F. alis subcaudatis fuscis: anticis fascia lutescen- *Aetorion:*  
te exteriore maculaque coerulea postica subtusque  
ocello.

313. P. D. F. alis subcaudatis fuscis basi coeruleo nitidis: *Cymodoce*  
posticis ocello vtrinque vnico.

314. P. D. F. alis subcaudatis fuluis apice nigris: subtus *Bisaltide.*  
punctis ocellaribus anticis duobus, posticis tribus.

315. P. D. F. alis integerrimis: anticis falcatis rufis apice *Orion.*  
nigris; macula marginali alba.

316. P. D. F. alis integerrimis falcatis supra nigris: margi- *Cocytus.*  
ne postico cinereis.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Medius. Alae anticae falcatae nigrae margine posti-  
co cinereo. Punctum marginale apicis late cine-  
reo. Subtus omnes cinerascentes anticis striga po-  
stica fusca.

Simillimum ex India orientali misit Dom. Lund. at alis  
dentatis margineque alarum postico coerulecente,  
vix tamen distinctum.

*Obrinus.* 317. P. D. F. alis integerrimis atris: anticis falcatis rufis apice nigris: macula marginali alba.

*Papilio Ancaea* Cram. Pap. 29. tab. 338. fig. C. D.

*Ancaeus.* 318. P. D. F. alis integerrimis supra fuscis: fascia coerulea maculaque ferruginea, subtus viridibus; fascia albicans.

*Lucindus.* 319. P. C. F. alis integerrimis nigro fasciatis supra coeruleis subtus fuluis.

*Thymelus.* 320. P. D. F. alis oblongis integerrimis flauis: limbo communis fusco.

Habitat - - - - Mus. Dr. Hunter.

Paruus. Antennae nigro alboque annulatae clava nigra apice fulua. Corpus flavescentis thorace nigricante. Alae flavescentes limbo omni nigro. Subtus flavescentes fuluo vndulatae.

*Morpheus.* 321. P. D. F. alis integerrimis fuluis nigro maculatis: posticis vtrinque striga punctorum nigrorum.

*Lysidice.* 322. P. D. F. alis integerrimis coeruleis supra limbo subtus fasciis atris.

*Eumeus.* 323. P. D. F. alis integerrimis fuscis: fascia alba posticarum vtrinque terminata macula fulua.

*Dardus.* 324. P. D. alis integerrimis fuscis: anticis vtrinque ocello medio cyaneo, omnibus subtus strigis duabus ocellaribus.

Habitat Surinami Dr. Schulz.

Medius. Corpus fuscum. Alae omnes supra fuscae versus apicem strigis duabus macularibus obsoletis griseis posteriori subocellari. In medio alae anticae oculus magnus cyaneus iride fulua absque pupilla, pone hunc puncta duo parva alba. Subtus omnes cinereae versus apicem strigis duabus macularibus albidis posteriori subocellari. In medio alae anticae oculus magnus vti in pagina superiori.

*Iairus.* 325. P. D. F. alis integerrimis fuscis: posticis disco albo, supra ocello, subtus duobus.

*Arcas.* 326. P. D. F. alis integerrimis coeruleis: anticis albo maculatis, posticis macula atra albaque marginali.

*Clytus.* 327. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis fascia flava ocelloque subtripupillato, posticis ocellis quinque.

328. P.

328. P. D. F. alis integerrimis fuscis area rufa: anticis ocello bipupillato, posticis subtus coecis. *Hyperbius.*  
*Papilio Caffus* alis integerrimis fuscis: umbra rufescente, primoribus ocello didymo; posticis ocellis tribus Linn. Syst. Nat. 2. 768. 125. Mus. Lud. Vlr. 269.  
*Papilio Caffus* Cram. Pap. 27. tab. 314. fig. C. D. vix dif-  
ferre videtur.
329. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis ocello tripupillato, posticis lineis transuersis vndatis. *Philocles.*
330. P. D. F. alis integerrimis concoloribus nigris: fascia communis alba: anticis ocello tripupillato. *Renatus.*  
*Papilio Renata* Cram. Pap. 28. tab. 326. fig. B.  
Habitat Surinami.  
Alae basi fuscae apice atrae fascia media alba. Ocellus ante fasciam ater punctis tribus albis. Nimis affinis videtur *P. Philocles*.
331. P. D. F. alis integerrimis cyaneis: strigis atris numerosis, anticis supra macula ocellari tripupillata. *Croesus.*
332. P. D. F. alis integerrimis fuscis: fascia lutea, anticis subtus basi ocello mico. *Aeropus.*
333. P. D. F. alis nigris supra fuscis immaculatis: posticis subtus ocellis sex. *Canthus.*
334. P. D. F. alis integerrimis fuscis subtus anticis ocellis tribus, posticis duobus tribusque. *Hyperanthus.*  
*Larua* solitaria villosa cinerea: linea postica nigra, anō bidentata.  
*Puppa* gibba brunnea flavo maculata.
335. P. D. F. alis integerrimis supra nigris immaculatis subtus fuscis: anticis ocellis subtribus, posticis quinque. *Oedippus.*  
Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.  
Statura omnino *P. Hyperanthi*. Antennae albo nigrae annulatae clava ferruginea. Alae omnes supra nigrae immaculatae, subtus fuscae ocellis subtribus, posticis quinque pupilla argentea, unico remoto. Striga marginalis argentea fere obsoleta.
336. P. D. F. alis integerrimis fuscis: omnibus subtus ocello unico: anticarum bipupillato. *Zangis.*  
*Papilio Agnes* Cram. Pap. 28. tab. 325. fig. A. B.

*Eurytus.* 337. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis ocellis vtrinque duobus, posticis supra vnico, subtus quatuor, omnibus pupilla gemina.

*Tarpeius.* 338. P. D. F. alis integris fuluis: omnibus ocellis quatuor coccis.

*Papilio Celamine* Cram. Pap. 32. tab. 375. fig. E. F.

*Papilio Tarpeia* Esp. Pap. 2. tab. 83. fig. 1. 2.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Alae omnes supra fuluae margine fusco ocellisque quatuor, rarius quinque nigris coecis. Subtus anticae fuluae, posticae fuscae strigis fasciaque albis.

*Hermes.* 339. P. D. F. alis integerrimis supra fuscis immaculatis, posticis subtus ocellis sex; tribus coecis.

*Irius.* 340. P. D. F. alis integerrimis disco flavo, posticis ocello supra vnico, subtus duobus.

*Mineus.* 341. P. D. F. alis integerrimis fascis: anticis supra ocello vnico, posticis subtus septem fasciaque alba.

*Medus.* 342. P. D. F. alis integerrimis fuscis: subtus striga niuea ocellisque anticarum duobus posticarum tribus.

*Perseus.* 343. P. D. F. alis integerrimis fuscis: subtus punctis ocellaribus; anticis tribus, posticis septem.

*Terminus* 344. P. D. F. alis integris fuscis: area rufa, supra anticis ocello vnico, posticis quatuor.

*Sirius.* 345. P. D. F. alis integerrimis obscure rufis: supra anticis ocellis duobus, posticis quatuor.

*Drusius.* 346. P. D. F. alis integerrimis fuluis apice nigris posticis subtus punctis albis ocellisque duobus.

Habitat in Insula Rotterdam Mus. Dom. Banks.

*Medius.* Antennae clauatae nigrae clava apice ferruginea. Alae anticae fuluae apice nigrae fascia punctaque fuluis, posticae fuluae margine postico nigro punctaque uno alteroue ocellari ante marginem nigro. Subtus omnes ferrugineo variae, anticis in medio macula flexuosa punctisque apicis albis, posticis punctis duobus albis baseos, striga nigra in medio ocellisque duobus ante marginem pupilla nigra albaque. Ocelli praeterea duo obsoleti vix distincti in eadem linea.

347. P. D. F. alis integerrimis fuluis: anticis ocello sub. *Dauus*.  
tus albo fasciatis: posticis ocellis sex.

*Papilio Iphis* Wien. Verz. 321. 25.

*Papilio Typhon* Naturf. 10. tab. fig.

*Papilio Philoxenes* Esp. Pap. tab. 54. fig. 3.

*Papilio Tullia* Myll. Faun. Fridrichsd.

Mas alis supra ocellis obsoletis.

348. P. D. F. alis integerrimis flauis: subtus anticis ocello *Pamphi-*  
*vnicus*, posticis cinereis: fascia ocellisque quatuor *Ius*.  
oblitteratis.

*Puppa viridis*.

349. P. D. F. alis integerrimis ferrugineis: subtus anticis *Arcanius*  
ocello vnico, posticis quinis: primo fascia remoto.

Habitat in Europa Melica.

*Larua viridis* lineis dorsalibus obscurioribus laterali-  
bus flauis, cauda bidentata.

350. P. D. F. alis integerrimis fusciscentibus (fuluis) po- *Leander*.  
sticis subtus cinereis apice fuluis; ocellis sex.

*Papilio Leander* Esp. Pap. tab. 89. fig. 5.

Habitat in Europa australiori Dom. Boeber.

Statura omnino P. Arcanii. Mas alis fuscis, faemina  
anticis fuluis, posticis fuscis, ocello uno alteroue aut nullo in alis anticis et quatuor aut quinque  
in posticis. Subtus posticae cinereae ocellis sex  
omnibus approximatis pupilla argentea.

351. P. D. F. alis integerrimis fuscis: posticis supra ocellis *Sabaeus*.  
quatuor coecis, subtus sex pupillatis.

*Papilio Hero* Esp. Pap. tab. 22. fig. 4.

Omnino distinctus. Alae posticae apice fuluae fascia  
dentata alba, tunc ocelli sex atri pupilla alba et de-  
nique striga argentea.

352. P. D. F. alis integerrimis fuluis: subtus anticis ocello posticis senis. *Hero*.

*Papilio Hero* Wien. Verz. 168. 13.

*Papilio Typhon*. Esp. pap. tab. 35. fig. 3. 4.

353. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis utrinque ocello bipupillato, posticis supra subcoecis. *Artous*.

354. P. D. F. alis integerrimis supra albis subtus fuscis albo venosis: ocellis quinque. *Phryneus*.

*Papilio Phryne* Esp. pap. tab. 89. fig. 3. 4.

*Fabr. Insect. T. II.*

C

Habi-

Habitat in Russiae australioris desertis Dom. Boeber.  
 Paruuus, tener. Corpus album. Alac omnes supra albae, immaculatae, subtus fuscae venis albis. Versus marginem ocelli quinque pupilla alba.

*Hypheus.* 355. P. D. F. alis integerrimis concoloribus albis fuscō fasciatīs: anticis ocello atro posticis coecis.

*Baldus.* 356. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis vtrinque ocello; pupilla gemina posticis supra ocellis quatuor, subtus sex.

*Eumenes.* 357. P. D. F. alis integerrimis dimidiato fuscis: anticis vtrinque ocello atro tripupillato.

*Ephynes.* 358. P. D. F. alis integerrimis coeruleis purpureo fasciatīs: anticis vtrinque ocello; inferiori tripupillato.

*Tullius.* 359. P. D. F. alis integerrimis obscure cinereis: anticis apice fuscis vtrinque ocello tripupillato.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Paruuus. Alae anticae obscure cinereae apice obscure strigis vndatis flavescentibus ocello quo magno atro pupillis tribus coerulescentibus. Subtus concolores. Posticae obscure lituris lutescentibus apiceque strigis fuscis.

\* *Nymphales gemmati.*

*Io.* 360. P. N. G. alis angulato dentatis fuluis nigro maculatis: singulis ocello coeruleo.

*Polynice.* 361. P. N. G. alis angulato dentatis fuluis apice nigris, subtus fuscis: strigis coeruleis ocellisque anticarum sex, posticarum quinque.

*Almana.* 362. P. N. G. alis angulatis fuluis nigro maculatis posticis ocello maiori: pupilla gemina, omnibus subtus brunneis.

*Asterie.* 363. P. N. G. alis dentato luteis variis: posticis ocello maiori; pupilla gemina, subtus pallidis ocellis sub tribus.

*Oenone.* 364. P. N. G. alis denticulatis luteis margine nigris, posticis basi cyaneis.

*Lemonias* 365. P. N. G. alis dentatis fuscis flavo punctatis: omnibus ocello unico.

366. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia postica fulua; ocel- *Villida*.  
lis duobus.

Habitat in Insula Aminsterdami, in Pulicander Mus. Dom.  
Banks.

Parvus. Antennae pallidae clava fusca. Corpus supra  
fuscum. Alae anticae supra fuscae maculis duabus  
fuluis, duabusque flavescentibus. Versus marginem  
posticum fascia lata fulua ocellis duobus atris pupilla  
coerulea, anteriore minore. Posticae fuscae lunula  
media et fascia postica fuluis ocellis duobus atris pu-  
pilla coerulea. Subtus pallido fuluoque variegatae  
fascia postica fulua, anticarum ocello vnico, posti-  
carum plerumque duobus.

367. P. N. G. alis dentatis fuscis: omnibus supra ocellis *Orithya*.  
duobus, anticis subtus vnico.

Plures huius sunt aut species aut varietates nondum rite  
determinatae.

368. P. N. G. alis dentatis supra fuscis, subtus omnibus *Penelea*.  
ocellis duobus.

369. P. N. G. alis repandis supra fuscis: anticis ocellis *Aetaea*,  
duobus punctisque duobus albis, posticis subtus mar-  
moratis.

*Papilio Aetaea* Esp. pap. tab. 85. fig. 4.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Nimis affinis P. Fidiae et Faunae, at alae vix dentatae  
et alae posticae subtus marmoratae puncto uno alte-  
roue atro ad angulum ani.

370. P. N. G. alis dentatis supra fuscis: anticis ocellis duo- *Fidia*.  
bus punctisque duobus albis, posticis subtus striga  
angulata atra.

Alae posticae subtus fusco alboque variae striga sesqui  
altera angulata atra.

371. P. N. G. alis dentatis supra fuscis: anaicis ocellis duo- *Fauna*.  
bus punctisque duobus albis, posticis subtus griseis.

*Papilio Fauna* Esp. pap. tab. 63. fig. 4.

Habitat in Germaniae Pinetis Mus. Dom. Romanii.

Nimis affinis P. Fidia at duplo minor. Alae supra omnes  
fuscæ, anticis ocellis duobus minoribus iride flau-  
scente, saepe coecis et inter ocellos puncta duo alba,  
posticis puncto uno alteroue obsoleto albo puncto-

que distinctiori atro. Subtus ocelli anteriorum maiores. Posticae griseae.

- Feronia*. 372. P. N. G. alis dentatis supra coeruleo fusco alboque marmoratis, omnibus ocellis sex.  
Cram. Inf. 31. tab. 362. fig. A. B.

- Maera*. 373. P. N. G. alis dentatis fuscis vtrinque anticus sesqui ocello, posticis ocellis supra tribus subtus sex.  
Varietas Petropolitana duplo minor alis anticus supra absque disco fulvo tempore vernali volans. Dom. Boeber.

- Roxelana* 374. P. N. G. alis dentatis fuscis supra coecis, posticis subtus vndatis ocellis septem: interiori pupilla gemina.

- Zelima*. 375. P. N. G. alis angulatis flavis fusco subfasciatis, posticis vtrinque ocellis sex, subtus striga alba.

- Terea*. 376. P. N. G. alis angulatis dentatis supra fuscis: fascia fulua, anticusque striga punctorum alborum, posticis ocellorum.

- Laodice*. 377. P. N. G. alis angulatis supra nigris: fascia vtrinque virescente: striga punctorum ocellatorum.

- Lampetia* 378. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticus fascia fulua; posticis ocellis sex coecis Linn. Syst. Nat. 2. 775. 160. Mus. Lud. Nr. 104.

Clerk. Icon. tab. 39. fig. 2.

Cram. Inf. 30. tab. 349. fig. A. B.

Habitat in India orientali.

- Glycerie*. 379. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticus fascia fulua, subtus anticus ocello, posticis duobus coecis.

Habitat in India orientali Dom. Boeber.

Magnus fuscus: Alae anticae fuscae apice obscuriores fascia fulua punctisque duobus albis. Posticae fuscae maculis aliquot marginalibus fuluis. Subtus omnes marmoratae, anticus fascia flavescente obsoleta ocelloque magno atro coeco apicis. Posticae ocellis duabus distinctioribus griseis coecis.

- Megaera*. 380. P. N. G. alis dentatis luteis fusco fasciatis: anticus ocello, posticis supra quinis subtus sex.

*Larua villosa viridis pallido striata: cauda bifida.*

381. P. N. G. alis dentatis fuscis luteo maculatis vtrinque *Aegeria*.  
anticis ocello, posticis supra ocellis subtus punctis  
quatuor.
- Larua* cauda bifida.
382. P. N. G. alis dentatis fuscis flavo maculatis vtrinque *Xiphia*.  
anticis ocello posticisque supra tribus subtus quatuor.
383. P. N. G. alis dentatis fuluis apice nigris albo macu-  
latis, posticis ocellis supra quinque coecis, subtus  
septem pupillatis. *Minerua*.
384. P. N. G. alis dentatis supra fuscis immaculatis sub- *Ocypete*.  
tus glaucis: strigis tribus obscuris, posticis ocellis  
quinque.
385. P. N. G. alis dentatis supra albis apice fuscis, subtus *Ocirrhoe*.  
fuscis: fasciis duabus albis, posticis ocellis quinque.
386. P. N. G. alis subdentatis fuscis ocello vnico: posticis *Penelope*.  
subtus duobus.
387. P. N. G. alis subdentatis fuscis: posticis coerulescenti- *Arnaea*,  
bus: subtus ocellis quinque.
388. P. N. G. alis dentatis fuscis coeruleo micantibus: sub- *Atlita*.  
tus fuluis; strigis vndatis glaucis, posticis ocellis  
quinque coecis.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

**Medius.** Alae omnes supra fuscae coeruleo colore ni-  
cantes. Posticae maculis tribus submarginalibus  
fuluis. Subtus omnes obscure fuluae strigis pluri-  
mis vndatis glaucis. Punctum distinctum glaucum  
versus apicem alae anticae. Ocelli quinque cocci in  
posticis, quae ante marginem glaucescunt.

389. P. N. G. alis angulatis pallidis: strigis vndatis fuscis *Iatro-*  
anticis ocello vnico, posticis duobus. *phae*.
390. P. N. G. alis dentatis cinerascentibus: supra anticas *Paome-* *Laome-*  
ocellis sex, posticis quinque: quibusdam coecis. *dia*.
391. P. N. G. alis dentatis fuscis subtus fasciatis: posticis *Libye*.  
ocellis sex; pupilla argentea.
392. P. N. G. alis dentatis concoloribus griseis: singulis *Hedonia*.  
ocellis sex ferrugineis.

Cram. Inf. 32. tab. 374. fig. E. F.

*Deganaira* 393. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis ocellis vtrinque quinque, posticis sex fasciaque alba repanda.

*Larua villosa viridis pallido lineata*: cauda bifida.

*Tullia*. 394. P. N. G. alis dentatis fuscis: maculis ocellaribus, subtus fascia violacea, posticarum ocellis duobus.

*Pegala*. 395. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis fascia rufa ocelloque unico, posticis supra ocello, subtus sex.

*Briseis*. 396. P. N. G. alis dentatis fuscis viridi micantibus: fascia alba, anticis ocellis duobus, posticis coecis.

Esp. pap. 1. tab. 26. fig. 1. 2.

*Papilio Ianthe* Pall. Itin.

*Manto*. 397. P. N. G. alis integris fuscis: punctis ocellaribus antearum quatuor, posticarum tribus, posticis subtus cinereis fusco vndatis.

*Papilio Manto* Wien. Verz. 169. 15.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

*Medius*. Antennae supra fuscae subtus albidae clava ferruginea. Alae supra fuscae coeruleo micantes punctis ocellaribus atris iride ferruginea. Subtus anticae disco ferrugineo, posticae cinereae strigis duabus vndatis punctisque duobus fuscis.

*Autonoe*. 398. P. N. G. alis dentatis fuscis flavo subfasciatis ocellisque duobus pupillatis, anticis subtus basi fuscis.

*Papilio Autonoe* Esp. pap. tab. 86. fig. 1. 2. 3.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Nimis affinis P. Semele. Alae supra fuscae anticis fascia maculari flavescente, posticis striga albida. Ocelli duo distincti nigri pupilla alba. Alae anticae subtus fuscae fascia lata flava ocellis duobus anteriore maiore pupillato.

*Alcyone*. 399. P. N. G. alis dentatis fuscis flavo fasciatis: anticis vtrinque ocellis duobus, posticis subtus marmoratis.

*Papilio Agave* Esp. pap. tab. 84. fig. 4.

Habitat in Russiae australioris montosis Dom. Boeber.

Nimis affinis P. Semele at fascia alarum distinctior, maior striga nigra terminata. Alae minus dentatae ciliis albidioribus, et alae anticae subtus haud disco rufo baseos ut in P. Semele, sed totae flavescentes strigis nigris.

400. P. N. G. alis dentatis fascia maculari fulua ocellisque *Semele*.  
duobus: anticis subtus disco baseos fuluo.  
Alae anticae subtus basi fuluae. Ocelli paginae superioris saepius coeci.
401. P. N. G. alis dentatis supra fusca: fascia maculari *Arethusa*.  
rufa: anticis vtrinque ocello unico.  
*Papilio Arethusa* Esp. pap. tab. 69. fig. 3. 4.  
Wien. Verz. 169. 16.  
Habitat in Germania Mus. Dom. Romani.  
Simillimus P. *Semele*. Alae omnes supra fuscae fascia communis e maculis quatuor fuluis. Dentes albo nigroque varii. Oculus parvus coecus alae anticae. Subtus anticae fuscae disco ferrugineo ocello maiori pupillato. Posticae griseae.
402. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia pallida, anticis *Hermione* ocellis supra duobus, subtus unico.  
*Papilio Hermione* Wien. Verz. 169. 22.  
Confer. *Papilio Alyone* Wien. Verz. 169. 21,  
Esp. pap. 1. tab. 8. fig. 2.  
vix distinctus quamvis minor.  
*Metamorphosis* sub terra.  
*Larua grisea* linea dorsali atra, cauda bifida.
403. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia vtrinque alba, anticis ocello unico. *Circe*.  
Esp. pap. tab. 39. fig. 2.  
*Metamorphosis* sub terra.
404. P. N. G. alis dentatis fuscis concoloribus: anticis ocellis duobus violaceis. *Phaedra*.  
Wien. Verz. 169. 19.  
Habitat in Auenia elatori.  
*Metamorphosis* sub terra.  
*Larua grisea* lineis duabus dorsalibus macularum nigrarum, cauda bifida.
405. P. N. G. alis dentatis fusca: anticis ocello obsoleto, *Periboca*.  
subtus striga flauescens, posticis punctis ocellariis atris.
406. P. N. G. alis caudato dentatis fuluis nigro maculatis, *Arfinoe*.  
posticis ocellis vtrinque duobus.
407. P. N. G. alis caudato dentatis fuscis subtus vndatis: *Panthera*  
posticis ocellis duobus disci, quinque marginalibus coerulescentibus.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

*Medius.* Corpus fuscum. Alae dentato caudatae supra nigrae margine fusco, subtus vndatae. Posticae ocellis duobus paruis disci pupilla coerulecente, apice cinereo fuscescentes ocellis quinque nigris pupilla coerulecente.

- Merope.* 408. P. N. G. alis dentatis fuluis apice nigris: ocello uno, posticis subtus cinereis: ocellis tribus minutissimis.

- Ligea.* 409. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia rufa vtrinque anticus ocellis quatuor, posticis tribus, subtus albo maculatis.

*Papilio Alexis* Esp. pap. tab. 44. fig. 1. 2.

Naturf. 8. tab. 3. fig. 6.

Habitat in Europae Gramine.

Distinctus maculis albis in pagina inferiore alae posticae. Variat rarius fascia cinerea loco fuluae.

*Larua* villosa viridis linea dorsali nigra, capite flavo, cauda bifida.

- Medusa.* 410. P. N. G. alis subdentatis concoloribus fuscis omnibus fascia maculari flava; ocellis subquatuor.

*Papilio Medusa* Wien. Verz. 167. 10.

*Papilio Ligea* Esp. Pap. 1. tab. 7. fig. 2.

Alb. Ins. tab. 5. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 183. fig. 2. 3.

Naturf. 8. 113. I.

Habitat in Austriae Punica Dom. Schieffermyller.

Statura omnino praecedentis. Alae omnes fuscae, immaculatae, at ante marginem fascia macularis, et in hac ocelli iride atra pupilla alba. Numerus eorum variat. Corpus atrum, immaculatum.

- Epiphron* 411. P. N. G. alis integris nigris: fascia rubra: anticis supra ocellis duobus subtus tribus, posticis supra tribus subtus quinque.

*Papilio Epiphron* Knoch Beytr. 3. tab. 6. fig. 7.

Habitat in Germaniae montosis Dom. Boeber.

Statura omnino et summa affinitas P. Medusae, at duplo fere minor. Corpus atrum antennis subtus albis. Alae supra nigricantes fascia fulua antearum in primis valde abbreviata, ocellis duobus approximatis, posticae ocellis tribus omnibus pupillatis.

Subtus

Subtus contolores at anticis ocellis tribus, posticis ocellis quinque. Numerus ocellorum alae anticae variat.

412. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia rufa ocellata, posticis subtus fuscis: fascia cinerea. *Blandina*

*Papilio Modea* Wien. Verz. 167. 7.

*Papilio Ligea* Scop. carn. 436.

*Papilio Aethiops* Esp. pap. tab. 25. fig. 3. ♂  
tab. 63. fig. 1. ♀

Habitat in Germania Mus. Dom. Romani.

Nimis affinis P. Ligeae. Differt tamen alis posticis vix ocellatis fuscis fascia cinerea absque maculis albis.

413. P. N. G. alis integris fuscis: ocellis sex, posticis cinea- reo venosis. *Afra*.

*Papilio Afer* Esp. pap. tab. 83. fig. 4. 5.

Habitat in Russiae australioris desertis Dom. Boeber.

Statura et magnitudo omnino P. Blandinae. Antennarum clava subtus excavata. Alae omnes supra nigrae ocellis circiter sex. Subtus anticae nigrae basi litura ferruginea ocellisque 5. 6 duobus maioribus, posticae fuscae cinereo venosae ocellis sex vel septem.

414. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia maculari fulua; *Erina*. punctis ocellaribus nigris.

*Papilio Erina* Wien. Verz. 169. 15.

*Papilio Manto* Esp. pap. tab. 70. fig. 2. 3.

Habitat in Germania Mus. Dom. Romani.

Affinis P. Ligea at distinctius corpore minore ocellisque coecis vel potius punctis ocellaribus.

415. P. N. G. alis integris atris: anticis vtrinque fascia rufa; ocellis duobus, posticis subtus fascia dentata ci- nerea. *Arachne*.

*Papilio Arachne* Wien. Verz. 169. 18.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Statura omnino P. Erinae. Alae omnes atrae coeruleomicantes. Anticae vtrinque fascia abbreviata rufa et in hac ocelli duo approximati pupilla alba. Posticae supra atrae fascia parua maculari rubra, interdum puncto uno alteroue ocellari. Subtus atrae fascia dentata cinerea. Antennae supra nigrae, subtus albae.

- Pyrrha.* 416. P. N. G. alis integris fuscis: fascia rubra; anticarum nigro punctata, posticarum maculari.  
*Papilio Pyrrha* Wien. Verz. 167. 9.  
 Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.  
 Nimis praecedentibus affinis. P. *Ligea paullo minor*.  
 Antennae supra nigrae, subtus albae. Alae omnes supra fuscae fascia rufa, quae tamen margines haud attingit. In hac fascia alae anticae puncta aliquot nigra, posticae macularis, immaculata. Corpus immaculatum.
- Cassiope.* 417. P. N. G. alis integris fuscis: fascia rufa; punctis tribus ocellaribus nigris, posticis subtus punctis solis.  
 Habitat in Austriae Gramine Dom. Schieffermyller.  
 Praecedenti affinis at paullo minor. Corpus nigrum.  
 Antennae supra nigrae, subtus pallidae. Alae omnes supra nigrae fascia marginis haud attingente, in posticis in primis maculari rufa et in hac puncta tria nigra. Subtus anticae concolores, posticae punctis tribus at absque fascia rufa.
- Arete.* 418. P. H. G. alis integris fuscis: fascia rufa, posticis vtrinque striga punctorum alborum.  
 Habitat in Austriae montosis Dom. Schieffermyller.  
 Statura omnino praecedentis. Corpus nigrum abdome subtilis griseo. Alae supra nigrae anticis fascia lata rufa, quae tamen margines haud attingit et in fascia puncta subtria ocellaria alba. Posticae nigrae fascia obsoleta rufa et in hoc puncta quatuor distincta alba. Subtus anticae disco ferrugineo punctis tribus ocellaribus albis, posticae griseo virescentes striga e punctis septem albis.
- Salome.* 419. P. N. G. alis anticis fuscis: fascia rufa: anticis ocello posticis tribus, subtus striga dentata alba ocellisque quinque.  
*Papilio Pasiphae* Esp. pap. tab. 67, fig. 4.  
 Habitat in Gibraltar Dom. Boeber.  
 Statura praecedentium at distinctus alis posticis subtus nigris striga videntata alba et pone hanc ocelli quinque parui pupilla alba. Ocellus alae anticae in nostris pupilla simplici.
- Iole.* 420. P. N. G. alis dentatis fuluis nigro punctatis: posticis subtus ocellis quinque; ultimo bipupillato.

421. P. N. G. alis dentatis albo nigroque variis; subtus anticus ocello unico, posticis quinque.  
*Galathea.*  
 Numerus ocellorum variat.  
*Varietas fusca albo varia in Russia australiori Dom.*  
 Boeber.  
*Puppa nigro binaculata.*
422. P. N. G. alis dentatis albis nigro strigosis: anticus ocello unico, posticis quinque.  
*Arge.*  
*Papilio Arge* Esp. pap. tab. 84. fig. 1. 2.  
 Habitat in Russia australioris desertis Dom. Boeber.  
 Statura et summa affinitas P. Galatheae. Alae omnes albae strigis plurimis vndatis nigris. Alae anticae vtrinque ocello paruo superiori coeco. Posticae vtrinque quinque pupillatis.
423. P. N. G. alis dentatis fuscis: subtus striga obliqua alba, anticus ocellis duobus, posticis sesquitertiis.  
*Hesione.*
424. P. N. G. alis dentatis supra nigris: fascia communis *Egaea.* alba, posticis subtus ocellis duobus.
426. P. N. G. alis subdentatis supra viridibus, posticis *Serina.* subtus disco albo: ocellis duobus.
426. P. N. G. alis dentatis fuscis: subtus coeruleis nigro *Doris.* fasciatis; ocellis trium parium.
427. P. N. G. alis dentatis supra fuscis albo subfasciat, *Ianthe.* posticis subtus ocellis quinque coecis.
428. P. N. G. alis dentatis fuscis: disco fulvo, anticus vtrinque ocello nigro: pupilla gemina, posticis subtus punctis ocellaribus niueis.  
*Pilosellae.*  
*Pipilla Herse* Wien. Verz. 320. 24.
429. P. N. G. alis subdentatis fuscis: disco fulvo: anticus vtrinque ocello nigro bipupillato, posticis subtus griseo variis.  
*Ida.*  
*Papilio Ida* Esp. pap. tab. 92. fig. 2. at alae magis dentatae.  
 Habitat in Gibraltar Dom. Boeber.  
 Nimis affinis P. Pilosellae at minor alis subintegris at omnino absque punctis albis in pagina inferiori alae posticae.
430. P. N. G. alis dentatis fuscis: disco albido, subtus albido: anticus ocellis duobus, posticis septem.  
*Melusina.*  
 Habi-

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

*Paruuſ*. Antennæ ſupra nigrae, ſubtus cinereae. Alae ſupra fuſcae liimbo obſcure albo. Subtus anticae albidæ margine exteriori fuſco ocellisque duobus, altero ad marginem exteriorem, altero maiore ad interiorem. Posticae albae margine poſtico ſtrigofo ocellisque ſeptem, tertio quintoque maioriibus.

*Cadma*. 431. P. N. G. alis dentatis fuluis: poſticis ſubtus diſeo albo: ocellis duobus: pupilla didyma coerulea.

*Laothoë*. 432. P. N. G. alis angulato dentatis: poſticis ſupra fuſcis; puncto albo, ſubtus ocellis ſex coeruleis.

*Ianira*. 433. P. N. G. alis dentatis fuſcis: anticas ſubtus luteis; ocello vtrinque vniſo, poſticis ſubtus punctis tribus.

*Papilio Iurtina* alis dentatis fuſcis: anticas ſupra litura flava, ocello vtrinque vniſo, poſticis coecis. Sp. Inf. 2. 81. 359. pura ſexus varietas.

*Clymene*. 434. P. N. G. alis dentatis fuſcis: litura ferruginea, poſticis ocellis ſupra ſubtribus, ſubtus ſubfeptem.

*Papilio Clymene* Esp. pap. tab. 85. fig. 1. 2. ♂  
fig. 3. ♀

Habitat in Russiae australioris ſylvaticis Dom. Boeber.  
Statura et magnitudo omnino P. Iurtinae. Alae anticae fuſcae diſco rufo vtrinque ocello ſubtus pupillato. Poſticae fuſcae maculis quatuor fuluis et in his ocelli duo aut tres coeci, ſubtus fuſceſcentes ocellis ſeptem coecis, e quibus 2. 3. ſaepe minutissimi vix apparent, ultimi duo connati.

*Eudora*. 435. P. N. G. alis dentatis fuſcis: anticas vtrinque diſco ferrugineo: ocello maris vniſo, faeminae duobus.

*Papilio Eudora* Esp. pap. tab. 69. fig. 1. 2. ♂ 45. ♀ 1.  
Habitat in Germaniae ſylvis Dom. Boeber.

Nimis affinis P. Ianiræ at paullo minor. Differt diſco alae anticae vtrinque ferrugineo. Poſticae ſubtus obſcure griseae, immaculatae.

*Tisiphone*. 436. P. N. G. alis dentatis fuſcis: anticas vtrinque ocellis duobus, poſticis ſex: pupilla violacea.

Ocelli alae anticae connati. Alae poſticae ſtrigis angulariſtas.

*Generilla*. 437. P. N. G. alis dentatis nigris albo maculatis: fascia communi rufa, poſticis ocellis quatuor.

438. P. N. G. alis dentatis nigris: anticis fascia punctisque *Itea*.  
flavis, posticis disco rufa: ocellis quatuor.
439. P. N. G. alis dentatis fuscis: posticis supra ocellis *Iortlandia*.  
quinque coecis, subtus septem pupillatis.
440. P. N. G. alis dentatis fuluis albo nigroque variegata: *Cardui*.  
tis: posticis subtus ocellis quatuor.
441. P. N. G. alis subangulatis fuluis albo nigroque variis, *Huntera*.  
posticis subtus albo reticulatis ocellisque duobus.
442. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis subtus ocellis *Allionia*.  
duobus; posteriori coeco.
443. P. N. G. alis dentatis subconcoloribus fuscescentibus: *Tulbaghia*.  
fascia lutea posticis ocellis quinque.
444. P. N. G. alis crenatis nigris concoloribus: posticis *Pipleis*.  
disco fulvo; ocellis septem.
445. P. N. G. alis crenatis nigris: area sanguinea, posticis *Claudia*.  
subtus marmoratis: ocellis septem.
446. P. N. G. alis caudato dentatis fuscis: anticis fascia *Rohria*.  
alba, posticis subtus ocellis septem; plurimis albo  
punctatis.

Habitat in India Dom. Vahl.

Medius. Alae omnes supra fuscae. Anticae fascia alba, quae tamen marginem posticum haud attingit, maculisque duabus apicis. Margo albo maculatus. Posticae fere caudatae margine tenuissime albo. Subtus fuscae, glauco vndatae, anticae fascia alba ocellis tribus atris coecis, posticae ocellis septem anteriori maiori atro pupilla alba, tunc tribus oblongis punctis nigris albo foedis, denique quinto maiori, coeco et tandem ultimis duobus connatis albo punctatis. Antennae clava fusca apice ferruginea.

447. P. N. G. alis dentatis flavis apice nigris: posticis subtus fuscis albo vndatis; ocellis quatuor intermediis *Blomfieldia*. coecis.
448. P. N. G. alis angulatis supra fuscis: anticis disco flavescente: ocello atro; pupilla gemina. *Bankia*.
449. P. N. G. alis angulatis fuscis: anticis ocello sesquialtero, posticis supra duobus, subtus quatuor. *Solandra*

- Polydecta* 450. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis ocello, posticis supra duobus, subtus septem.
- Tolumnia* 451. P. N. G. alis dentatis atris: posticis subtus strigis ferrugineis coeruleisque, ocellis quinque: postico maiori.
- Morna.* 452. P. N. G. alis dentatis dentatis fuscis: posticis ocellis vtrinque duobus punctisque tribus albis.
- Juliana.* 453. P. N. G. alis dentatis fuscis albo maculatis: posticis vtrinque ocellis duobus Sp. Inf. App. 503.
- Leda.* 454. P. N. G. alis angulatis fuscis: anticis supra ocello geminato, subtus griseo reticulatis, posticis ocellis sex.  
*Papilio Leda* Cram. pap. 25. tab. 292. fig. A.
- Lena.* 455. P. N. G. alis subdentatis fuscis: posticis postice atris albo coeruleo que punctatis, subtus biocellatis.  
Cram. Inf. 25. tab. 291. fig. A. B. ♂  
Alae maris caudatae vti in *P. Philoctete*, forte ad Equites emendandus.
- Dyndimene.* 456. P. N. G. alis dentatis fuscis: posticis supra violaceis; punctis quatuor albis.
- Iphita.* 457. P. N. G. alis angulato dentatis fuscis obscurius fasciat: omnibus subtus ocellis quinque.
- Europa.* 458. P. N. G. alis angulatis fuscis: posticis subtus fascia ocellari albida.
- Callisto.* 459. P. N. G. alis dentatis atris: posticis fascia sanguinea, ocellis supra quinque subtus septem.
- Iris.* 460. P. N. G. alis dentatis fuscis coeruleo micantibus vtrinque fascia albida interrupta ocello quo unico, anticis supra coecis.  
*Papilio Iris* Wien. Verz. 171. 1.  
*Papilio suspirans* Pod. Mus.  
Fascia posticæ alba, abbreviata, vñidentata. Ocellus vnicus, coerulescens, semiclausus.
- Ila.* 461. P. N. G. alis dentatis coeruleo micantibus vtrinque fascia alba interrupta: omnibus ocello vnico.  
*Papilio Ila* Wien. Verz. 172. 2.  
*Papilio Iris* Esp. Pap. tab. 37. fig. 1.  
tab. 43. fig. 1.
- Habitat in Germaniac Salice Dom. Schieffermyller.

Differre a P. Iris videtur. Differt ocello distincto in pagina inferiori alae posticæ minus distinctis fasciaque haud dentata, nec ocello compresso sed sesqui altero. Variat colore nigro albo fasciato et flavo fuscoque vario, semper tamen coeruleo micanter. Faeminae magis vnicolores minus micant.

462. P. N. G. alis dentatis fuscis coeruleo micantibus: posticis ocello vnico, subtus brunneis: margine rubente. *Iole.*

*Papilio Iole* Wien. Verz. 172. 3.

*Papilio Iole* Esp. Pap. tab. 46. fig. 1. at pagina inferior alatum differt.

Habitat in Austria Dom. Shieffermüller.

Statura et summa affinitas praecedentis. Alae omnes supra fuscae, coeruleo micanter. Maculae duae distinctae albæ versus apicem alae anticae et ocellus parvus iride ferruginea versus angulum ani. Subtus omnes basi apiceque rubentes in medio brunneae. Maculae duae magnæ nigrae albæ innatae versus marginem crassiorem alae anticae.

\* *Nymphales phalerati.*

463. P. N. P. alis dentato caudatis: anticis basi rubris apice nigris albo maculatis. *Acheronta.*

464. P. N. P. alis dentato caudatis rufis: striga marginaque postico fuscis. *Troglo-dita.*

465. P. N. P. alis bicaudato dentatis fuluis: strigis nigris, *Thetys.* posticis subtus glaucis nigro punctatis.

466. P. N. P. alis dentatis fuscis albo fasciatis maculatisque, *Populi.* subtus luteis albo fasciatis: maculis coerulescentibus.

*Papilio Populi* Wien. Verz. 172. 1.

*Faemina* fascia alba maiore distinctiore.

In Russia frequentissimus fascia etiam marum distinctiore.

467. P. N. P. alis dentatis nigris: area communi rufa, posticis subtus fuscis atro maculatis. *Chrysippa*

468. P. N. P. alis dentatis nigris albo maculatis: area communi rufa, subtus basi testaceis nigro coeruleo eque varlis. *Cydippe.*

469. P. N. P. alis dentatis fuscis: fascia strigaque angulato dentatis albis. *Althea.*

*Penthesi-* 470. P. N. P. alis dentatis atris albo maculatis: area communi rufa, posticis subtus fasciis flauis albaque nigro maculatis.

*Berenice.* 471. P. N. P. alis dentato caudatis nigris: fascia communi rubra, posticis subtus nigro albo ferrugineo flauo-que variis.

*Papilio Berenice* Drury Inf. 3. tab. 11. fig. 1. 2.

*Papilio Zingha* Cram. Inf. 27. tab. 375. fig. B. C.

Habitat in Sierra Leon Africæ Mus. Dom. Banks.

Antennæ extrorsum crassiores nigrae. Palpi subtus albi apice nigri. Thorax niger apice albo punctatus. Alae omnes nigrae fascia lata rufa, quae in anticis marginem haud attingit. Puncta aliquot nigra in fascia rubra alae anticae. Lunulae aliquot rubrae punctaque alba ad marginem posticum alae posticae. Alae anticae subtus subrufescentes, nigro maculatae, apice fuscae albo striatae. Posticae variegatae basi albidae nigro punctatae.

*Semire.* 472. P. N. P. alis dentatis subconcoloribus fascia viridi fuluoque maculatis basi fuluis nigro punctatis.

*Cyane.* 473. P. N. P. alis dentatis nigris: anticis fascia, posticis disco nigro punctato albis.

Conf. *Papilio Cyane* Cram. Inf. 25. tab. 295. fig. C. D.

*Vitellia.* 474. P. N. P. alis dentatis nigris subtus albo maculatis.

*Papilio Vitellia* Cram. Inf. 30. tab. 349 fig. E. F.

Habitat in Amboina.

Magnus: Corpus nigrum antennis extrorsum crassioribus. Alae omnes supra nigrae margine postico fuscō, immaculato, subtus nigrae punctis numerosis albis, quibusdam iride coerulea cinctis. Margo albo strigosus.

*Zenobia.* 475. P. N. P. alis dentatis nigris: fascia communi alba, posticis subtus basi flauis nigro striatis.

*Antiopa.* 476. P. N. P. alis angulatis nigris: limbo albido.

Vere prouenientes limbo albo, aestate limbo flauo.

*Zingha.* 477. P. N. P. alis angulato dentatis fuscis apice nigris: strigis coeruleis macularique fulua.

Habitat in Sierra Leon Dr. Pflug.

Magnitudo et statura P. Atalantæ. Alae omnes basi fuscae apice nigrae et in hac fascia coerulea, tunc ma-

macularis fulua puncto atro foeta, quae in anticis punctis duobus albis terminatur. Strigae denique duas coeruleas in anticis maculares, in posticis vndatae. Praeterea macula fulua coeruleae innata ad medium marginis crassioris alae anticae subtus omnes fusco cinereoque vndatae fascia fere obsoleta ferruginea punctis ocellaribus.

478. P. N. P. alis dentatis fuluis: limbo nigro albo inaculato. *Protogena nia.*
479. P. N. P. alis dentatis nigris albo maculatis: fascia communis purpurea anticarum vtrinque posticarum marginali. *Atalanta.*
480. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia communis fulua; *Archesia.* anticarum dimidiato coeruleo. Sp. Inf. App. 504.
481. P. N. P. alis dentatis nigris: fascia coerulecente. *Charonia.*
482. P. N. P. alis dentatis conicoloribus atris: posticis fascia maculari sanguinea. *Papilio Hyperia* Cram. Pap. 20. tab. 236. fig. E. F.
483. P. N. P. alis dentatis fuscis: fascia communis fulua; *Grosope.* anticarum punctis duobus nigris.
484. P. N. P. alis dentatis fuscis: omnibus subtus striga *Echo.* punctorum alborum.
485. P. N. P. alis dentatis fuscis: disco angulato fuluo nigro punctato, subtus inaculis baseos flavis. *Ottavia.*
486. P. N. P. alis dentatis obscure virescentibus albo nigro rufoque maculatis. *Lubentia.*
487. P. N. P. alis repandis viridi aeneis: anticis punctis *Ianassa.* nigris, subtus flavescentibus punctis baseos nigris. Habitat in Africa Mus. Dr. Hunter.
- Corpus medium fuscum palpis ferrugineis. Alae omnes supra virides nitidae margine obscuriore et praeterea punctis tribus baseos alae anticae. Apex alae terminatur puncto albo. Subtus omnes flavescentes punctis tribus baseos strigaeque postica nigris.
- Potius forte ad *Trojanos* emendandus.
488. P. N. P. alis angulatis fuluis nigro maculatis: anticis *polychlos.* supra punctis quatuor nigris. *rosa.* Alae posticae subtus nigricantes puncto centrali albo.

- Valbum.* 489. P. N. P. alis angulatis fuluis nigro maculatis: omnibus supra macula alba, posticis subtus lunula alba.  
*Papilio valbum* Wien. Verz. 176. 7.  
*Papilio C. album* Esp. pap. tab. 62. fig. 3.  
 Habitat in Salice Helix Mus. Dom. Romani.  
 Nimirum affinis praecedenti et forte mera eius varietas.  
 Differt tamen alis magis angulatis macula alba et absque maculis coeruleis marginalibus. Alae subtus vriegatae lunula centrali alba.  
*Larua spinosa* lineis longitudinalibus flauis atrisque interruptis, capite nigro.
- Vrticae.* 490. P. N. P. alis angulatis fuluis nigro maculatis: anticis supra punctis nigris tribus.
- Clytemne-  
stra.* 491. P. N. P. alis angulatis nigris subtus albo maculatis: anticis vtrinque fascia flaua,  
*Cram. Pap. 31. tab. 364. fig. A. B.*
- Dirce.* 492. P. N. P. alis angulatis fuscis: fascia anticarum flauescente, subtus nigro vndulatis.  
 Habitat Cajennae.
- Grogne.* 493. P. N. P. alis dentatis fuluis: punctis margineque albo punctato nigris, subtus griseis,  
 Margo posticus alae anticae flauus.
- C. album.* 494. P. N. P. alis angulatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus C. albo notatis.
- C. aureum* 495. P. N. P. alis dentato caudatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus C. aureo notatis.
- Merione.* 496. P. N. P. alis angulatis fuluis: margine fusco, posticis subtus fuscis: maculis strigisque albis coeruleisque.
- Ariadne.* 497. P. N. P. alis angulatis fuluis: strigis nigris vndulatis, anticis puncto marginali albo.
- Portia.* 498. P. N. P. alis dentato caudatis, subtus griseis nigro irroratis.
- Bolina.* 499. P. N. P. alis dentatis nigris: anticis maculis duobus, posticis solitaria albo coeruleis.
- Clytia.* 500. P. N. P. alis dentatis nigris: anticis margine exteriori albo maculatis, posticis albo luteoque triplici ordine.

501. P. N. P. alis dentatis supra fuscis: posticis apice ferrugineis, subtus puncto albo. Sp. Inf. App. 504.  
Alae anticae apice cyaneo maculatae.
502. P. N. P. alis dentatis fuscis: posticis brunneis; angulo ani coerulecente: striga nigra. *Monina*.  
Habitat in India orientali Doni. Lund.  
Statura omnino P. vndularis at duplo minor. Alae anticae fuscae maculis aliquot baseos obsoletis ferrugineis. Ad angulum ani litura coerulescens. Posticae basi fuscae, apice brunneae angulo ani late coerulecente striga vndata nigra. Subtus omnes cinereae lunula baseos strigaque postica nigris.
503. P. N. P. alis angulato dentatis supra fuscis albo punctatis: fascia rubra; linea vndata nigra. *Amathea*.  
Habitat Cajennae, Surinami.
504. P. N. P. alis dentatis flavis nigro variis apice radatis: posticis punctis septem rubris. *Hypsipyle*.  
*Papilio Ruma* Esp. Pap. tab. 15. fig. 1.  
tab. 53. fig. 2.  
Roef. Inf. 4. tab. 7. fig. 1. 2.  
Schaeff. Icon. tab. 120. fig. 1. 2.  
*Larua* flava nigro punctata: spinis carnosis verticellatis rubris, apice nigris.  
*Puppa* pallida, capite obtuso.
505. P. N. P. alis dentatis variegatis: supra anticis punctis *Rumina*. sex, posticis quatuor rubris.  
*Papilio Ruma* *australis* Esp. Pap. tab. 72. fig. 4.
506. P. N. P. alis dentatis fuscis: anticis punctis septem *Erosine*. posticis tribus rubris, subtus anticis punctis tribus argenteis.  
*Papilio Ruma* Drury Inf. I. tab. 2. fig. 1.  
*Papilio Salmoneus* Cram. Inf. 29. tab. 341. fig. D. E. at bicaudatus.  
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
- Minor P. Ruma. Alae omnes supra fuscae maculis rubris. Subtus anticae fuscae disco fulvo nigro maculato maculis tribus pupilla alba, posticae fuscae albo maculatae.
507. P. N. P. alis dentatis concoloribus fulvis: punctis numerosis fuscis. *Flegia*.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Alae omnes supra fuluae punctis numerosissimis fuscis, subtus concolores at paulo pallidiores.

*Meleagris.* 508. P. N. P. alis subdentatis albo punctatis supra fuscis subtus flauescensibus.

*Papilio Meleagris* Drury Inf. 3. tab. 27. fig. 3. 4.

*Melantha* 509. P. N. P. alis dentatis supra fuscis albo punctatis, subtus brunneis.

*Allica.* 510. P. N. P. alis dentatis subconcoloribus obscure fuluis: punctis nigris numerosis albo foetis.

*Papilio Fleggus* Cram. Inf. 24. tab. 280. fig. E. F.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

*Parua.* Antennae nigrae albo annulatae clava nigra apice fulva. Corpus fuscum. Alae omnes obscure fuluae maculis numerosis nigris puncto albo notatis.

*Leucothoe* 511. P. N. P. alis dentatis supra fuscis: fasciis tribus albis, subtus luteis: fasciis tribus albis nigro notatis.

*Medea.* 512. P. N. P. alis dentatis falcatis nigris: fasciis tribus macularibus flauis, angulo ani rubro.

*Melicerta* 513. P. N. P. alis dentatis concoloribus atris albo punctatis fasciaque communi alba anticarum interrupta.

*Papilio Agatha* Cram. Pap. 28. tab. 327. fig. A. B.

*Papilio Blandina* Cram. Pap. 28. tab. 327. fig. E. F.

*Aceris.* 514. P. N. P. alis dentatis albo fasciatis supra nigris subtus fuluis.

*Papilio Aceris* Esp. pap. tab. 82. fig. 1. Mus. ex India.  
tab. 81. fig. 3. 4. minor ex Hungaria.

Habitat in Acere Europae, Asiae.

Maior a minore vix distinctus.

*Nauplia.* 515. P. N. P. alis subdentatis subconcoloribus nigris: anticis supra maculis quatuor, posticis fascia albis Linn. Syst. Nat. 2. 783. 197. Mus. Lud. Vlr. 309.

Clerk. Iun. tab. 46. fig. 1. 2.

Cram. Pap. 27. tab. 316. fig. D. E. F. G.

Habitat in America meridionali.

*Heliodore* 516. P. N. P. alis dentatis fuluis: fasciis tribus nigris.

Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentium at parvus. Corpus cum antennis nigrum. Alae omnes fuluae fasciis tribus nigris marginem nigrum haud attingentibus, prima in margine alae anticae, secunda communis, tertia in medio alae posticae. Margo niger striga fulua. Subtus pallide fuluae strigis nigris.

517. P. N. P. alis dentatis albis: margine flavo, posticis *Dorcas*, subtus flavis: fasciis duabus albis.
518. P. N. P. alis dentatis fuscis albo maculatis, subtus maculatis ocellaribus numerosis. *Ophique*.
519. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro fasciatis: posticis *Ilithuia*. subtus fasciis albis nigro maculatis.  
*Papilio Polonice* Cram. pap. 82. tab. 375. fig. G. H.
520. P. N. P. alis dentatis nigris coeruleo nebulosis: anticis fascia vtrinque alba, posticis subtus rubro radiatis, nome. *Amphi-*
521. P. N. P. alis dentatis fuscis: anticis flavo reticulatis, *Opis*. posticis fasciatis.
522. P. N. P. alis dentatis fuscis: maculis ocellaribus, posticis subtus cinereis: punctis duobus strigaque fuscis. *Crithea*.
523. P. N. P. alis dentatis fuscis: anticis maculis sagittatis *Pelea*. albis nigrisque, subtus cinereis: lunulis nigris.  
Habitat in India orientali Dom. Lund.
- Medius. Antennae nigrae extrorsum crassiores. Corpus fuscum. Alae anticae fuscae lunulis aliquot bascos nigris, versus apicem fascia lata e maculis sagittatis albis nigrisque. Posticae fuscae lunulis nigris et versus marginem interiorem litura alba e fascia alarum antifarum. Subtus omnes cinereae lunulis inprimis posticarum plurimis nigris. Fascia alae anticae e maculis albis obsoletior,
524. P. N. P. alis dentatis atris; fascia alba; antifarum *Nerina*. terminata macula rufa.
525. P. N. P. alis dentatis fuscis: fascia communi arcuata *Venilia*. alba marginibus coerulescente.  
Cram. Pap. 19. tab. 219. fig. B, C.
526. P. N. P. alis dentatis atris: fascia coerulea interrupta, *Alimena*. singulis punctis septem albis marginalibus.  
Cram. Pap. 19. tab. 221. fig. A. B. C.

- Phaerusa*. 527. P. N. P. alis dentatis fuluis: fasciis tribus fuscis, antecarum longitudinalibus, posticarum transuersis.
- Hippona*. 528. P. N. P. alis dentato caudatis flavo nigroque variis; posticis punctis quatuor albis.  
Drury Ins. 3. tab. 16. fig. 1. 2.
- Julia*. 529. P. N. P. alis dentatis fuluis: anticis strigis duabus, posticis margine postico nigris.
- Agathia*. 530. P. N. P. alis dentatis supra fuluis subtus glaucis: posticis puncto nigro supra unico, subtus tribus.  
Habitat in India Dom. Boeber.  
Medius, tener. Corpus supra fuscum. Alae anticae supra fuluae apice fuscae, subtus flavescentes glauco nitidulae. Posticae supra fuluae puncto paruo nigro, subtus glaucae lunulis tribus baseos albis punctisque tribus paruis nigris.
- Laura*. 531. P. N. P. alis angulato dentatis fuscis: fascia communis dimidiata fulua, posticis subtus argenteis: fascia niuea.
- Lydia*. 532. P. N. P. alis dentatis flavis supra margine nigro, subtus striga punctorum nigrorum.
- Iphicla*. 533. P. N. P. alis dentatis supra fuscis: fascia communis alba maculaque ferruginea anguli ani.
- Delila*. 534. P. N. P. alis dentatis oblongis fuluis: anticis lunula nigra.
- Dido*. 535. P. N. P. alis dentatis oblongis nigris viridi maculatis, posticis fascia maculisque septem transuersis coerulecentibus.
- Neaerea*. 536. P. N. P. alis dentatis supra fuscis albo maculatis subtus maculis albis linea rubra cinctis.
- Aceste*. 537. P. N. P. alis subdentatis: anticis nigris basi fasciaque flavis, posticis flavis: subtus fasciis fuscis.
- Eurino-me*. 538. P. N. P. alis dentatis nigris albo maculatis, posticis basi albis.
- diffimilis*. 539. P. N. P. alis dentatis dilatato venosis nigris: maculis albis sagittatis, posticis subtus maculis marginalibus luteis.
- assimilis*. 540. P. N. P. alis subrepandis concoloribus nigris: punctis coerulecenti albis, posticis punctis coccineis.

541. P. N. P. alis subrepandis concoloribus: punctis coe- similis.  
ruleſcenti albis versus basin lineatis.
542. P. N. P. alis dentatis nigris albo maculatis, posticis affinis.  
subtus limbo nigro flavo alboque maculato.
543. P. N. P. alis dentatis nigris coeruleſcenti striatis, sub. Lais.  
tus fuscis.
544. P. N. P. alis dentatis anticis atris maculis, posticis Eyclea.  
fascis disco albis.
545. P. N. P. alis repandis virescenti albis: venis limbo- Hippia.  
que nigris.

Habitat in Pulicandor Dom. Banks.

Statura omnino praecedentium. Corpus cuin antennis  
nigrum. Alae omnes subconcolores albo virescentes  
venis margineque omni nigris. Apex alae anticæ  
punctis albis.

546. P. N. P. alis dentatis fuscis concoloribus: margine Panope.  
exteriori albo maculato: angulo ani fuluo.

Cram. pap. 25. tab. 295. fig. E. E.

547. P. N. P. alis dentatis supra fuscis subtus ferrugineis Sibilla.  
nigro maculatis: fascia vtrinque maculari alba.

Wien. Verz. 172. 2.

548. P. N. P. alis dentatis atris coeruleo micantibus fascia Camilla;  
vtrinque maculari alba, posticis subtus basi argentea  
immaculata.

*Papilio Camilla* Wien. Verz. 172. 1.

*Papilio Lucilla* Esp. pap. tab. 38. fig. 2.

*Papilio riularis* Scop. Ent. 444.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Affinis certe P. Sibillæ, a quo tamen differt alis supra  
colore magis atro coeruleo micante et striga puncto-  
rum nigrorum apicem. Subtus alæ omnes fusco fer-  
rugineoque variae basi argentea, immaculata et  
pone fasciam albam striga punctorum nigrorum.

*Larua viridis spinis rubris.*

549. P. N. P. alis dentatis supra fuscis subtus brunneis Lucilla.  
vtrinque fascia maculari alba.

*Papilio Lucilla* Wien. Verz. 173. 4.

*Papilio Camilla* Esp. pap. tab. 59. fig. 1.

*Papilio Sapho* Pall. Iter. 1. App. nr. 62.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller,

Statura et summa affinitas praecedentium. Differt tamen alis anticis supra linea alba interrupta a basi ad fasciam ducta, posticis excepta fascia alba immaculatis. Subtus brunneae posticis basi litura tantum alba et pone fasciam striga lunularum albarum.

*Procris.* 550. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis; fascia alba, subtus variegatis.

*Micalia.* 551. P. N. P. alis dentatis atris flavo maculatis; posticis medio fulvo nigro maculato.

*Maja.* 552. P. N. P. alis dentatis fuscis; anticis albo maculatis posticis immaculatis.

*Erymanth.* 553. P. N. P. alis dentatis fuluis; anticis apice nigris; fascia flava, posticis supra lunulis, subtus striga punctorum ocellatorum.

*Papilio Erymanthis* Drury. Ins. 1. tab. 15. fig. 3, 4.

Habitat in China Mus. Dom. Banks.

*Medius.* Alae anticae basi fuluae, tunc fascia lata flava punctis aliquot nigris, apice nigrae maculis aliquot flavis. Posticae fuluae striga punctorum duabusque lunularum nigrarum. Subtus pallidiores flava vndatae, anticis punctis aliquot nigris, posticis striga punctorum nigrorum lunula violacea albaque,

*Carinen.* 554. P. N. P. alis falcato dentatis fuscis flavo maculatis; anticis apice atris; maculis quatuor albis.

Fyesl. Arch. 2. tab. 2. fig. A. B.

*Martha.* 555. P. N. P. alis dentatis fusco fulvoque variis; anticis lunulis ternatis, posticis fascia albis.

Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.

*Medius.* Antennae nigra clava macula baseos alba, Corpus fuscum. Alae anticae fusco fulvoque maculatae versus marginem posticum lunulis albis triplici serie, quarum interior communis. Posticae fuluae fusco variae, fascia (interdum striga) in medio alba, Versus marginem posticum striga vndulata nigra albae adnata. Subtus pallidae albo fasciatae basique lituris nigris.

*Celtis.* 556. P. N. P. alis angulato dentatis fuscis; maculis fulvis vnicaque alba, posticis subtus griseis.

Esp. pap. tab. 87. fig. 2, 3.

Fyest. Arch. 2. tab. 2. fig. 1, 2, 3.)

3. tab. 2. fig. 1.

Habita

Habitat in Celti australi Europae australioris. Mus. Dom.  
Romani.

Affinis P. Carinenta paullo minor. Alae anticae valde  
angulatae, concolores maculis quatuor fuluis vnicarum  
que pallidiore. Posticae supra fuscae macula vnicarum  
fulua, subtus griseae limeola parua centrali alba.

*Larua* viridis, nigro maculata lineolisque albis.

*Puppa* viridis albo lineaata.

557. P. N. P. alis angulato dentatis fuluis fusco maculatis; *F. album*,  
posticis subtus linea niuea.

*Papilio F. album* Esp. Pap. tab. 87. fig. 1.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Statura et magnitudo P. Celtis. Alae anticae fuluae  
maculis in medio tribus magnis nigris. Margo fu-  
scus. Posticae fuluae macula magna media lituraque  
apicis nigris. Subtus fuscae lineola media niuea,  
quae ad basin incrassata puncto fusco, apice fla-  
vescentes.

558. P. N. P. alis falcato dentatis fuscis: fascia communi *Harpyia*,  
coerulecente nigro punctata, subtus brunneis; stri-  
ga fusca.

559. P. N. P. alis dentatis nigris: fascia flava communi ni- *Pelarga*,  
gro punctata.

*Papilio Pelarga* Drury Ins. 3. tab. 27, fig. 1. 2.

Variat fascia flava et rosea.

560. P. N. P. alis dentatis fuscis; posticis subtus griseo *Melissa*,  
marmoratis.

561. P. N. P. alis dentatis albis: limbo fulvo, posticis *Hersilia*,  
subtus fuluis; fasciis duabus punctaque medio albis.

562. P. N. P. alis dentatis fuscis; anticis fascia fulua, po- *Elea*,  
sticis alba.

*Papilio Elea* Cram. Ins. 21. tab. 242. fig. D. E.

Conf. *Papilio Cocala* Cram. Ins. 21. tab. 242. fig. F. G.

563. P. N. P. alis dentatis fuscis; disco communi cinereo *Amphice-*  
fusco vndaço, subtus apice griseis; lunulis nigris. *da.*

564. P. N. P. alis dentatis fuscis: anticis supra fascia fulua, *Mesente-*  
ria, subtus maculis centralibus coeruleis. *ria.*

565. P. N. P. alis dentatis luteis: anticis apice nigris; fa- *Niphe*,  
scia albida, posticis subtus argentatis; ocellis quinque,

- Lucina.* 566. P. N. P. alis dentatis fuscis testaceo maculatis: subtus fasciis duabus macularum albidae.
- Ciuxia.* 567. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus fasciis tribus albidis nigro maculatis.  
Schaeff. Icon. tab. 204. fig. 1. 2.  
*Larua spinosa*, nigricans: spinarum lineis alternis albis rufisque.  
*Puppa viridis*, nigro maculata.  
Conf. *Papilio Trinia* Wien. Verz. 179. 8. in Veribusco vix distincta, quamvis duplo fere minor.
- Phoebe.* 568: P. N. P. alis dentatis nigro fuluoque variis: posticis subtus flavescentibus nigro vndatis basi quadripunctatis, fasciis duabus fuluis: posteriori maculari.  
*Papilio Phoebe* Wien. Verz. 179. I.  
*Papilio Cinxia* Esp. Pap. tab. 25. fig. 2.  
*Papilio Corythallia* Esp. Pap. tab. 61. fig. 4. 5. mal.  
Habitat in Europae Centaurea Scabiosa. Mus. Dom. Schieffermyller.  
Affinis praecedentì at paullo maior. Antennae albo nigroque annulatae clava ferruginea annulo fusco. Alae supra nigricantes maculis numerosis, mox pluribus mox paucioribus nigris. Margo albo macularibus. Subtus anticae fuluae nigro maculatae, apice flavae nigro vndulatae. Posticae basi flavae punctis quatuor nigris, tunc fascia fulua in medio bifida, nigro marginata, tunc flavae, nigro vndatae, denum fascia fulua e punctis septem distinctis et denique flavae nigro vndatae.  
*Puppa brunnea* albo maculata.
- didyma.* 569. P. N. P. alis dentatis fuluis (cinereis) nigro maculatis: posticis subtus flavis nigro punctatis; fasciis duabus fuluis continuis.  
*Papilio didyma* Esp. pap. tab. 41. 57. 3  
tab. 61. fig. 1.  
Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.  
Magnitudo P. Phoebe. Abdominis latera nigro punctata. Fascia antica alae posticae subdividyma.
- Fascelis.* 570. P. N. P. alis dentatis fusco fuluoque variis: posticis subtus albis nigro punctatis: fasciis duabus fuluis: posteriore lunulata.  
*Papilio Fascelis* Esp. Pap. tab. 88. fig. 3. 4. mal.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Nimis praecedenti affinis. Differt tamen alis supra obscurioribus, magis fuscis fasciaque posteriore alae posticae e lunulis fuluis conflata, quae tamen in faemina distinctiores.

571. P. N. P. alis repandis fuluis nigro punctatis: posticis *Athulia*: subtus albis nigro punctatis fasciisque duabus fuluis.

*Papilio Phoebe* Esp. Pap. tab. 88. fig. 5. 6.

Habitat in Russia boreali Dom. Boeber.

Minutus in hac familia. Alae supra omnes fuluae punctis numerosissimis nigris. Subtus anticae fuluae nigro maculatae apice albae nigro punctatae. Posticae albae strigis plurimis punctorum nigrorum fasciisque duabus fuluis, anteriore abbreviata e maculis tribus.

572. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro punctatis: posticis *Hylla*: basi supra fuscis subtus albidis.

573. P. N. P. alis dentatis nigris fuluo maculatis: posticis *Dityna* subtus fuluis; maculis baseos fascia media maculari innulisque apicis flauis.

*Papilio Dityna* Esp. Pap. tab. 48. fig. 2.

*Papilio Athulia minor* Esp. Pap. tab. 89. fig. 1. 2.

Habitat in Russia Dom. Boeber.

Reliquis obscurior maculis minoribus fuluis. Posticae subtus maculis minoribus fuluis. Posticae subtus maculis quinque baseos flauis, fascia in medio lata maculari flava nigro marginata et lunulis flauis versus apicem.

574. P. N. P. alis dentatis nigris fuluo flauoque fasciatis, *Cynthia*: posticis subtus fuluis flauo fasciatis.

*Papilio Cynthia* Wien. Verz. 179. 3.

*Papilio Cynthia* Esp. pap. tab. 37. fig. 3.

Naturforsch. 12. tab. 2. fig. 1-4.

Habitat in Austriae Populo Mus. Dom. Schieffermyller.

Maior P. Cinxia. Alae anticae supra fuscae fasciis plurimis nigris, subtus pallide fuluae vndis aliquot nigris. Posticae nigrae rarius fuluo maculatae, pone medium fascia e maculis sex fuluis, quarum quatuor aut quinque punto nigro notatae, subtus fuluae fascia baseos interrupta media neruis diuisa, apicis macularis. Inter has ultimas fascias striga e punctis quinque distinctis.

*Mas* supra obscurior maculisque albis notatus.

*Larua* spinosa atra: lineis duabus dorsalibus flauis, capite coerulecente.

*Puppa* pallida nigro flauoque maculata.

- Maturna.* 575. P. N. P. alis dentatis fuluo nigroque variis; posticis subtus fasciis flauis; strigis vndatis nigris, basi impunctatis.

Habitat in Europae Plantagine.

*Larua* spinosa nigra albo punctata: spinis flavescentibus,

*Puppa* virescens nigro maculata.

- Delia.* 576. P. N. P. alis dentatis fuluo nigroque variis: posticis supra punctis quatuor ocellaribus, subtus albis; fasciis duabus fuluis; posteriore nigro punctata.

*Papilio Delia* Wien. Verz. 179. 6.

Roef. Ins. 4. tab. 13. fig. 4. 5. Laru. Pupp.  
tab. 18. fig. 4. Imago.

Habitat in Germaniae australioris Plantagine Mus. Dom., Schieffermyller.

Alae supra fuluo nigroque variae margine ciliis albidis.

In posticis ante marginem puncta 3-4 nigra annulo fuluo cincta. Subtus anticae fuluae, apice flauae, nigro punctatae. Posticae basi flauae punctis quatuor nigris, tunc fascia fulua interne bifida, nigro marginata, tunc fascia alba nigro punctata, demum fascia fulua nigro marginata punctataque. Margo flauus, nigro punctatus.

*Larua* spinosa atra: lateribus albo punctatis.

*Puppa* liuida fuluo punctata.

- Arduinna.* 577. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis; posticis subtus albis; fasciis duabus fuluis; posteriore nigro punctata.

*Papilio Arduinna* Esp. Pap. tab. 87. fig. 4.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Affinis P. Deliae at alae supra fuluae maculis rareribus nigris. Punctaque alae posticae simplicia. Margo alae niger ciliis albis.

- Hecate.* 578. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: omnibus apice strigis duabus punctorum nigrorum.

*Papilio Hecate* Wien. Verz. 179. 4.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller,

Statura praecedentium. Alae omnes supra fuluae nigro maculatae et ante marginem strigae duae punctorum nigrorum. Margo ipse niger lineolis fuluis ciliisque albis. Subtus anticae fuluae nigro vndatae strigis iisdem. Posticae basi flauae fascia fulua nigro marginata, tunc fuluo flavoque variegatae strigis duabus punctorum nigrorum distinctorum.

579. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro variis: posticis vtrinque striga punctorum nigrorum.

*Papilio Artemis* Wien. Verz. 322. 10.

Habitat in Austriae montosis Mus. Dom. Schieffermyller. *Artemis*.

Alae supra fuluae nigro vndatae. Ante marginem posticum alae posticae striga e punctis septem nigris distinctis. Subtus pallidiores. Posticae fuluae fasciis duabus flavis anteriore extrorsum bifida. Ante marginem striga e punctis septem nigris. Margo flauus.

580. P. N. P. alis dentatis fuluis: maculis strigaque punctata nigris, posticis subtus variegatis: basi puncto *fia*. apice striga punctorum.

*Papilio Amathusia* Esp. Pap. tab. 88. fig. 1. 2.

Habitat in Russia Dom. Boeber.

Statura omnino praecedentium. Distinctus striga punctorum distinctorum in omni ala. Subtus posticae flavo fuluo fuscoque variegatae. Punctum distinctum nigrum, subocellatum ad basin et striga e punctis sex subtus ocellaribus versus apicem.

581. P. N. P. alis fuluis nigro maculatis: posticis subtus pureis basi flavo argenteoque maculatis fasciaque media argentea obsoleta.

Habitat in Europae Viola.

Alae posticae subtus versus apicem striga e punctis sex atris: intermediis duobus subpupillatis.

582. P. N. P. alis dentatis fuscis rufo maculatis apice fuluis: subtus maculis rufis albo cinctis.

583. P. N. P. alis denticulatis variegatis subtus reticulatis: anticis supra maculis aliquot albis.

Schaeff. Icon. tab. 217. fig. 3. 4.

584. P. N. P. alis dentatis fuscis: fascia vtrinque alba antarum interrupta, subtus albo reticulatis.

Schaeff. Icon. tab. 132. fig. 1. 2.

- Paphia.* 585. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus fasciis argenteis.  
 Varietas cinerea nigro maculata. Esp. Pap. tab. 60. fig. 4. in Russia meridionali et Sibiria frequens.
- Cynara.* 586. P. N. P. alis dentatis viridibus nigro maculatis: posticis subtus viridibus; maculis tribus fasciisque duabus argenteis.  
*Papilio Pandera* Wien. Verz. 176. 1.  
 Esp. Pap. tab. 58. fig. 1. 2. 3.  
 Puncta interdum quinque argentea inter fascias.
- Laodice.* 587. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus apice fuscis glauco nitentibus: fascia argentea interrupta terminante.  
*Papilio Laodice* Pall. Iter. 1. App. n. 6t.  
*Papilio Laodice* Schneid. Pap. Europ. tab. 1. fig. 1. 2.  
 Habitat in Borussia, Muscovia Dom. Boeber.  
 Statura et magnitudo fere P. *Paphiae*. Punctum album versus apicem alae anticae. Subtus anticae flavescentes nigro maculatae strigaque e punctis argenteis obsoletis. Posticae basi flavescentes striga sesqui altera brunnea, in medio striga interrupta, inaequalis argentea et pone hunc alae fuscae argenteo nitidulae strigis duabus e punctis obscurioribus.
- Cytherea.* 588. P. N. P. alis crenatis flatis: fascia communi argentea, subtus fascia argentea lanceolata.  
*Papilio Cytherea* Cram. Ins. 32. tab. 376. fig. C. D.
- Aglaja.* 589. P. H. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus maculis 21 argenteis.
- Aphrodite.* 590. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus fuscis: maculis 24 argenteis.  
 Habitat in America meridionali Dom. Boeber.  
 Medius. Antennae ferruginea clava nigra apice ferruginea. Alae supra fuluae, nigro maculatae. Subtus anticae fuluae nigro maculatae punctisque quatuor apicis argenteis. Posticae fuscae fascia apicis flavescente maculisque 24 argenteis.
- Myrina.* 591. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus maculis 30 argenteis.
- Cybele.* 592. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus maculis 34 argenteis.

593. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus *Idalia*.  
maculis 37 argenteis, posticis supra coeruleis albo  
punctatis.
594. P. N. P. alis dentatis fuscis: disco communi nigro, *Diana*.  
posticis subtus 9 argenteis.
595. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus *Adippe*.  
maculis 28 argenteis.
- Fyesl. Arch. Ins. monogr. cum fig.  
Habitat in Europae *Viola odorata et tricolor*.  
*Variat* rarius punctis argenteis in flava transuentibus.  
Puncta ocellaria vero constantia.  
*Larua cinerea vel fusca*: spinis numerosis rufis, linea-  
que dorsali nigra albae innata.  
*Puppa fusca punctis argenteis*.
596. P. N. P. alis dentatis luteis nigro maculatis: subtus *Lathonia*.  
maculis 37 argenteis.
597. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus *Euphro-*  
maculis 9 argenteis.  
*syne*.  
Punctum nigrum distinctum subtus ad basin alae po-  
sticae.  
*Larua spinosa nigra macularum pari dorsalium auran-*  
*tiarum in singulo segmento*.
598. P. N. P. alis subintegris fuluis basi maculisque nigris, *Pales*.  
posticis subtus brunneis flavo argenteoque variis.  
*Papilio Pales* Wien. Verz. 177. 8.  
*Papilio Arsilache* Esp. Pap. tab. 56. fig. 4. 5.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Magnitudo et affinitas P. Dia. Alae supra omnes ful-  
uae at basi maculisque plurimis nigris. Subtus an-  
ticeae fuliae lunulis punctisque aliquot nigris macu-  
lisque duabus flavis apicis. Posticeae basi maculis ar-  
genteis, tunc brunneae puncto parvo argenteo, tunc  
fascia magna, sinuata, obsolete flava, et in hac ma-  
culae duas argenteas, altera in medio altera ad mar-  
ginem exteriorem, demum brunneae maculis aliquot  
fere obsoletis argenteis et denique margo flavo va-  
rius punctis sex vel septem argenteis.
599. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus *Niobe*.  
maculis pallidis punctisque quatuor argenteis ocellatis.  
Habitat in Europae *Viola tricolor*.

*Variat*

*Variat interdum maculis argenteis loco pallidarum.*

*Affinis P. Adippe at minor magisque coloratus.*

*Larua spinosissima fusca maculis flavis lineata spinis-que albidis.*

*Bellona.* 600. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus apice argenteis; maculis ocellaribus fuluis sex.

*Thais.* 601. P. N. P. alis dentatis fuluis: margine nigro strigoso, subtus glaucis: posticis fascia argentea punctisque ocellaribus.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Statura omnino P. Phalanta. Corpus fuscum. Alae omnes fuluae purpureo colore nitentes margine nigro strigoso punctisque ante marginem nigris. Subtus omnes glaucae posticis fascia media argentea postice obliterata. Pone fasciam striga punctorum ocellatorum.

*Daphne.* 602. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus flavis rufo venosis apice ferrugineo argentatis.

*Papilio Daphne* Wien. Verz. 177. 10.

Habitat in Rubo Idaeo Austriae Dom. Schieffermyller.

Affinis videtur P. Bellona. Alae omnes vti et anticae subtus fuluae nigro maculatae. Posticae subtus basi fuluae ferrugineo fere reticulatae, apice brunneae argento nitidae punctis aliquot ocellaribus fuscis.

*Larua* spinosa fusca albido lineata: spinis flavis.

*Puppa* virescens subtus multi dentata.

Conf. *Papilio Diptynna* Wien. Verz. 179. vix differt.

*Phalanta* 603. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus apice glaucis: punctis ocellaribus fuluis tribus.

*Papilio Columbina* Cram. Ins. 29. tab. 337. fig. D. E.

*Vanillae.* 604. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus maculis 30 argenteis.

*Iuno.* 605. P. N. P. alis angulato dentatis oblongis fuluis: limbo atro, posticis subtus atris: maculis fuluis argenteisque.

\* *Plebeii Rurales.*

*Cupido.* 606. P. P. R. alis posticis sexdentato caudatis: subtus albidis; maculis argenteis.

*Gnidus.* 607. P. P. R. alis sexdentato caudatis albo limbo atro, posticis subtus maculis argenteis. Sp. Ins. App. 504.

608. P.

608. P.P.R. alis tricandatis: anticis nigris, posticis coeruleis, subtus cinereis: strigis duabus brunneis ocellisque duobus anguli ani.

*Papilio Euritus* Cram. Ins. 19. tab. 224. fig. D. E.

609. P.P.R. alis tricaudatis coeruleis: limbo atro, subtus viridibus. *Ianias.*

610. P.P.R. alis tricandatis fuscis: subtus disco variegato *Amor.* strigaque postica aurea.

611. P.P.R. alis tricaudatis fuscis basi virescentibus, subtus albis: posticis fascia abbreviata sanguinea.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Statura praecedentium. Alae anticae supra fuscae basi virescentes, subtus albae apice obscuriores. Posticae virescentes apice obscurae albo matulatae. Caudae tres exteriori parva, obtusa, nigra albo ciliata; intermedia longiori alba, ante apicem nigra, interiori longissima alba. Subtus albae ad angulum ani striga abbreviata fusca fasciaque sanguinea maculis duabus atris.

612. P.P.R. alis tricaudatis fuscis: subtus niueis nigro *Moncus.* subfasciatis: posticis ocellis duobus auratis.

613. P.P.R. alis tricaudatis fuscis: subtus albis strigis duas fuluis.

614. P.P.R. alis tricaudatis coerulescentibus apice nigris: *Atlaeon.* subtus aureis; atomis nigris.

615. P.P.R. alis tricaudatis: anticis fuscis; macula fulua, *Lisias.* posticis subtus albis nigro maculatis.

Habitat in Pulicandor Mus. Dom. Banks.

Palpi porrecti, compresi basi albi apice nigri. Corpus fuscum. Alae anticae supra fuscae macula magna fulua, subtus flavescentes strigis fuluis, postica fusca. Posticae fuscae, interdum coeruleo nitidae, semper margine postico coeruleo maculatae. Caudae tres nigrae albo marginatae: media maiori. Subtus albae maculis plurimis magnis nigris sparsis.

616. P.P.R. alis tricaudatis fuscis: subtus albo maculatis, *Hymen.* posticis supra albis.

617. P.P.R. alis subtricaudatis coeruleis nitidissimis: posticis subtus fuscis ante apicem albo fasciatis. *Gabrielis.*

- Pelion.* 618. P. P. R. alis subtricaudatis coeruleis auro punctatis: limbo fuscō.
- Aunus.* 619. P. P. R. alis subtricaudatis coeruleis: limbo atro subtus nigris albo fasciatis.
- Etolus.* 620. P. P. R. alis bicaudatis: anticis nigris, posticis coerulescentibus, subtus albidis: puncto baseos duobusque apicis atris.  
Habitat in Indiis.  
Statura praecedentium. Alae anticae nigrae margine interiori parum coerulescente. Posticae coerulescentes, nitidae puncto apicis nigro. Caudae duae elongatae albæ. Subtus anticae fuscō testaceae strigis duabus obscurioribus. Posticae albidae puncto baseos distincto atro. Ante apicem strigae duae, interruptae, obscurae et in apice puncta duo magnaatra. Caudae albæ linea media atra. Pedes albo nigroque annulati.
- Getus.* 621. P. P. R. alis subtricaudatis coeruleis: limbo atro, subtus fuscis basi rufis albo punctatis.  
*Papilio Pelops* Cram. pap. 29. tab. 341. fig. A.  
Habitat Surinami.  
Magnus in hac familia. Antennae nigrae clava alba. Alae omnes subtus basi rufae albo punctatae.
- Vulcanus* 622. P. P. R. alis bicaudatis supra fuscis fuluo maculatis, subtus strigis flavis fuluis argenteisque variegatis.
- Ganymedes.* 623. P. P. R. alis bicaudatis coerulescentibus: limbo fuscō, subtus basi virescentibus: punctis aureis.
- Mars.* 624. P. P. R. alis bicaudatis fuscis: posticis macula rufa, subtus punctis duobus fasciaque obliqua albis.
- Celerio.* 625. P. P. R. alis bicaudatis albis: subtus fasciis fuscis albisque alternis, angulo ani ocello triplici rufo.
- Emantheon.* 626. P. P. R. alis bicaudatis coeruleo nitidis: subtus atris coeruleo irroratis.
- Didymaon.* 627. P. P. R. alis bicaudatis fuscis: subtus basi rubris; punctis ocellaribus albis.
- Pholeus.* 628. P. P. R. alis bicaudatis coeruleis: subtus atris viridi coeruleoque fasciatis.

629. P. P. R. alis bicaudatis subtus viridibus auro rufoque *Endy-*  
irroratis: posticis striga atra fasciaque sanguinea. *mion.*
630. P. P. R. alis bicaudatis: subtus anticis viridibus auro *Venus.*  
irroratis, posticis aureis viridi atroque maculatis.
631. P. P. R. alis bicaudatis supra fuscis subtus pallescenti- *Echion.*  
bus: fascia rufa ocelloque terminali rubro.
632. P. P. R. alis bicaudatis coeruleis nitidis: posticis sub- *Telemus.*  
tus striga marginali angulata atra.
633. P. P. R. alis bicaudatis supra fuscis immaculatis: po- *Hemon.*  
sticis subtus angulo ani fasciis tribus coeruleis.
634. P. P. R. alis bicaudatis coerulentibus subtus cine- *Sphinx.*  
reis: angulo ani macula gemina atra.
635. P. P. R. alis bicaudatis supra coeruleis subtus coeru- *Marfyas.*  
lentibus: punctis atris.  
Cram. Inf. 28. tab. 332. fig. A. B.
635. P. P. R. alis bicaudatis coeruleis: ocello atro, subtus *Bathis.*  
fuscis albo fasciatis: angulo ani rufo.
636. P. P. R. alis bicaudatis coeruleis nitidis: subtus disco *Cyanus.*  
albo.
637. P. P. R. alis bicaudatis coeruleo nitidis: posticis sub- *Hyacin-*  
tus medio atro; fascia alba. *thus.*
638. P. P. R. alis bicaudatis coeruleis: margine nigro, po- *Halesius.*  
sticis vtrinque auro maculatis.
639. P. P. R. alis bicaudatis fuscis subtus flauescens san- *Formofus*  
guineo auroque maculatis.
640. P. P. R. alis bicaudatis albis: limbo fusco, anticis *Meton.*  
macula ocellari aurea.
641. P. P. R. alis bicaudatis albis apice nigris: subtus fu- *Liger.*  
scis; strigis lunulisque albis Sp. Inf. App. 504.
642. P. P. R. alis dentatis subbicaudatis nigricantibus: ma- *Thero.*  
culis fuluis, subtus maculis argenteis.
643. P. P. R. alis caudatis fuluis nigro maculatis, subtus *Harpax.*  
cinereis: punctis aureis.
644. P. P. R. alis caudatis fuscis: subtus flauescens: *Valens.*  
maculis rubris auro foetis.
- Papilio Croesus* Sp. Inf. 2. 117. 522.

*Perion.* 645. P. P. R. alis caudatis fuluis: supra limbo fasciisque fuscis subtus auro punctatis.

*Papilio Perion* Cram. Ins. 32. tab. 379. fig. B.C.

Habitat Surinamii.

Statura omnino praecedentium. Cauda elongata nigra terminatur puncto albo. Antennae nigrae.

*Centaurus.* 646. P. P. R. alis caudatis coerulescentibus: limbo fusco subtus cinereis: maculis baseos ocellaribus.

*Gerontes.* 647. P. P. R. alis caudatis nigris: macula communis transuersa alba, anticis ocello posticis geminato.

*Iarbus.* 648. P. P. R. alis caudatis fuluis: limbo fusco, subtus cinereis: striga alba, posticis punctis duobus atris.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Magnitudo P. Pruni. Antennae nigrae albo annulatae clava nigra apice fulua. Corpus fuscum. Alae omnes fuluae anticis margine antico posticoque late fuscis, posticis margine postico tenuissime fusco. Cauda tenuis nigra apice alba. Subtus omnes cinereae striga vndata alba posticis apice punctis duobus atris exteriore puncto fuluo.

*Betulae.* 649. P. P. R. alis subcaudatis fuscis subtus luteis, posticis strigis duabus albis.

650. P. P. R. alis caudatis supra fuscis: posticis subtus fascia marginali fulua nigro punctata.

*Pupae* dorsum dentatum.

*Spini.* 651. P. P. R. alis caudatis fuscis subtus cinereis: lunulis marginalibus fuluis maculaque anuli coerulescente.

*Papilio Spini* Wien. Verz. 186. 5.

Habitat in Germaniae Pruno spinosa Dom. Schieffermyller.

Nimis affinis P. Pruni. Alae supra omnes fuscae posticis apice maculis aliquot rufis. Cauda apice alba. Subtus cinereae strigae alba ad angulum ani parum angulata. Versus marginem posticum lunulae aliquot fuluae nigro notatae, et ad angulum ani macula magna coerulescens puncto terminali atro.

*Larua* viridis: lineis dorsalibus macularibus flavis, capite nigro. Adultior rufescens evadit.

*Puppa* supra fusca subtus cinereo villosa.

652. P. P. R. alis subcaudatis coerulescentibus: subtus cinereis; striga alba puncto que ani gemino fulvo. *Quercus.*

653. P. P. R. alis caudatis fuscis immaculatis: posticis subtus striga lunulata alba rufaque. *Linceus.*

*Papilio Linceus* Esp. Pap. tab. fig.

Habitat in Russiae borealioris sylvaticis Dom. Boeber.

Statura et summa affinitas P. Spini. Alae omnes supra fuscae maris immaculatae, maris macula disci fulua. Cauda alae posticae parua, obtusa. Subtus alae anticae fuscae striga abbreviata e lunulis quinque albidis. Posticae fuscae nitidulae striga e lunulis plurimis albis et pone has lunulae aliquot rubrae.

654. P. P. R. alis caudatis fuscis immaculatis subtus striga *Cerasi.* alba, posticis lunulis fuluis, puncto nigro notatis.

Habitat in Austriae Ceraso.

Statura omnino et summa affinitas P. Pruni. Alae omnes supra fuscae, immaculatae. Subtus anticae fuscae striga unica alba, posticae fuscae striga alba et ad angulum ani lunulae duae vel tres fuluae puncto atro. Cauda apice alba.

655. P. P. R. alis caudatis fuscis subtus cinerascentibus: *Acaciae.* striga alba lunulisque analibus fuluis.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Praecedentibus paullo minor. Alae anticae supra fuscae, immaculatae, subtus cinerascentes striga alba. Posticae supra fuscae maculis duabus marginalibus fuluis. Subtus cinerascentes striga alba lunulisque analibus fuluis puncto uno altero atro.

656. P. P. R. alis subcaudatis fuscis: macula disci alba, anticus apice atris. *Symethus*

657. P. P. R. alis caudatis coerulescentibus subtus cinereis *Boeticus.* albo vndatis: angulo ani ocello gemino aurato.

658. P. P. R. alis caudatis coeruleis: posticis subtus fuscis *Apidanus* coeruleo variis: angulo ani macula gemina aurata.

659. P. P. R. alis caudatis fuscis disco coerulescentibus subtus cinereis: fascia alba angulo que ani ocello gemino rufo. *Strephon*

660. P. P. R. alis caudatis fuscis subtus cinereis: anticus *Cleon.* striga, posticis fascia fanguineis, angulo ani ocello gemino rufo.

- Aicides.* 661. P. P. R. alis caudatis nigris coeruleo nitidis subtus ferrugineis: striga flauescente.
- Atymnus.* 662. P. P. R. alis caudatis fuluis: anticis apice nigris.  
*Papilio Atymnus* Cram. Ins. 28. tab. 331. fig. D. E.  
 Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.  
*Medius.* Alae omnes supra fuluae, anticae apice nigrae, posticæ valde caudatae cauda apice alba. Subtus pallidiores, immaculatae.
- Eryx.* 663. P. P. R. alis caudatis nigris subtus viridibus: posticis margine subdentato maculatoque.
- Aeolus.* 664. P. P. R. alis caudatis cyaneis: anticis macula nigra, omnibus subtus fascia alba nigro striata.
- Acmon.* 665. P. P. R. alis caudatis coeruleis: posticis subtus atris, apice strigis viridi aureis.
- Amyntas.* 666. P. P. R. alis caudatis cyaneis: margine nigro, subtus cinereis: punctis nigris posticisque duobus ferrugineis anguli ani.  
*Papilio Amyntas* Wien. Verz. 185. 18.  
*Papilio Tiresius* Esp. pap. tab. 49. fig. 2.  
 Habitat in Austria Dom. Schieffermüller.
- Parus.* Alae omnes cyaneae, nitidae margine nigro ciliis albis. Anticae lunula nigra, posticae cauda parua alba. Subtus omnes cinereae, anticis lunula media strigaque postica punctorum nigrorum. Margo punctis obsoletioribus. Posticae punctis duobus baseos strigaque valde vndata punctorum. Praeterea margo strigis duabus punctorum obsoletiorum, inter quas maculae duas fuluae superne inferneque punto atro.
- Timeus.* 667. P. P. R. alis caudatis fuluo fuscoque variis: anticis subtus punctis ocellaribus atris.
- Simaethis* 668. P. P. R. alis caudatis fuscis subtus viridibus: striga argentea.  
 Habitat in Americae Insulis.  
 Striga in alis posticis dentata.
- Sedi.* 669. P. P. R. alis caudatis coeruleis: margine albo maculato, subtus albis: maculis quadratis nigris fascia que rufa.

670. P.P.R. alis subcaudatis supra fuscis subtus viridibus, *Rubi.*  
*Papilio Rubi* Wien. Verz. 186. 1.  
 Habitat in Cytiso.  
*Sexus alter striga punctorum alborum in pagina inferiori alae posticæ.*  
*Larua viridis flauo variegata, capite nigro.*
671. P.P.R. alis caudatis? fuscis subtus striga obliqua ni. *Ixion.*  
 uea, posticis fascia submarginali rufa.
672. P.P.R. alis caudatis albis supra limbo punctisque dici nigris, subtus nigro punctatis: angulo ani punctis tribus aureis. *Rosmon.*
673. P.P.R. alis caudatis albis apice fuscis subtus albo *Linus.*  
 atroque fasciatim: angulo ani punctis tribus albis.
674. P.P.R. alis dentato caudatis atris: basi macula fulua *Amyntor*  
 apice fascia flava.
675. P.P.R. alis dentatis fuscis: disco coerulescente, subtus *Narcissus* fasciis maculisque sanguineis argenteo marginatis.
676. P.P.R. alis dentatis fuluis: limbo fusco, posticis *Apelles.*  
 subtus fasciis rufis argenteo marginatis.
677. P.P.R. alis denticulatis subcaudatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus striatis aureoque maculatis. *Thysbe.*
678. P.P.R. alis dentato subcaudatis basi argenteis aureo *Nais.*  
 striatis.
679. P.P.R. alis dentatis coeruleis: limbo nigro, subtus *Meleager* canis: punctis ocellaribus nigris.  
*Papilio Meleager* Esp. pap. tab. 45. fig. 2. ♀  
 tab. 62. fig. 1. ♂
- Papilio Endymion* Wien. Verz. 182. 1. ♀  
*Papilio Daphnis* Wien. Verz. 182. 2. ♂  
 Habitat in Germania Mus. Dom. Romani.
- Statura omnino P. Arion. Mas alis minus dentatis coeruleis margine tenuissime nigro, faemina alis magis dentatis obscurioribus limbo nigro lunulis albis puncto nigro.
680. P.P.R. alis integerrimis fuscis fuluo maculatis subtus variegatis. *Epulus.*
681. P.P.R. alis ecaudatis supra fuscis: disco coeruleo; *Arion.*  
 maculis atris, subtus canis: punctis ocellaribus.  
 Faemina punctis maioribus.

*Erebus.* 682. P.P.R. alis integerrimis fuscis: omnibus subtus striga punctorum ocellatorum.

*Papilio Erebus* Knoch Beytr. 2. tab. 6. fig. 6. 7.

Habitat in Germania Dom. Boeber.

*Magnus.* Antennae albo nigroque annulatae clava nigra. Alae supra fuscæ, immaculatae, subtus fuscæ striga flexuosa e punctis septem atris subocellatis.

*Alcon.* 683. P.P.R. alis integerrimis coeruleis: margine fuscō, subtus fuscō cinereis: punctis numerosis ocellaribus.

*Papilio Alcon* Wien. Verz. 182. 4.

*Papilio Arcus* Esp. pap. tab. 34. fig. 4. 5.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schleffermyller.

*Statura P. Arion.* Mas alis omnino coeruleis margine tantum nigricante ciliisque albis. Faemina obscurior punctis obsoletis obscurioribus. Subtus omnes fuscō cinereae punctis atris numerosis annulo pallido circatis.

*Damon.* 684. P.P.R. alis integerrimis coeruleis subtus fuscō cinereis: punctis numerosis, posticis vitta alba.

*Papilio Damon* Wien. Verz. 182. 6.

*Papilio Biton* Esp. pap. tab. 33. fig. 5.

Habitat in Hedyfaro Onobrychis Austriae Dom. Schiefermyller.

*Statura praecedentis.* Alae supra coeruleae nitidae. Anticae lunula media margineque fuscis, posticae margine radiato fuscō. (Faemina alis supra totis fuscis.) Subtus omnes fuscō cinereae lunula media punctisque 5-6 approximatis atris annulo albo circatis. Posticae punctis septem ocellaribus minoribus et praeterea vitta lata albida, quae tamen marginem posticum haud attingit.

*Larua obscure viridis:* linea laterali obscuriore, capite nigro.

*Cyllarus.* 685. P.P.R. alis integris coeruleis: margine nigro, subtus fuscō cinereis: striga punctorum ocellatorum, posticis basi coeruleis.

*Papilio Damoetas* Wien. Verz. 183. 7.

*Papilio Alexis* Pod. Mus. Graec.

*Papilio Cyllarus* Esp. pap. tab. 33. fig. 1. 2.

Roes. Ins. 3. tab. 37. fig. 4.

*Papilio* alis rotundatis coeruleis subtus ocellorum fascia solitaria Geoff. Ins. 2. 63. 31.

Habitat in Astragali, Meliloti floribus Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Alae coeruleae, nitidae marginē postico fusco. Faemina alis fuscis coeruleo minicantibus. Subtus omnes cinereae striga incurva punctorum nigrorum ocellatorum punctis alae anticae ad marginem interiorem maioribus. Basis alae posticae coerulescens, nitida.

*Larua pallida*: stria dorsali rufa lineis lateralibus obliquis viridibus, capite nigro.

*Puppa fusca nigro maculata*.

686. P. P. R. alis ecaudatis supra coeruleis marginē nigris *Argiolus*. subtus fusco cinereis: striga punctorum ocellatorum.

Affinis certe *P. Cyllaro*, at basis alae posticae subtus concolor.

687. P. P. R. alis integris coeruleis subtus lacte canis: pun- *Acis*.  
Etis oblongis nigris simplicibus.

*Papilio Acis* Wien Verz. 182. 5.

*Papilio Cleobis* Esp. pap. tab. 40. fig. 3.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Mas alis coeruleis striga tantum marginali atra. *Fae-*  
*mīna* disco tantum coeruleo lunula nigra. Subtus  
argenteo cinereac, anticis striga punctorum oblongo-  
rum nigrorum absque annulo, posticis punctis spar-  
sis rotundioribus, simplicibus.

Simillimum at caudatum in Russia australiori inuenit  
Dom. Boeber.

688. P. P. R. alis integerrimis fuscis immaculatis subtus ci- *Alsus*.  
nereis: striga punctorum ocellatorum.

*Papilio Alsus* Wien. Verz. 184. 9.

*Papilio minimus* Esp. pap. tab. 34. fig. 3.

Schaeff. Icon. 2. tab. 165. fig. 1. 2.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Præcedentibus minor. Alae omnes supra fuscae nitidae, subtus cinereae, anticis lunula media striga-  
que e punctis 7 nigris annulo albo cinctis, posticis  
punctis octo aut nouem.

689. P. P. R. alis integerrimis fuscis basi coeruleis subtus *Otis*.  
cinereis: anticis punto medio strigaque posticis  
punctis numerosis ocellatis.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Statura parua omnino P. Alsi. Antennae albo nigroque annulatae. Alae supra fuscae basi coeruleae nitidae. Subtus cinereae, anticis puncto medio ocellato strigaque postica e punctis ocellatis. Posticae punctis plurimis itidem ocellatis.

- Argus.* 690. P. P. R. alis ecaudatis: posticis subtus limbo ferrugineo ocellisque coeruleo argenteis.

*Papilio Argus* Wien. Verz. 184. 14.

*Papilio Aegon* Wien. Verz. 184. 15: vix differt, quamvis minor.

Habitat in Europae Genista Germanica.

*Larua viridis*: linea dorsali fusca, capite pedibusque anticis nigris.

- Optilete.* 691. P. P. R. alis integerrimis coerulecentibus, margine nigrante, posticis subtus cinereis: punctis ocellariis atris lunulisque duabus fuluis.

*Papilio Optilete* Esp. pap. tab. 79. fig. 4. 5.

Knoch Beytr. 1. tab. 5 fig. 5. 6.

Habitat in Russia boreali Dom. Boeber.

Affinis *P. Argo*: Alae supra immaculatae margine tenuissime nigro. Subtus anticae cinereae puncto medio strigaque postica punctorum ocellatorum, posticae punctis duobus baseos, uno in medio strigaque postica punctorum ocellatorum. Strigae praeterea duas marginales punctorum nigrorum et inter haec lunulae duas fuluae.

- Triton.* 692. P. P. R. alis integerrimis coerulecentibus: subtus striga ferruginea punctisque numerosis nigris.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Medius. Alae omnes supra coerulecentes striga tenui marginali nigra. Subtus omnes cinereae. Anticae puncto medio plurimisque apicis vix ocellatis, nigris, ante apicem striga e lunulis ferrugineis. Posticae punctis plurimis nigris strigaque postica ferruginea.

- Corydon.* 693. P. P. R. alis integris coeruleo argenteis: margine nigro, subtus cinereis: punctis ocellariis, posticis macula centrali alba.

*Papilio Corydon* Wien. Verz. 184. 10.

*Papilio Corydon* Esp. pap. tab. 33. fig. 4

*Papilio Tiphys* Esp. pap. tab. 51. fig. 4. vix a *Facmina* huius distincta.

Habi-

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

*Mas.* Antennae annulatae clava subtus ferruginea. Alae supra argenteae, nitidae margine fusco posticarum maculari. Subtus anticae albidae punctis numerosis nigris fere simplicibus, posticae obscuriores annulo e punctis duodecim ocellatis nigris. In medio huius annuli macula alba et pene annulum lunulae marginales fuluae nigro notatae.

*Faemina* antennarum clava subtus ferruginea. Alae fuscae coeruleo micantes, anticis lunula media atra, posticis lunulis marginalibus fuluis. Subtus punctis magis ocellatis lunulisque fuluis distinctioribus.

694. P. P. R. alis integris coeruleis: striga marginali atra, subtus cinereis: punctis ocellaribus numerosis posticis macula centrali alba. *Adonis:*

*Papilio Adonis* Wien. Verz. 184. II.

*Papilio Alexis* Wien. Verz. 184. 12. vix differt.

*Papilio Bellargus* Esp. pap. tab. 32. fig. 3.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Nimis praecedenti affinis. Differt tamen alis supra non quam argentatis sola striga marginali atra. Subtus puncta magis ocellata.

*Faemina* magis coerulescens quam *Faemina Corydon* et fascia rufa in omni ala distinctior solo oculo ad. sueto distinguenda.

*Larua* viridis lineis dorsalibus macularum fuluarum.

695. P. P. R. alis integris coeruleis (fuscis) subtus cinereis: anticis puncto medio strigaque postica puncto. *Dorylas:* rum ocellatorum.

*Papilio Dorylas* Wien. Verz. 322. 19.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Affinis nimis *P. Adonis* at paullo minor. *Mas* alis supra coeruleis nitidis striga marginali atra. *Faemina* alis fuscis lunulis marginalibus fuluis. Subtus cinereae, anticis macula magna centrali ocellari et pone hanc striga e punctis 6-7 ocellaribus. Margo albcat. Posticae puncto baseos striga incurua punctorum ocellatorum et in medio macula cuneata alba.

696. P. P. R. alis integris: lunula media punctisque marginalibus nigris, subtus cinereis: punctis ocellaribus. *Hylus:*

*Papi-*

*Papilio Hylus* Wien. Verz. 185. 16.

*Papilio Amphion* Esp. pap. tab. 53. fig. 1.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Praecedentibus minor. Alae omnes coeruleae lunula media nigra. Margo terminatur striga atra et in posticis ante hanc strigam puncta aliquot atra. Faemina obscurior. Subtus cinereae punctis numerosis ocellaribus nigris et in posticis fascia e lunulis ferrugineis.

- Bathus.* 697. P. P. R. alis integris nigris coeruleo nitidis subtus albidiis: punctis atris numerosis, posticis fascia fulua continua.

*Papilio Battus* Wien. Verz. 185. 17.

*Papilio Telephii* Esp. pap. tab. 41. fig. 2.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae omnes coeruleo nigrae. In medio alae anticae lunulae cyaneae. Margo ipse albo maculatus. Subtus albidae, anticis punctis tribus in medio, strigis quatuor pone medium punctorum atrorum simplicium, posticis punctis sparsis baseos strigisque quatuor apicis punctorum atrorum. Inter strigam 2 - 3 fascia lata continua fulua.

- Argiades* 698. P. P. R. alis integerrimis coeruleis: margine nigricante, subtus fusco cinereis: lunula media strigisque duabus punctorum ocellatorum.

Habitat in Saxonia Dom. Boeber.

Statura omnino praecedentium. Alae omnes supra coeruleae margine nigro ciliis albis. Subtus omnes fusco cinereae lunula centrali strigisque duabus è punctis ocellatis, posteriore obsoletiore. In posticis praeterea puncta duo ocellata baseos.

- Acreon.* 699. P. P. R. alis integerrimis fusca subtus nigro ocellatis: posticis fascia alba rubra strigaque punctorum aureorum.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Alae omnes fuscae maris basi coeruleo nitidae lunulisque marginalibus obsoletis fuluis. Subtus omnes fuscescentes, anticis punto medio strigaque postica punctorum ocellatorum. Margo lunulis albis, nigris, fuluis, nigris albisque strigosus. Posticae fuscae pun-

punctis nigris ocellatis. Margo albus fascia fulua ante lunulis nigris, postice punctis laete aureis notata.

700. P. P. R. alis integris fuscis coeruleo variis: posticis *Hebrus*. coeruleis; margine interiori albo.

701. P. P. R. alis integris concoloribus fuscis: strigis duabus apicis coeruleis.

702. P. P. R. alis integrimis fuscis immaculatis subtus *Acanthus* brunneis coeruleo fasciatis: limbo flauo.

*Papilio Acanthus* Cram. Inf. 32. tab. 380. fig. K. L.

Habitat Surinam.

Paruus. Antennae albo annulatae clava fusca. Alae omnes integerrimae supra fuscae, immaculatae. Subtus limbo brunneo fasciis quatuor communibus coeruleis, abbreviatis prima interne bifida apice cum ultima coeunte. Limbus omnis flauus.

703. P. P. R. alis integris atris coeruleo vndatis: margine *Cineus*. albo punctato.

704. P. P. R. alis integrimis fuscis subtus cinereis: anticis angulo postico punto gemino nigro.

705. P. P. R. alis integris supra albis: fasciis fuscis subtus *Icarus*. fasciis albis nigrisque alternis.

706. P. P. R. alis integris fuscis, subtus cinereis albo vndatis: posticis basi punctis ocellaribus nigris apice que ocello.

707. P. P. R. alis integrimis fuscis subtus cinereo vndatis: posticis ocello gemino aurato.

708. P. P. R. alis integris fuscis: posticis subtus punctis *Minereus* ocellaribus rubris ocelloque anguli ani.

Habitat in America meridionali Dom. Lund.

Paruus. Antennae fuscae albo annulatae clava apice rufa. Alae omnes supra fuscae posticis maculis marginalibus ocellatibus atris. Subtus cinereae. Anticae apice maculatae, posticae punctis plurimiis rubris annulo albo cinetis. Ocellus ater annulo fulvo cincto ad angulum ani.

709. P. P. R. alis integrimis supra fuscis immaculatis subtus cinereis nigro punctatis.

- Tilephus.* 710. P. P. R. alis integerrimis nigris: anticis albo punctatis, posticis supra basi rufis, subtus coeruleis nigro variis.
- Emylius.* 711. P. P. R. alis integerrimis nigris albo punctatis: anticis fasciæ flava, omnibus subtus variegatis.
- Caricae.* 712. P. P. R. alis integris fuscis: disco communi albo, limbo cinereo subocellato.
- Pelops.* 713. P. P. R. alis integris albis: limbo communi fusco; maculis strigaque postica fuluis.  
*Papilio Pelops* Cram. Inf. 15. tab. 170. fig. F.  
 Habitat Cajennæ Doin. v. Rohr.  
 Statura et magnitudo P. Caricae at distinctus et aliis.  
 Alae omnes albae limbo communi fusco et in hoc limbo exteriori maculae quatuor et in posteriori fascia communis fuluae. Subtus concolores, at in limbo postico pone fasciam marginalis albae.
- Lamis.* 714. P. P. R. alis integris fuscis: fascia communi abbreviata alba fuluaque.  
*Papilio Lamis* Cram. Inf. 28. tab. 335. fig. F. G.  
 Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.  
 Nimis praecedenti affinis. Alae omnes fuscae fascia in medio lata, abbreviata, alba, communi et posteriori fulua. Margo lunulis albidis subtus subconcolores, at limbis lineolis albidis punctisque nigris.
- Cachrus.* 715. P. P. R. alis integris flavescentibus: limbo communi fusco albo maculato.  
 Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.  
 Statura et magnitudo praecedentium. Alae flavescentes limbo omni fusco et in hoc limbo postico supra striga fere obsoleta albida et in alis anticis maculae tres marginales niueae, subtus maculis plurimiis limbi postici.
- Lagus.* 716. P. P. R. alis integerrimis coeruleis: anticis macula gemina alba, subtus cinereis nigro lineatis.
- Mantus.* 717. P. P. R. alis oblongis integerrimis coeruleo fuscoque variis: fascia communi alba.  
*Papilio Mantus* Cram. Inf. 4. tab. 47. fig. F. G.  
 Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.  
 Parus. Alae valde oblongæ limbo supra fusco cyaneo variegato, subtus fusco albo variegato.

718. P. P. R. alis subangulatis fuscis: macula albida, subtus basi albis strigaque rufa. *Midas.*

719. P. P. R. alis integerrimis supra fuscis: macula alba, *Aesopus.* subtus albis immaculatis.

720. P. P. R. alis integerrimis fuluis: margine fusco, subtus *Phaedrus* albis immaculatis.

*Papilio Cingra* Cram. Ins. 20. tab. 238. fig. C.

721. P. P. R. alis integris nigris coeruleo nitidis subtus fuscis: margine postico albo. *Bias.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Magnitudo et statura P. Phaedri. Alae omnes supra nigrae, coeruleo nitentes, immaculatae subtus fuscae, nitidae margine postico albo.

722. P. P. R. alis integerrimis subconcoloribus rubris: *Phareus.* limbo nigro.

Conf. *Papilio Epaphus* Cram. pap. 28. tab. 335. fig. D. E.

723. P. P. R. alis integris: margine albo, subtus cinereis: *Hippothoe.* punctis ocellaribus numerosis.

Wien. Verz. 181. 2.

Esp. pap. tab. 38. fig. I.

Alae fuluae nitidae margine nigro tenuissime albo: maris lunula nigra, faeminae maculis plurimis.

724. P. P. R. alis subangulatis fuluis: margine atro, subtus punctis nigris albisque. *Virgareae.*

Wien. Verz. 180. I.

Habitat et in Rumice acuto.

*Faemina* supra maculis nigris.

*Larua viridis:* linea dorsali flauescente, lateraliter pallidore, capite nigro.

725. P. P. R. alis aureis margine coerulecente: posticis subdentatis, subtus obscure griseis: punctis ocellaribus numerosis. *Chryseis.*

*Papilio Chryseis* Wien. Verz. 181. 3.

*Papilio Eurydice* Esp. pap. tab. 31. fig. 3.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Nimis affinis P. Hippothoe. Mas alis aureis nitidis lunula nigra margineque coeruleo nitente tenuissimeque albo. Subtus anticae obscure cinereae disco fulvo punctis ocellaribus numerosis. Posticæ in angulum

lum excurrentes, cinereae itidem punctis numerosis posticeque fasciola rufa.

*Faemina* alis supra fuscis fuluo micantibus anticis punctis aliquot obscurioribus, posticis fasciola fulua nigro punctata. Subtus mari simillima.

- Hiere.* 726. P. P. R. alis fuscis nigro punctatis, subtus cinereis: punctis ocellaribus numerosis.

*Papilio Lampehe* Wien. Verz. 322. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura et magnitudo praecedentium. Mas alis fuscescensibus, anticis coeruleo, posticis fuluo micantibus, anticis punctis sparsis nigris, posticis lunula media nigra fasciaque postica fulua sere obsoleta.

*Faemina* fusca nigro punctata, posticis fasciola fusca distinctiore nigro punctata et ante hanc fasciam lunulae aliquot cyaneae. Subtus omnes cinereae punctis numerosis. Posticae fasciola postica fulua.

- Phlaeas.* 727. P. P. R. alis subintegris fuluis nigro punctatis, subtus canescensibus.

- Arcas.* 728. P. P. R. alis integerrimis fuluis: margine punctisque nigris, posticis subtus griseis immaculatis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lund.

Statura omnino P. Phlaeas. Alae anticae fuluae margine, punctis duobus in medio strigaque postica e punctis 5-6 nigris. Subtus concolores at punctis baseos tribus subocellatis. Posticae supra fuluae margine nigro maris striga e punctis nigris faeminae immaculatis, subtus griseae immaculatae.

- Ballus.* 729. P. P. R. alis integris fuluis (faeminae fuscis) margine fuso, subtus anticus nigro punctatis, posticis viridibus: margine fuso.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Statura omnino P. Phlaeas. Corpus fuscum. Alae omnes supra fuluae haud nitidae limbo fuso. Subtus anticae disco fuluo punctis numerosis subocellaribus atris. Posticae virides, nitidulae puncto medio subocellato margineque postico fuscis.

*Faemina* alis supra fuscis immaculatis.

- Hille.* 730. P. P. R. alis integris obscuris coeruleo micantibus: omnibus subtus punctis ocellaribus numerosis.

*Papi-*

*Papilio Hille* Wien. Verz. 181. 4.

*Papilio Amphidamas* Esp. pap. tab. 58. fig. 4.

Naturf. 6. tab. 5. fig. 2.

Habitat Lipsiae Mus. Dom. Romani.

Paruuus. Alae supra omnes obscurae coeruleo micantes lunulisque aliquot apicis fuluis. Subtus anticae punctis nigris numerosis albo annulatis, posticae cinereae punctis itidem numerosis nigris albo annulatis et versus apice in fascia fulua.

731. P.P.R. alis subintegris fuscis nigro punctatis: fascia *Xanthe*. marginali fulua, subtus lutescentibus: punctis numerosis.

*Papilio Xanthe* Wien. Verz. 181. 6.

*Papilio Phocas* Esp. pap. tab. 35 fig. 1. 2.

Habitat in Rupnica Acetosa Dom. Schieffermyller.

Minor. Alae omnes fuscae nigro punctatae margine que tenuissime albo et ante marginem fasciola fulua nigro punctata. Subtus virescentes punctis numerosis ocellaribus nigris: anticis disco fuluo, posticis fasciolas fulua, apice subemarginatis.

*Faemina* alis anticis supra disco fuluo nigro punctato.

732. P.P.R. alis fuscis nigro punctatis: margine albo, *Garbus*. subtus virescentibus: punctis numerosis.

*Papilio Circe* Wien. Verz. 181. 7.

Habitat in Austriae Acetosella Schieffermyller.

Nimis praecedenti affinis et forte mas in copula captus. Alae omnes fuscae, obscurae, nigro punctatae margineque postico albido. Puncta aliquot fulua ante marginem alae posticae. Subtus nigro punctatae, anticae cinerascentes, posticae haud emarginatae, sed in angulum excurrentes, virescentes postice fasciolas fulua.

733. P.P.R. alis subcaudatis fuluis: subtus punctis ocellaribus numerosis, anticis fuluis, posticis cinereis. *Thersamon*.

*Papilio Thersamon* Esp. pap. tab. 89. fig. 6.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Statura praecedentium. Corpus fusum. Maris alae anticae fuluae fere immaculatae margine nigro. Posticae obscuriores fascia postica fulua. Subtus anticae flavescentes punctis tribus strigaque pone medium e punctis ocellaribus atris. Pone hanc fascia fulua

punctis atris. Posticae cinereae punctis numerosis ocellaribus fasciaque postica fulua.

*Faeminae* alae supra nigro punctatae caudaque elongata.

*Pentheus.* 734. P. P. R. alis integris fuluis nigro maculatis: posticis apice albis nigro punctatis.

*Vlricus.* 735. P. P. R. alis integris coeruleo nitidis subtus basi brunneis: anticis ocello tripupillato.

*Thyra.* 736. P. P. R. alis integris: disco fuluo nigro punctato subtus purpurascensibus: maeulis argenteis.

*Zeuxo.* 737. P. P. R. alis integris: disco fuluo nigro maculato: anticis subtus argenteo maeulatis.

*Iuba.* 738. P. P. R. alis integerriinis nigris: disco fuluo, subtus fascia strigisque abbreviatis albis.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

*Paruuus.* Corpus nigruim antennarum clava apice ferruginea. Alae omnes supra nigrae disco fuluo et praeterea litura rufa ad marginem alae posticae. Subtus omnes nigrae striga baseos, fascia media strigaque postica abbreviatis albis. Puncta duo nigra atomis argenteis irrorata ad angulum ani.

*Lara.* 739. P. P. R. alis integerrimis subtestaceis, supra anticis vniocellatis, posticis biocellatis.

*Cephus.* 740. P. P. R. alis integris fuscis subtus coeruleo fasciatiss anticis ocello vniico, posticis quatuor.

*Phlegeus.* 741. P. P. R. alis integerriinis atris albo punctatis maculaque baseos oblonga fulua.

*Aetoris.* 742. P. P. R. alis integerrimis concoloribus fuscis albo punctatis.

*Cassius.* 743. P. P. R. alis integerrimis supra alis: anticis limbo fuso, posticis fimbria punctata.

*Haraldus* 744. P. P. R. alis integerrimis coeruleis: limbo atro, subtus albis: margine atro punctato.

Habitat in India Orientali Dom. Lund.

*Medius* in hac familia. Antennae nigrae albo annulatae. Alae omnes supra coeruleae, nitidae margine atro, baseos tamen posticarum albo. Subtus omnes albae versus marginem striga e lunulis paruis nigris, tunc lunulae maiores puncto magno atro.

745. P. P. R. alis integerrimis fuscis coeruleoque fascia- *Talus*,  
tis: subtus fascia sanguinea abbreviata.
746. P. P. R. alis integerrimis concoloribus nigris: anticis *Neleus*,  
punctis decem albis, posticis disco toto albo.
747. P. P. R. alis integerrimis subfuscis: disco communi *Athemon*,  
albo; fascia postica dimidiata fusca.
748. P. P. R. alis integerrimis atris: fasciis tribus flavescenti- *Hisbon*,  
tibus: postica abbreviata.
749. P. P. R. alis integerrimis concoloribus atris: fascia *Iarbas*.  
flava punctoque apicis sanguineo.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statuta praecedentium. Alae omnes atrae fascia flava,  
anticarum abbreviata, posticarum marginali. Pun-  
ctum baseos magnum, sanguineum.

750. P. P. R. alis integerrimis atris: macula communi transversali fulua. *Sagaris*.
751. P. P. R. alis integris atris: macula coerulea, subtus me-  
dio rufis: fasciis albis. *Euriteus*.
752. P. P. R. alis integerrimis concoloribus atris: anticis *Phereclus*  
fascia linearis rubra.
753. P. P. R. alis angulatis fuscis: omnibus striga rubra, *Lysippus*.  
subtus cinereo punctatis.
754. P. P. R. alis integerrimis atris concoloribus: fascia *Thisbe*.  
fulua.

*Papilio Iarbas* Drury. Ins. 3. tab. 8. fig. 2.

755. P. P. R. alis integerrimis fuscis coeruleo micantibus: *Pyramis*.  
macula fulua, posticis subtus griseis.
756. P. P. R. alis integerrimis concoloribus nigris: anticis *Priapus*.  
fascia dupli fulua.
757. P. P. R. alis integris fuscis subtus maculatis: posticis *Philafus*.  
postice supra ocellis duobus, subtus unico.
758. P. P. R. alis integerrimis fuscis, subtus fuluis: strigis *Gyas*.  
punctatis aurcis.
759. P. P. R. alis integerrimis fuscis: fasciis plurimis ma- *Aegon*.  
cularibus fuluis.

\*\* *Pleleii Vrbicolae.*

*Exclama.* 760. P. P. V. alis integris diuaricatis fuscis: anticis lineola tioniſ. punctoque flauſcentibus.

*Comma.* 761. P. P. V. alis integerrimis diuaricatis fuluis: lineola nigra, subtus punctis albis.

*Papilio Comma* Wien. Verz. 159. 4.

*Larua rubro inicans, capite nigro, collari striga alba.*  
*Sexus alter absque lineola nigra.*

*Linea.* 792. P. P. V. alis integerrimis diuaricatis fuluis: margine nigro.

*Papilio Linea* Wien. Verz. 159. 5.

*Papilio sylvestris* Pod. Mus. Graec.

*Papilio Thaumas* Esp. Pap. tab. 36. fig. 2. 3.

Habitat in Aira montana Dom. Schieffermyller.

Affinis P. Comma at distinctus. Antennae supra nigrae, subtus flauſcentes. Alae omnes fuluae, haud maculatae lineola parua in medio margineque nigris. Ciliae marginis tamen albidae. Alae subtus immaculatae.

*Faemina* absque linea alae anticae.

*Larua solitaria, viridis, immaculata.*

*Puppa tenuiſſime folliculata, viridis.*

*Syluanus.* 763. P. P. V. alis diuaricatis fuscis: maculis quadratis supra flavis subtus albis.

*Papilio Syluanus* Esp. pap. tab. 36. fig. 1.

Habitat in Russia boreali Dom. Boeber.

Statura omnino P. Comma. Alae omnes supra fuscae maculis plurimiſ quadratis postice emarginatis flavis. Subtus pallidiores maculis iisdem at albis.

*Taumas.* 764. P. P. V. alis diuaricatis fuscis: litura baseos fulua lineolaque media atra.

Habitat in America boreali Dom. Boeber.

Statura omnino P. Comma at distinctus. Alae omnes fuscae, nitidulae. Anticae macula magna fulua a basi ad medium marginis crassioris. In medio lineola magna atra. Posticae iminaculatae.

*Augias.* 765. P. P. V. alis diuaricatis fuluis: fascia obliqua marginaque postico nigris.

*Colon.* 766. P. P. V. alis diuaricatis fuluis: macula media marginaque striato fuscis.

767. P. P. V. alis integerrimis diuaricatis: posticis vtrinque fuscis fuluo maculatis. *Paniscus.*  
*Papilio Brontes* Wien. Verz. 160. 6.  
*Papilio Palaemon* Pall. Iter. 1. App. nr. 63.  
 $\beta$ . *Papilio Silvius* Esp. Pap. tab. 80. fig. 5. 6.  
*Papilio Silvius* Knoch Beytr.  
 Variat alis anticis fuscis fuluo maculatis et fuluis atro maculatis.
768. P. G. N. alis integerrimis diuaricatis fuscis: margine *Helirius*. nigro, anticis puncto centrali flavo.
769. P. P. N. alis diuaricatis fuscis: anticis albo punctatis, *Saturnus*. posticis subtus striatis.  
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
 Statura omnino P. Comma at minor. Alae supra omnes fuscæ, anticis punctis aliquot albis, posticis immaculatis. Subtus anticae concolores, posticae venis albis striatae.
770. P. P. V. alis subangulatis diuaricatis fuscis: fascia flava, anticarum interrupta. *Phineus.*
771. P. P. V. alis subdiuaricatis fuscis: posticis margine interiore fuluis. *Helius.*
772. P. P. V. alis integerrimis fuscis: maculis fuluis sparsis: posticis subtus immaculatis. *Metis.*
773. P. P. V. alis caudatis fuscis subtus brunneis: striga *Silenus*. flauescente.
774. P. P. V. alis caudatis fuscis: anticis maculis fenestratis, posticis candidis albis.  
 Drury Inf. 3. tab. 17. fig. 3. 4.
775. P. P. V. alis caudatis fuscis; anticis vtrinque posticis *Eudoxus*. subtus fascia alba.  
*Papilio Eudoxus* Cram. Inf. 31. tab. 366. fig. G. H.  
 Habitat Surinami.  
 Alae valde caudatae basi virescenti nitidae.
776. P. P. V. alis caudatis fuscis; maculis fenestratis, antennis vncinatis. *Proteus.*  
 Maculae alarum variant numero et colore.
777. P. P. V. alis subcaudatis fuscis: anticis vtrinque fascia flava, posticis subtus striga argentea. *Tityrus.*  
 Conf. *Papilio Coelus* Cram. Inf. 29. tab. 343. fig. C. D.

- Epitus.* 778. P. P. V. alis subcaudatis fuscis flavo maculatis: posticis subtus fascia argentea.  
*Papilio Epitus* Cram. Ins. 29. tab. 343. fig. E. F.  
*Papilio Euadrus* Cram. Ins. 29. tab. 343. fig. G. H.  
Habitat Surinamini,  
Affinis praecedenti at alae minus caudatae et fascia argentea multo latior.
- Nicias.* 779. P. P. V. alis subcaudatis fuluis; anticus apice fuscis; macula flavo hyalina.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Corpus magnum fuluum antennis vncinatis nigris. Alae anticae basi fuluae puncto fuso, apice fuscae macula magna sinuata flavo hyalina. Posticae fuluae punctis fuscis. Subtus subconcolores.
- Meronius.* 780. P. P. V. alis subcaudatis fuscis basi flavis: anticus punctis hyalinis, posticis subtus nigris; fascia cinerea.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Magnus in hac familia. Alae omnes supra fuscae basi flavae. Anticae striga e maculis quatuor hyalinis, e quibus postica maxima. Subtus anticae concolores, posticae nigrae fascia media lata cinerea. Corpus flavescentis abdome nigro segmentorum marginibus albis.
- Thyrsis.* 781. P. P. V. alis subcaudatis fuscis: anticus fascia flava, subtus omnibus purpureis flavo irroratis.
- Alpheus.* 782. P. P. R. alis subcaudatis atris: fascia sanguinea, subtus variegatis.
- Pretus.* 783. P. P. V. alis subcaudatis atris viridi maculatis, subtus subferrugineis flavo maculatis.
- Amyntas.* 784. P. P. V. alis subcaudatis fuscis senestrato maculatis: posticis subtus puncto baseos atro.
- Momus.* 785. P. P. V. alis subcaudatis fuscis basi hyalino striatis apice maculatis.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Magnitudo praecedentium. Antennae vncinatae nigrae. Alae omnes fuscae basi maculis oblongis bifidis hyalinis striatae, apice maculatae.
- Rhetus.* 786. P. P. V. alis subcaudatis fuluis; posticis margine exteriori coeruleo atris.

787. P. P. V. alis subcaudatis atris: anticis fascia niuea, posticis subtus coerulescentibus, ano sanguineo. *Clonias.*
788. P. P. V. alis subcaudatis atris: anticis fascia niuea, posticis subtus virescentibus: strigis abbreviatis flavis. *Acastus.*
789. P. P. V. alis subcaudatis coerulescentibus: anticis *Palemon.* puncto medio, posticis angulo rufis.
790. P. P. V. alis subcaudatis fuscis: anticis flavo maculatis, posticis subtus fusco glaucoque variis. *Coridon.*

791. P. P. V. alis subcaudatis concoloribus fuscis: anticis *Brontes.* fascia, posticis margine niueis.

*Papilio Ammon* Spec. Inf. 2. 134. 618.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

*Anthus.*

Paruus. Antennae vneinatae, fuscae. Alae omnes concolores fuscae anticis fascia niuea, quae tamen marginem haud attingit. Margo albae posticae albus rudimento tamen caudae fusco.

792. P. P. V. alis ecaudatis concoloribus atris: anticis macula transversa niuea, ano sanguineo. *Arinus.*

793. P. P. V. alis ecaudatis fuscis: posticis subtus fascia *Alexis.* coerulescente.

794. P. P. V. alis ecaudatis atris viridi nitentibus subtus *Iupiter.* viridibus; venis margineque nigris, capite anoque sanguineis.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Magnus in hac familia. Antennæ nobis desunt. Caput yillosum sanguineum palpis apice nudis nigris. Corpus nigrum ano sanguineo. Alae supra striatae, atræ viridi colore nitentes. Apex alae albicat. Subtus virides nitidae venis margineque omni nigro.

795. P. P. V. alis ecaudatis fuscis: maculis aliquot fenestras, antennis vncinatis. *Thrax.*

*Papilio Sebaldus* Cram. Inf. 29. tab. 342. fig. A. B.

*Papilio Rumafis* Cram. Inf. 29. tab. 342. fig. C.

Variat colore baseos alarum flavescente, virescente et coerulescente.

796. P. P. V. alis ecaudatis fuscis hyalino maculatis: posticis subtus vittis duabus flavescentibus margine tenuiori fulvo. *Marcus.*

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

*Paruus.* Corpus fuscum antennis vncinatis. Alae anticae concolores, fuscae maculis aliquot albo hyalinis. Posticae supra fuscae macula magna media margineque tenuiori albis, subtus fuscis vittis duabus exteriori marginali flavescentibus. Margo interior fulvus.

*Fleſus.* 797. P. P. V. alis ecaudatis fuscis: anticis fenestrato maculatis, posticis subtus disco albo nigro punctato.

*Dan.* 798. P. P. V. alis ecaudatis obscure cinereis fuscō punctatis: anticis maculis fenestratis.

Habitat Tranquebariae Dom. Plug.

Corpus paruum obscure cinereum antennis vncinatis nigris. Alae omnes obscure cinereae punctis strigaque postica fuscis. Anticae in medio maculis tribus anteriore angulata et punctis quatuor minutis approximatis ad marginem crassiorem hyalinis. Subtus concolores.

*Nothus.* 799. P. P. V. alis ecaudatis fuscis: anticis punctis fenestratis posticis subtus albis: margine fuscō; punctis sexocellaribus.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

*Paruus.* Antennae desunt. Corpus fuscum abdomine subtus albo. Alae anticae concolores, fuscae maculis sparsis, fenestratis. Posticae supra fuscae vix maculatae, subtus albae punctis tribus coeruleo argenteis annulo fuscō cinctis. Margo posticus fuscus punctis sex coeruleo argenteis annulo obscuriori cinctis.

*Silvius.* 800. P. P. V. alis ecaudatis fuscis: disco flavescente fuscō maculato, posticis subtus cinereis fuscō vndatis.

Habitat ad Cap. Bon Spei Dom. Lund.

*Magnus* in hac familia. Alae omnes supra fuscae disco flavescente, anticis arcu magno atro posticis striga abbreviata e punctis tribus nigris. Subtus anticae cinereae disco fulvo arcu magno punctisque nigris, posticae cinereae strigis obsoletis vndatis fuscis.

*Salus.* 801. P. P. V. alis dentatis fulvis nigro fasciatis: anticis maculis posticis centro fenestratis.

*Iacchus.* 802. P. P. V. alis ecaudatis flavo maculatis: posticis subtus punctis sex niueis.

803. P. P. V. alis dentatis subconcoloribus atris: anticis *Gnetus*.  
maculis tribus fenestratis, posticis coeruleo fasciatis.
804. P. P. V. alis ecaudatis concoloribus fuscis: posticis *Anaphus*.  
apice flauis.
805. P. P. V. alis ecaudatis fusco atroque variis: posticis *Sebaldus*.  
subtus angulo ani flauo.  
Habitat in America Mus. Dr. Hunter.  
Magnus. Antennae atrae vix clavatae, vncinatae. Corpus atrum. Alae apice obtuse, haud rotundatae, sed quasi truncatae fusco atroque variegatae. Subtus fuscae angulo ani late flauo punctis aliquot fuscis.
806. P. P. V. alis ecaudatis fuscis: disco fuluo, anticis *Euadrus*.  
subtus punctis argenteis subocellatis.  
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lund.  
Statura praecedentium. Antennae extrorsum crassiores. Alae supra omnes fuscae disco fuluo. Subtus anticae cinereae disco fuluo punctis sparsis atris pupilla argentea, posticae maris cinereo fuscoque variae punctis cinereis, faeminae fuscae cinereo punctatae.
807. P. P. V. alis rotundatis fuscis basi virentibus, posticis *Bixae*.  
subtus fascia lutea.
808. P. P. V. alis subcaudatis viridi fuscis: anticis macula *Polyclitus*.  
alba, subtus maculis fuluis argento marginatis.
809. P. P. V. alis rotundatis integerrimis fuscis: posticis *Aracinthus*.  
subtus griseis; maculis ocellaribus albis.  
*Papilio Steropes* Wien. Verz. 160. 7.  
*Papilio Steropes* Esp. pap. tab. 41. fig. 1.  
*Papilio Morpheus* Pall. Iter. I. 471. 64.  
*Papilio nigro fuscus nitens*, alis subtus limbo dentato fuluo, secundariis maculis duodecim albis.  
Geoff. Ins. 2. 66.-36.  
Habitat et in Russia australiori frequens.
810. P. P. V. alis rotundatis integerrimis atris: anticis *Hemes*.  
macula, posticis fascia alba.
811. P. P. V. alis rotundatis integerrimis: anticis atris albo *Eumelus*.  
maculatis, posticis fuluis nigro venosis.
812. P. P. V. alis rotundatis integerrimis atris immaculatis, *Philemon*  
anteunis vncinatis.  
Plures huius sunt aut species aut varietates.

- Maenas.* 813. P. P. V. alis integris viridi atris nitentibus margine albis: posticis subtus fascia alba ore anoque rubris.  
Habitat in America Mus. Dr. Hunter.  
Affinis P. Brixae at paullo maior. Antennae vncinatae atrae, Corpus viridi atrum, nitidum ore anoque rubris. Alae omnes viridi atrae margine albo. Posticae supra immaculatae subtus fascia alba.
- Phidias.* 814. P. P. V. alis integris atris nitentibus margine albis ore anoque rubris.  
Alae posticae subtus ante marginem rubrae.
- Lycagus.* 815. P. P. V. alis rotundatis integerrimis viridi coeruleis immaculatis, ano sanguineo.
- Syrichtus* 816. P. P. V. alis rotundatis integris nigro alboque variis, posticis subtus cinereis: strigis vndatis nigris.  
*Papilio Orcus* Cram. Ins. 28. tab. 334. fig. I. K. L.
- Maimon.* 817. P. C. V. alis integris albis; margine maculisque nigris.  
Habitat Cajennae.
- Talaus.* 818. P. P. V. alis integerrimis concoloribus fuscis: anticis punctis albis basique sanguineis, posticis disco albo.  
*Papilio Talaus* Cram. Pap. 33. tab. 393. fig. C.
- Mimas.* 819. P. P. V. alis integerrimis fuscis margine ferrugineis: subtus striga punctorum nigrorum.
- Gentius.* 820. P. P. V. alis integris concoloribus flauis: limbe atro; anticarum fasciis flauis.
- Malvae.* 821. P. P. V. alis dentatis diuaricatis fuscis cinereo vndatis: anticis punctis fenestratis, posticis subtus punctis albis.  
Roef. Ins. 1. Pap. 2. tab. 10. fig. 5. 6.  
Schaeff. Icon. tab. 276. fig. 5. 6.  
*Larua* folia filis connectit.  
Puncta alarum fenestrata subtus distinctiora.
- Alceae.* 822. P. P. V. alis diuaricatis fusco cinereoque variis; anticis punctis fenestratis, posticis subtus cinereis immaculatis.  
*Papilio Alceae* Esp. Pap. tab. 51. fig. 3. mal.  
Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.  
Nimis affinis P. Malvae. Alae anticae minus obscuriores cinereo variae punctisque aliquot fenestratis. Po-

sticae obscuriores fasciis macularibus albidis. Subtus omnes cinereae fere immaculatae punctis aliquot marginalibus nigris.

823. P. P. V. alis integris diuaricatis nigris albo punctatis, posticis subtus cinereis: fasciis duabus flavis. *Sidae.*

*Papilio Sidae* Esp. pap. tab. 90. fig. 3.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Statura omnino P. Fritilli at paullo maior. Alae omnes supra fuscae maculis quadratis albis posticarum obsoletioribus. Subtus anticae obscurae maculis iisdem albis, posticae albidae fasciis duabus flavis nigro marginatis, anteriore abbreviata.

824. P. P. V. alis integris diuaricatis nigris albo punctatis. *fritillum.*

*Papilio* alis denticulatis diuaricatis nigris albo punctatis. Geoff. Inf. 2. 67. 38.

*Papilio Maluae minor* Esp. pap. tab. 51. fig. 2.

Schaeff. Elem. tab. 94. fig. 9.

Wien. Verz. 159. 3.

Habitat in Germaniae Dipsaco Fullonum.

Diffr. sane a P. Maluae. Alae haud dentatae at margine albo nigroque variegato.

Color alae posticae subtus variat.

Variat maior maculis alarum pluribus vix tamen distinctus in Russia meridionali *Papilio Maluae maior.*  
Esp. pap. tab. 23, fig. 2.

825. P. P. V. alis integris fuscis: anticis albo maculatis, posticis punctatis, omnibus lunula media niuea. *Lauatae,*

Habitat Kiliae.

Statura omnino P. Fritilli at duplo minor. Alae anticae concolores fuscae in medio valde albo maculatae et in centro lunula niuea distincta annulo nigro cincta. Posticae fuscae albo punctatae lunula media distincta, subtus concolores.

826. P. P. V. alis integerrimis concoloribus albis: margine *Menalcas* nigro.

827. P. P. V. alis integerrimis striatis fuscis: fascia lata *Menippus* alba.

828. P. P. V. alis integris concoloribus nigris: anticis punctatis, posticis fascia albis. *Clita.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino praecedentium. Alae omnes fuscae, anticae maculis aliquot fenestrato albis, posticae fascia media lata alba.

- Virbius.* 829. P. P. V. alis integerrimis nigris: anticis punctis tribus, posticis apice albis.
- Phocion.* 830. P. P. V. alis integerrimis: anticis fuscis, posticis flavis.
- Tages.* 831. P. P. V. alis integerrimis: denticulatis fuscis obsolete albo punctatis.
- Niso.* 832. P. P. V. alis integerrimis subreversis fuscis: anticis supra punctis quatuor albis sparsis.
- Spiro.* 833. P. P. V. alis integerrimis reversis nigricantibus vndeque albo maculatis.
- pygmaeus* 834. P. P. V. alis integerrimis fuscis immaculatis.

148. SPHINX. *Palpi* duo reflexi, pilosi.  
*Lingua spiralis* plerisque exserta.

*Antennae* squamatae.

- ocellata.* 1. S. alis angulatis: posticis rufis; ocello coeruleo.  
 X Esp. Inf. 2. tab. 1.
- Nefus.* 2. S. alis angulatis atro fasciatis posticis rufis: margine atro, abdomine rufo flavoque maculato.
- Quercus.* 3. S. alis angulato dentatis cinereis: strigis obscurioribus, posticis ferrugineis: angulo ani albo.  
 X Esp. Inf. 2. tab. 19. et Tab. 26 f. 1.  
 Mas corpore cinereo, faemina fusco.
- lugubris.* 4. S. alis angulatis brunneis: anticis punto subocellarī atro.
- fusca.* 5. S. alis angulatis obscuris: punto atro, posticis atris: fascia fulua.
- asilifera.* 6. P. alis eroso dentatis anticis cinereis: fascia obscuriore: punto nigro, posticis rubris: margine nigro.
- fenestrina* 7. S. alis eroso dentatis fusco aureis: maculis duabus fenestratis.  
 X Esp. Inf. 2. tab. 23. fig. 1.

8. S. alis dentatis reuersis griseis, posticis basi ferrugi. *Populi.*  
neis, anticis puncto albo.

✗ Esp. Inf. 2. tab. 2.

9. S. alis angulatis virescenti nebulosis saturatius fasciatis, *Tiliae.*  
posticis supra luteo testaceis.

✗ Esp. Inf. 2. tab. 3. et 9. 22 t. 3.

10. S. alis subangulatis cinereis: puncto baseos fascia me- *Rhadami-*  
dia obliqua abbreviata abdominisque primo segmen- *flus.*  
to nigris.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Statura omnino S. *Tiliae* at paullo minor. Caput cum  
antennis cinereum. Thorax hirtus, cinereus linea  
dorsali nigra. Abdomen cinereum primo segmento  
toto nigro. Alae subangulatae, anticae cinereae  
puncto distincto baseos atro. In medio marginis te-  
nuioris striga abbreviata obliqua alba, quae a macu-  
la fusca magna anguli ani excipitur. Versus apicem  
litura nigra. Subtus obscuriores fasciolis cinereis.  
Posticae obscurae angulo ani cinereo striga parua  
atra, subtus griseae.

II. S. alis eroso virescentibus: fascia saturatiore, posticis *Oenothe-*  
rae. fulcis apice atris.

✗ Esp. Inf. 2. tab. 20. et Tab. 26 fig. 2. 3.

Habitat in *Oenothera*.

*Larua* solitaria, ecaudata, fusca: stigmatibus sanguineis  
segmentoque penultimo ocello ovali atro: pu-  
pilla alba.

*Puppa* nuda, brunnea.

12. S. alis subangulatis viridibus: fasciis variis pallidiori- *Nerii.*  
bus saturatoribus flavescensibusque.

Cram. Inf. 19. tab. 244. fig. D.

✗ Esp. Inf. 2. tab. 4.

13. S. alis dentatis: anticis fulvis; maculis duabus aureis, *Apulus.*  
posticis niveis, antennis plumosis.

14. S. alis dentatis fusco cinereoque nebulosis, posticis *Penaeus.*  
ferrugineis; margine nigro.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Medius. Corpus cinereo fuscum thorace apice macu-  
la nigra. Abdomen subtus albidum ferrugineo irro-  
ratum punctisque vtrinque tribus distinctis. Alae  
an-

anticae in primis apice variegatae puncto medio paruo albo distineto. Posticae ferrugineae margine nigro. Subtus nervis striatis ferrugineis apice obscuriores.

- Pylas.* 15. S. alis erofo dentatis variegatis, posticis fuluis basi flauis apiceque nigris.
- obscura.* 16. S. alis dentatis posticis rubris: margine nigro, abdome supra pallido immaculato.
17. S. alis dentatis nigris: strigis tribus approximatis pallidis, posticis flauis nigro striatis.  
Nimis affinis S. Caricae.
- dentata.* 18. S. alis dentatis posticis fuscis: striga alba, abdomine albo annulato.
- Alope.* 19. S. alis dentatis fuscis: posticis flauis apice nigris, abdome nigro: cingulis interruptis pallidis.  
*Sphinx Alope* Drury Ins. I. tab. 27. fig. 1.  
Cram. Pap. 26. tab. 301. fig. G.  
Habitat in India Dom. Vahl.  
Statura omnino P. Ello. Caput et thorax fusca immaculata. Antennae ruchi albida. Alae anticae dentatae cinereo substriatae, subtus fuscae innaculatae. Posticae flauae apice nigrae, subtus fuscae macula marginis tenuioris flava. Abdomen nigrum cingulis quinque medio interruptis albis. Subtus griseum.  
Variat rarius alis anticis supra cinereis attamen distincta ab. S. Ello.
- Ello.* 20. S. alis subdentatis cinereis posticis rufis: margine nigris, abdome pallido: cingulis atris.  
Cram. Ins. 26. tab. 301. fig. D.  
Merian. Sur. tab. 61. fig. 2.  
Habitat Surinamii.
- Iatrophae.* 21. S. alis subdentatis posticis nigris basi rufis fasciaque fenestrata, capite bicorni.
- Medea.* 22. S. alis subdentatis anticis viridibus, posticis fuluis: margine nigro.
- Pholus.* 23. S. alis emarginatis nigris apice pallidioribus: strigis nigris, posticis brunneis.
- carolina.* 24. S. alis integris, omnibus margine postico albo punctatis, abdome ocellis sex parium fuluis.

25. S. alis integerrimis griseis, posticis fuluis: strigis *strigilis*: fuscis.
26. S. alis integris posticis luteis: fasciis fuscis, abdomi- *Atropos*. ne luteo: cingulis nigris.  
 X Esp. Inf. 2. tab. 7. fig. 1. *Larva* fig. 2. *chrysal.* fig. 3.  
*Larua* die sub terra latet, vesperi prouenit, pascit.
27. S. alis integris fusco coeruleoque variis, posticis ful- *Erotus*. uis: margine nigro.
28. S. alis integris obscure viridibus: lineolis coeruleis, *Phorbus*: posticis atris: maculis duabus fuluis.
29. S. alis fusco nebulosis, posticis fascia nigra anguloque *Ficus*. ani albo.  
 Cram. Inf. 21. tab. 246. fig. E.
30. S. alis dentatis cinereis fusco variis, abdomine sub- *Tetrio*. tus albo: punctis quatuor ferrugineis.
31. S. alis variegatis: puncto medio albo, abdomine ocel- *rufica*. lis trium parium fuluis.  
*Sphinx rufica* Cram. Inf. 26. tab. 30. fig. A.  
 Merian. Sur. tab. 5.  
 Habitat in Americae Iatropa.
- Larua* caudata flavo nigroque fasciata, capite cauda- que sanguineis.  
*Puppa* fusca.
32. S. alis cinereis nigro nebulosis, posticis supra disco *pagana*. ferrugineo.
33. S. alis integris canis: anticis lineolis tribus confertis *Pinastris*. nigris, abdomine fusco: cingulis albis.  
 X Esp. Inf. 2. tab. 12. fig. 1. *Larva* fig. 2. *chrysal.* fig. 3.
34. S. alis integris griseis: puncto medio albo, abdomi- *plebeja*. nis lateribus albis nigro marginatis.
35. S. alis integris griseis: fasciis duabus virescentibus, po- *Euphor- sticis basi nigraque nigris, antennis niueis.* biae.  
 X Esp. Inf. 2. tab. 11. fig. 1. *var. rofusa* fig. 2. *Larva* fig. 3. *chrysal.* fig. 4.
36. S. alis integris virescentibus: vitta alba, posticis pal- *Galii*. lidis basi strigaque atris, antennis fuscis.  
 X Esp. Inf. 2. tab. 21.  
 Degeer. Inf. 2. tab. 8. fig. 6-11.  
 Roef. Inf. 3. tab. 6. fig. 1. 2. 4. *Larua*.

- lineata.* 37. S. alis virescentibus: fascia striisque albis, posticis nigris: fascia rubra.  
*Sphinx Koechlini* Arch. Inf. Fyesl. Monog. c fig.  
 Petiv. Gazoph. tab. 12. fig. 9.  
 Habitat in Gallio vero.  
*Larua caudata*, flavicans nigro maculata, capite linea dorsali stigmatibusque rubris.  
*Puppa fusca*.
- Vesperti-* 38. S. alis integris cinereis immaculatis, posticis sanguineis basi apiceque nigris. Sp. Inf. App. 504.
- Vitis.* 39. S. alis integris virescentibus: fascia vittaque albis, posticis cinereis: fascia nigra margineque rufo.  
 Cram. Inf. 23. tab. 23. tab. 267. fig. C.  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 20. fig. 1.
- Satellitla.* 40. S. alis integris griseo nebulosis: anticis puncto nigro ocellari sesquialtero, posticis basi cinereis.
- Oldenlan-* 41. S. alis integerim griseis: fascia obliqua albo argentea punctoque medio fuso, abdomine lineis duabus argenteis approximatis.  
 Thorax vtrinque linea argentea. Alae posticae nigrae fascia albida.
- Lycetus.* 42. S. alis integris cinerascentibus, abdomine griseo vtrinque lineis tribus aureis.
- Boerha-* 43. S. alis integris virescentibus, posticis fuscis: fascia fulua, abdomine subtus aureo.  
*Sphinx Pluto* alis integris cinereis, posticis rubris apice fuscis, abdomine griseo vtrinque linea aurea.  
 Spec. Inf. 2. 148. 39.
- Minus.* 44. S. alis integris virescentibus posticis ferrugineis: margine nigro, abdomine subtus cinerascente.  
 Habitat in India Dom. Lund.  
 Statura et magnitudo fere S. Boerhauiae. Caput et thorax virescentia, immaculata. Antennae fuscae. Abdomen cinereum. Alae anticae subangulatae virides litura ad angulum ani apiceque cinereis. Posticae ferrugineae margine nigro.
- didyma.* 45. S. alis integris fuscis: anticis punctis duobus approximatis albis.
- Farce.* 46. S. alis integris, anticis griseis: lunula media argentea, posticis rufescentibus.

47. S. alis integris viridi purpureoque variis, posticis rubris basi atris. *Elpenor.*  
 ✕ Esp. Inf. 2. tab. 9. f. 1. *Larva* fig. 2. var. *virid.* fig. 3. *Chrysal.* fig. 4.
48. S. alis integris flavo purpureoque variis: abdomine subnus sanguineo albo punetato. *Porcellius.*  
 ✕ Esp. Inf. 2. tab. 10.
49. S. alis integris anticis fuscis apice variegatis, posticis *Hylaeus.* atris albo maculatis.
50. S. alis integris nebulosis posticis subfasciatiss, abdomini cingulis rubris atris albisque. *Convolvuli.*  
 Cram. Inf. 19. tab. 225. fig. D.  
 ✕ Esp. Inf. 2. tab. 5.  
*Ambram* spirat oculis phosphorescentibus.
51. S. alis integris posticis rufis: fasciis tribus nigris, *Ligustri.* abdomine rubro: cingulis nigris.  
 ✕ Esp. Inf. 2. tab. 6.  
 Sepp. Inf. 3. 19. tab. 4.
52. S. alis integris posticis nigro fasciatis basi sanguineis marginie albo punctatis, abdomine cingulis sanguineis atrisque. *cingulata*
53. S. alis integris fuscis posticis rufis nigro striatis, abdome cinereo: annulis atris. *Caicus.*
54. S. alis integris griseis: striis albis, posticis fasciis: *Celerio.* maculis sex rubris.  
 ✕ Esp. Inf. 2. tab. 8. fig. 1.
55. S. alis integris fuscis atro maculatis, posticis rubris: *Crautor.* margine atro.
56. S. alis integris anticis supra griseis, posticis rubris *Alesto.* basi margineque atris.
57. S. alis integris virescentibus: puncto fuluo, posticis *Clotho.* fuluis.  
*Habitat ad Cap. Bon. Spei.*  
 Antennae fuluae. Statura omnino S. *Alecto.* Alae anticae integrae, acutae, virescentes puncto paruo centrali fuluae, subtus cinereae.
58. S. alis integris cinereis: posticis supra vitta nigra. *Gnoma.*
59. S. alis integris anticis viridi nebulosis, posticis fuscis immaculatis. *Hespera.*

- Anubus.* 60. S. alis integris anticis subferrugineis, posticis atris: striga punctorum albidorum.
- Nechus.* 61. S. alis integris anticis viridibus: striga testacea posticis nigris: maculis baseos fasciaque flaviis.
- Butus.* 62. S. alis integris fuscescentibus, posticis albidis: fascia maculari albida.  
Habitat in India.  
Statura praecedentium. Caput et thorax viridia linea laterali albida. Abdomen supra obscure virescens subtus pallidum. Alae fuscescentes striga postica obscuriore. Posticae nigrae fascia maculari albida. Subtus omnes flavo testaceoque variae.
- Labruscae.* 63. S. alis virescentibus anticis subtus puncto albo abdominis lateribus punctis quinque albis.
- Caricae.* 64. S. alis integris posticis subtus luteis, abdome cincereo: cingulis atris.
- terfa.* 65. S. alis integris griseis: puncto fusco, posticis nigris basi fasciaque maculari albis.  
Cram. Pap. 34. tab. I. fig. C.
- Vampyrus.* 66. S. alis integris cinereis pallide strigosis, posticis rufis: margine nigro.  
Habitat in Indiis.  
Parua. Caput et thorax virescentia linea laterali albida. Abdomen cinereum linea laterali aurea. Alae anticae cinereae strigis aliquot approximatis a medio marginis tenuioris ad apicem alae ductis. Posticae rubrae margine nigro. Subtus omnes testaceae atomis fuscis.
- Thyelia.* 67. S. alis ferrugineis: vitta nigricante.

149. SESIA. *Palpi* duo reflexi.*Lingua* exserta truncata.*Antennae* cylindricae.

- Tantalus* 1. S. abdome barbato: segmento tertio niveo.
- Ixion.* 2. S. abdome barbato: striga alba rufaque, alis anticis variegatis: punctis tribus albis.

3. S. alis fenestratis: margine atro, abdomine cyaneo basi *Metas.*  
atro: cingulis tribus flauis.
4. S. alis fenestratis, abdomine barbato viridi: cingulo *Hylas.*  
purpureo.
5. S. abdomine barbato, alis fuscis: anticis fasciis dua-*Fadus,*  
bus abbreviatis albis.
6. S. abdomine barbato: lateribus albo nigroque variis, *stellata-*  
alis posticis fe. rugineis. *rum.*
- ✗ Esp. Inf. 2. tab. 13.  
Wien. Verz. 43. 2.
7. S. alis brunneis immaculatis: posticis emarginatis. *Brunnus.*
8. S. alis atris: maculis duabus anticarum flauis, postica-*8 macu-*  
rum albis. *lata.*
9. S. alis variegatis, posticis atris: macula baseos hyali-*Marica.*  
na nigris.
10. S. abdomine barbato postice fusco, alis macula hya-*Thysbe.*  
lina.
11. S. abdomine barbato nigro: fascia flauescente, alis fucifor-*fenestratis:* margine nigro. *moris.*
- ✗ Esp. Inf. 2. tab. 14.  
Wien. Verz. 44. 1.
- ✗ Conf. *Sphinx bombyliformis* Esp. Inf. 2. tab. 23. vix fa-  
tis distincta.
12. S. alis fenestratis, abdomine flavo: incisuris atris, tho-*apiformis*  
race nigro: maculis duabus flauis. *f. 14 f. 2. A/Tab. 29 f. 2. 3.*  
*Sphinx crabroniformis* Wien. Verz. 44. 2.
13. S. alis hyalinis margine fasciaque atris, abdomine bar-*sphegi-*  
bato: cingulo flavo, antennis ante apicem albis. *formis.*  
*Sphinx sphegiformis* Wien. Verz. App. 305. 10.  
Habitat in Austria Dom. Schieffennmyller.
- Minor S. apiformi. Antennae nigrae ante apicem al-  
bae. Caput nigrum palpis subtus flauis. Thorax  
ater lateribus flauis. Abdomen barbatum, atrum  
cingulo secundi segmenti flavo, praetereaque pon-  
eta utrinque duo lateralia flaua. Pectoris latera flaua.
14. S. alis anticis fuscis posticis fenestratis, abdomine bar-*afilifor-*  
bato atro: cingulis tribus flauis. *moris.*  
*Sphinx afiliformis* Wien. Verz. App. 305.

Habitat in Europa australiori Dom. Schieffermyller. Kiliæ Dom. Daldorf.

**Minor** S. apiformi. Palpi apice flavi. Caput atrum linea oculorum argentea. Thorax ater margine antico tenuissime flavo punctoque flavo ante alas. Abdomen atrum, nitidum cingulis tribus flavis. Alae anticae fuscae, immaculatae, posticae hyalinae margine postico nigro. Tibiae posticae flavae.

**haemorrhoidalis.** 15. S. alis hyalinis: margine fasciaque anticarum nigris, ano barbato sanguineo.  
Thorax puncto vtrinque albo. Abdomen basi sanguineum.

**culicifor-** 16. S. alis hyalinis: margine fasciaque nigris, abdome  
**mis.** barbato? cingulo fuluo.  
x Esp. Ins. 2. tab. 15. fig. 1.  
Wien. Verz. 44. 3.

**tenthredi-** 17. S. alis fenestratis: margine omni fasciaque nigris, capite thoracis lateribus abdominisque barbati cingulo fuluo.

*Sphinx tenthrediniformis* Wien. Verz. 44. 6.

Habitat in Europa australi Dom. Schieffermyller.

Parua. Antennae nigrae. Caput thoracisque latera fulua. Pedes fului geniculis nigris.

**tipulifor-** 18. S. alis fenestratis: margine fasciaque nigris, abdome  
**mis.** ne barbato nigro: incisuris alternis margine flavis,  
x Esp. Ins. 2. tab. 15. fig. 3.  
Schaeff. Icon. tab. 224. fig. 1. 2.

Wien. Verz. 44. 4.

Habitat in medulla Ribis rubrae.

*Larva solitaria*, subpilosa, albida, capite pedibusque flavis lineaque dorsali obscuriore.

**Ichneumoniformis.** 19. S. alis fenestratis: margine fasciaque nigris punto fuluo, abdome cingulis albis nigrisque alternis.

*Sphinx Ichneumoniformis* Wien. Verz. 44. 7.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Antennae nigrae interdum basi luteae. Caput albidum vertice nigra. Thorax niger lateribus flavis. Abdomen cingulis albis nigrisque latioribus alternis. Alae anticae nigrae margine omni fusco et in medio fascia nigra punto fuluo, posticae hyalinae margine postico punctoque ad marginem interiorem nigris. Pedes flavi.

20. S.

20. S. alis fenestratis margine fasciaque nigris, abdomi- *vespifor-*  
ne barbato nigro: segmento secundo vltimisque *mis.*  
margine flauis.

*Sphinx vespiformis*-Linn. Syst. Nat. 2. 804. 33. In. Sr.

1097.

*Sphinx vespiformis* Wien. Verz. 44. 5.

Habitat in Europae floribus.

### 150. ZYGAENA, *Palpi* duo reflexi.

*Lingua* exserta setacea.

*Antennae* medio crassiores.

1. Z. alis anticis cyaneis: punctis sex rubris, posticis ru- *Filipen-*  
bris margine cyaneo. *dulæ.*

✗ Esp. Inf. 2. tab. 16.

Wien. Verz. 45. 4.

Variat rarius abdominis cingulo rufo.

+ *Sphinx Peucedani* Esp. pap. 2. tab. 25. fig. 2. ♂ *an Sexus Ephiatæ.*

Roes. Inf. 1. tab. 57. fig. 6.

2. Z. atra, alis anticis viridibus: maculis tribus oblongis approximatis sanguineis, posticis rubris. *Pythia.*

*Sphinx Scabiosæ* Esp. Inf. 2. tab. 24. fig. 3.

*Sphinx Pilosellæ* Esp. Inf. 2. tab. 24. fig. 2.

Habitat in Pilosella.

*Larua pilosa* alba, capite lineis duobus punctorum pedibusque anticis nigris, posticis flauis.

3. Z. cyanea alis anticis viridibus: punctis quinque rubris, posticis sanguineis: limbo cyaneo. *Fulvia.*

✗ *Sphinx Lonicerae* Esp. Inf. 2. tab. 24. fig. 1. ♀ ♂.

*Sphinx Loti* Wien. Verz. 45. 3.

Habitat in Loto corniculato.

4. Z. cyanea, alis anticis maculis tribus connatis, posticis totis rubris. *Sedi.*

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Statura omnino praecedentium. Corpus totum cyanum, nitidum. Alae anticae cyaneae maculis tribus magnis vna post alteram positis annulo flano cinctis rubris. Posticae rubrae margine tenuissime nigro.

5. Z. viridi atro, alis punctis fenestratis: anticarum sex, *Phegea.*  
posticarum duobus, abdome cingulo luteo.

*Esp. Inf. 2. tab. 27. fig. 1. 2.*

*Larua fusca, capite pedibusque rufescentibus, dorso plumis fasciculatis albidis.*

*Ephialtes* 6. Z. cyanea, alis anticis punctis sex rubris, posticis unico, abdomine cingulo rubro.

*Sphinx falcatae* Wien. Verz. 45. 6.

*Sphinx Coronillae* Wien. Verz. 45. 7.

*Esp. Inf. 2. tab. 27. fig. 3.*

*Variat punctis baseos uti et cingulo abdominalis aut flauis aut rubris.*

*Larua pilosa flauescens, capite pedibus lineisque duabus nigris.*

*Aeacus*. 7. Z. cyanea, alis anticis punctis sex flauis, posticis flauis: margine cyaneo.

*Sphinx Aeacus* Wien. Verz. 45. 8.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

*Statura et magnitudo* Z. Ephialtes. *Corpus cyaneum, nitidum cingulo abdominalis flauo. Alae cyanæa punctis sex flauis 2. 2. 2. oblique positis. Posticae flauæ margine late cyaneo.*

*Agrius*. 8. Z. nigra, alis hyalino punctatis: anticis atris, posticis cyaneis.

*annulata*, 9. Z. nigra alis anticis maculis sex, posticis basi maculaque flauis, abdomine flauo annulato.

*carniolica* 10. Z. atra, alis anticis cyaneis: punctis sex sanguineis ocellatis, posticis rubris: limbo nigro.

*Esp. Inf. 2. tab. 27. fig. 4.*

*Sphinx caffra* Esp. Inf. 2. tab. 27. fig. 4.

*Sphinx Onobrychis* Wien. Verz. 45. 5.

Habitat in Aedysaro Onobrychis.

*Variat abdominali immaculato et cingulo rubro.*

*caffra*. 11. Z. nigra alis fuscis: punctis quinque sanguineis, posticis rubris: margine fuso.

Cram. Pap. 33. tab. 394. fig. E.

*guineensis* 12. Z. alis fuscis: maculis duabus albis, abdomine cyaneo: cingulo fuluo.

*Pessalis*. 13. Z. alis nigris: punctis fenestratis antecarum sex, postcarum unico, abdomine cingulis cyaneis sanguineisque alternis.

14. Z. alis nigris: punctis fenestratis anticarum sex, posticarum duabus, abdomine cingulis sanguineis. *Cerbera.*
15. Z. coerulea, humeris rubro punctatis, alis nigris: *Thetis.* anticis apice, posticis disco hyalinis.
16. Z. alis atris albo punctatis, abdomine flavo nigro lineato. *Phlegmon.*
17. Z. alis nigris: anticis maculis quinque, posticis brevissimis; disco hyalino, abdomine flavo nigro annulato. *Thelebus.*

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Caput flavum ore nigro. Thorax flavus collari nigro. Abdomen flavum annulis sex nigris. Alae anticae nigrae basi parum flavescentes maculis quinque magnis hyalinis. Posticae breves, hyalinae margine nigro. Pedes nigri tibiis apice albantibus.

18. Z. alis atris: anticis maculis quinque, posticis vnicâ fenestratis, abdomine atro: fasciis duabus flavis, fronte alba. *Sperbius.*

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Statura omnino praecedentis. Antennae nigrae apice albae. Caput nigrum fronte late alba. Thorax ater scutello flavo. Abdomen atrum annulo bascos medioque flavis. Anus albus macula vnicâ subflavecente.

Variat rarius ano nigro. Frons semper alba.

19. Z. alis fuscis: maculis anticarum quatuor posticarum *fenestrata* vnicâ hyalinis, abdomine flavo nigroque annulato.

20. Z. fusca, abdomine vtrinque maculis quinque coeruleis, ano ore basique femorum abdominalisque coccinea.

Cram. Pap. 33. tab. 394. fig. G.

21. Z. nigra viridi maculata, alis anticis maculis tribus, posticis vnicâ aureis. *Hyparchus.*

22. Z. alis virescenti atris: maculis aureis posticis fuscis basi aureis. *Argynnis.*

23. Z. atra, alis hyalinis: margine omni nigro, abdomen sanguineo: linea dorsali cingulisque atris. *Myrtea.*

- Andromacha.* 24. Z. atra, alis hyalinis: margine fasciaque nigris, ano sanguineo.  
*Conf. Sphinx Caunus* Crain. Inf. 19. tab. 224. fig. E.
- flauicornis.* 25. Z. alis flauo hyalinis: anticis apice fuscis, corpore cyaneo flauo maculato, antennis pedibusque flauis.  
*Habitat* Cajennae Dom. v. Rohr.  
*Magna* in hoc genere. Antennae pectinatae apice setaceae, flauae. Caput flauum. Thorax nigro cyaneus punctis duobus anticis, habenis maculisque duabus posticis flauis. Macula quadrata, late emarginata loco scutelli. Abdomen cylindricum, cyaneum segmentis anticis tribus supra fascia interrupta flaua, subitus punto medio niueo. Alae flavescentes, hyalinae, anticis apice fuscis. Pedes flavi.
- Bromius.* 26. Z. ferruginea, alis hyalinis: margine omni nigro.
- Eryx.* 27. Z. alis atris anticis basi aureis: macula media abdomeque subitus sanguineis.
- Egeon.* 28. Z. alis hyalinis: anticis margine omni flauo.
- Achemon.* 29. Z. flava, alis hyalinis apice nigris, anticis basi flauis.
- nigricornis.* 30. Z. alis hyalinis: margine nigro, corpore flauo, antice posticeque atro cyaneo maculato.  
*Habitat* Cajennae Dom. v. Rohr.  
*Parua.* Antennae pectinatae, nigrae. Caput nigrum ore flauo palpis nigris punctoque verticis cyaneo. Thorax flauus antice ater maculis quatuor approximatis cyaneis. Abdomen cylindricum, flauum ano atro strigis duabus cyaneis. Alae albo hyalinae margine omni tenuissime nigro. Pedes flavi apice nigri.
- Melissa.* 31. Z. alis atris: disco hyalino, abdome nigro; lineis tribus aureis, ano fuluo.
- Polymeena.* 32. Z. nigra, alis maculis luteis anticarum tribus, posticarum duabus, abdome cingulis duobus coccineis.
- Lethe.* 33. Z. alis nigris: maculis duabus luteis, abdome cingulis rubris nigris cyaneis alboque.
- Lichas.* 34. Z. nigra viridi micans, alis striga media viridi punctaque medio albo, abdome atro: cingulis duabus aureis. Sp. Inf. App. 505.

35. Z. alis concoloribus rubris: maculis nigris margine *fausta*. nigro connexis.  
x Esp. Inf. 2. tab. 18. fig. I.  $\Delta$   $\mathcal{L}$
36. Z. alis fuscis posticis internis sanguineis, antennis *infausta*. pectinatis.  
Fyesl. Arch. Inf. Monogr. cum fig.
- x Esp. Pap. 2. tab. 35. fig. 4.
37. Z. virescens alis posticis atris: fascia alba, antennis *Eriphia*. pectinatis.
38. Z. alis oblongis atris: posticis subcaudatis basi vire- *flabelli-* scensibus *cornis*.
39. Z. alis virescentibus nitidis apice obscurioribus, ab- *Butus*. domine fuluo.  
Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.  
Medius. Antennae pectinatae, nigrae. Caput et tho- rax virescentia, nitida. Alae concolores, virescen- tes, nitidae margine magis obscuro. Corpus subtus vti abdomen totum fuluum. Anus nigricat.
40. Z. cyanea albo punctata, alis rubris: margine posti- *Pugione*. co fuso.
41. Z. alis apice fuscis: striga punctorum alborum anten. *Eurocilia* nis pectinatis.
42. Z. subfusca, alis violaceis: fasciis duabus albis sub- *peccini-* interruptis, collari sanguineo. *cornis*.
43. Z. alis fuscis: anticis maculis duabus, posticis vitta *Gyon*. abbreviata flauescensibus.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Statura omnino Z. pectinicornis at duplo fere minor.  
Antennae pectinatae, nigrae, apice simplices. Ca- put nigrum palpis reflexis albidis. Thorax niger lineis quatuor albis. Abdomen cylindricum nigrum lineis tribus albis. Alae concolores fuscae, anticae basi albo lineatae maculisque duabus posticis flaue- scensibus, posticae vitta lata flauescente. Pedes ci- nnerci.
44. Z. alis atris: anticis fascia apieis alba, thorace fuluo. *Ergotis*.
45. Z. alis nigricantibus, anticis fascia obliqua niuea. *Glaucopis*  
*Phalaena Glaucopis* Cram. Pap. 27. tab. 322. fig. D.

*Erynnis.* 46. Z. alis atris: anticis fascia obliqua testacea.

*Pylotis.* 47. Z. alis atris: anticis vtrinque posticis subtus macula niuea.

Habitat Surinami Doct. Schulz.

Parua. Antennae desunt. Caput et thorax atra collaris sanguineo. Abdomen flauum. Alae omnes atrae anticis vtrinque macula magna media niuea. Apex alae albicat. Posticae supra immaculatae, subtus macula minori niuea. Margo posticis vtrinque parum albicat.

*Syphilus.* 48. Z. alis atris: anticis vitta interrupta, posticis basi testaceis, abdomine punctato.

*Scytion.* 49. Z. alis albidis, abdomine atro flavo fasciato, ano rubro.

*Auge.* 50. Z. nigro coeruleoque varia lateribus piloso sanguineis, alis fenestratis postice nigris, antennis pectinatis.  
Antennae apice setaceae.

*g-maculata.* 51. Z. alis concoloribus nigris: maculis duabus anticarum flavis, posticarum albis.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Media. Antennae cylindricae nigrae apice subattenuatae. Caput nigrum ore orbitaque oculorum flavis. Thorax niger habenis flavis, Abdomen nigrum, immaculatum. Alae nigrae anticis maculis duabus magnis albis. Pedes nigro tibiis basi fulvo villosis.

*capistrata* 52. Z. alis nigris: anticis fasciis duabus posticis disco fenestratis, abdomine sanguineo dorso nigro.

*caudata.* 53. Z. alis flavo hyalinis apice fuscis, corpore auro maculato.

Cauda longitudine corporis. Antennae pectinatae.

*diptera.* 54. Z. alis fuscis: anticis maculis quinque fenestratis, posticis breuissimis: macula flava.

*halterata.* 55. Z. alis hyalinis: macula fusca, posticis breuissimis filiformibus nigris.

*Maja.* 56. Z. alis cyaneo nigris, abdomine basi albo punctato, pedibus posticis compressis elongatis ciliatis.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Media. Antennae subpectinatae, nigrae superne ante apicem albae. Caput cyaneo nigrum puncto vtrinque

que sub antennis albo. Thorax et pectus cyanea albo punctata. Abdomen cyaneum basi supra infraque albo punctatum. Alae nigrae, nitidae basi fasciaque cyaneis. Pedes nigri geniculis albis tibiis tarsisque posticis compressis elongatis ciliatis apice albis.

57. Z. alis anticis fuscis, posticis hyalinis, pedibus posticis elongatis hirsutissimis. *tibialis?*
58. Z. atra, alis anticis puncto baseos abdome maculis *Ladis.* transuersalibus flauis, pedibus posticis elongatis.
59. Z. fusca collaris flauescente, abdome basi cingulo niveo. Sp. Inf. 2. App. 505. *Eunolphus.*
60. Z. nigra alis anticis apice albis. *Capys.*
61. Z. atra, alis basi luteis. *Pholus.*
62. Z. viridi coerulea, alis posticis fuscis. *Statices.*
- X Esp. Pap. 2. tab. 18. fig. 2.  
Habitat in Rumice Acetosa, Globularia.  
*Larua nigricans:* lineis dorsalibus duabus lunularum albagum.
63. Z. viridi coerulea, alis posticis nigris. *Sphinx Pruni* Wien. Verz. App. 308. 12. *Prunk*  
*3.*  
Habitat in Pruno spinosa Austriae Dom. Schleffermyller.  
Nimis affinis Z. Staticis, at duplo fere minor et larua alia.  
*Larua* alia pilosa fusca, dorso carneo: linea macularum atrarum.
64. Z. cyanea, alis fuscis, ano rufo. *Acharon.*
65. Z. corpore alisque cyaneis, thorace rufo. *Styx.*
66. Z. alis anticis fuscis posticis atris: disco subhyalino, *Thoos.* collari sanguineo.

151. BOMBYX. *Palpi* duo compressi reflexi.  
*Lingua* breuis, membranacea.

*Antennae* filiformes.

*Atlas.* 1. B. alis patentibus falcatis luteo variis: macula fenestrata: anticis sesquialtera.  
 Cram. Pap. 32. tab. 381. fig. C.  
 tab. 382. fig. A.

*Hesperus.* 2. B. alis patentibus falcatis luteo variis: macula fenestra ta, posticis rotundatis.

*Aurotus.* 3. B. alis patentibus falcatis concoloribus flauescensibus: fascia albida lunulaque disci fenestrata.  
 Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Statura et fere magnitudo praecedentis. Alae omnes flauescentes basi striga vna alteraue albida, in medio lunula magna hyalina, quae postice lunula flava terminatur. Pone hunc fascia lata albida. Macula ocellaris nigra lunula alba in apice alae anticae.

*Cecropia.* 4. B. alis patentibus griseis: fascia fulua, anticis ocello subfenestrato ferrugineo.

*Paphia.* 5. B. alis patentibus falcatis concoloribus flavis: strigis rufis ocelloque fenestrato.

*Polyphe-* 6. B. alis patentibus falcatis griseo carneis: fascia atra  
*musp.* ocelloque fenestrato posticarum maiori.

*Cytherea.* 7. B. alis patentibus griseis: strigis cinereis ocelloque fe-  
 nestrato.

*Phalaena capensis* Cram. Pap. 26. tab. 302. fig. A. B. }  
*Larua brunnea punctis numerosis flauescensibus.*

*Mylitta.* 8. B. alis patentibus falcatis flavis: striga ferruginea ocel-  
 loque fenestrato diuiso.

*Prome-* 9. B. alis patulis subfalcatis margine griseis: anticis vtrin-  
*thea.* que ocello atro.

*Erihri-* 10. B. alis patulis fuscescentibus: striga vndata pallida.  
*nae.*

11. B. alis patulis: anticis variegatis subtus ocello atro, *Ianus*.  
posticis sanguineis: ocello atro.
12. B. alis patentibus: anticis coeruleis albo maculatis, *Megaera*.  
posticis medio albis apice coeruleis flavo vndatis.  
Habitat in America boreali Dr. Grandidier.
13. B. alis patulis subfalcatis fuscis margine pallidioribus: *Hippoda-*  
*mia*. striga alba anticarum interrupta.
14. B. alis patentibus fusco incarnatis, posticis ocello ferrugineo: pupilla fenestrata. *nigritans*.
15. B. alis patentibus caudatis versicoloribus: puncto fe- *Semira-*  
nestrato, caudis longissimis. *mis*.
16. B. alis patulis caudatis cinereis fusco variis, anticis *Boreas*.  
punctis duobus, posticis unico fenestratis.
17. B. alis patentibus caudatis concoloribus virescenti- *Luna*.  
bus: ocello disci lunato.
18. B. alis patulis caudatis subfuscis: striga alba, posticis *Epime-*  
ocelло disci fuluo. *thea*.
19. B. alis patentibus caudatis pallide ferrugineis: punctis *Argus*.  
ocellaribus fenestratis numerosis, caudis longissimis.  
*Phalaena Brachyura* Cram. Inf. 3. tab. 29. fig. I.  
Habitat in Sierra Leon.
20. B. alis patentibus concoloribus flauis: anticis fene- *fenestra*.  
stra duplice, posticis simplici.
21. B. alis patentibus flavescentibus fusco irroratis: ocello centrali *Penelope*.  
fenestrato.
22. B. alis patentibus griseis: strigis albis ocello centrali *Tyrrhea*.  
atro: pupilla fenestrata.
23. B. alis patentibus fuscis: anticis fascia fenestrata ab- *perspicua*.  
breuiata.
24. B. alis patentibus flauis: atomis maculis strigaque po- *Armida*.  
stica violaceis.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Magra, nostra faemina crassa antennis flauis vix pecti-  
natis. Caput flavum, immaculatum. Thorax fla-  
uus macula dorsali violacea. Abdomen flauum pri-  
mis segmentis, macula dorsali violacea. Alae paten-  
tes flavae atomis sparsis violaceis. Practerea anticae  
maculis tribus: duabus approximatis ad marginem  
exte-

exteriorem et vnica solitaria ad marginem tenuior-  
rem bascos strigaque baseos violaceis. Posticæ ma-  
cula media strigisque duabus abbreviatis anteriore  
vndata. Subtus flauæ macula media violacea. Pe-  
des violacei.

*militaris.* 25. B. alis patulis concoloribus luteis apice maculisque  
violaceis: anticis extus albo maculatis.

*Castalia.* 26. B. alis patentibus rotundatis medio albis: anticis ocel-  
lo, posticis puncto fusco.

*pauonia.* 27. B. B. alis patentibus rotundatis griseo nebulosis sub-  
fasciatæ: ocello nictitante subfenestrato.

*minor.* a. Wien. Verz. 49. 3.

*media.* b. Wien. Verz. 49. 2.

Esp. Phal. 3. tab. 3.

singularis ob faeminam maremque simillimus.

*maior.* c. Wien. Verz. 49. 1.

*Achelous.* 28. B. alis patulis ferrugineis: omnibus fascia anticisque  
puncto albis.

*argulata.* 29. B. alis patulis erofo dentatis: posticis truncatis obtu-  
fissimis.

*Liberia.* 30. B. alis patulis, anticis variis, posticis fuluis: ocello  
atro. Sp. Inf. App. 505.

*Tau.* 31. B. alis patulis testaceis: ocello subuiolaceo; pupilla  
hastata alba.

*Bombyx Tau* Wien. Verz. 49. 8.

*Io.* 33. B. alis patulis flavis, anticis subtus, posticis supra  
ocello atro: pupilla alba.

*Abas.* 33. B. alis patulis fuscis: posticis cinereis; ocello rufo.  
*Phalaena Abasia* Cram. Pap. 29. tab. 344. fig. A. B. C.

*Salmonea* 34. B. alis patulis: anticis fuscis striga atra, posticis ru-  
fis ocello nigro: lunula alba.

*Proser-  
pina.* 35. B. alis patulis rotundatis nigris: fascia alba; macula  
subocellari nigra.

\*\* *Alis reuersis.*

*populifo-  
lia.* 36. B. alis reuersis testaceis dentatis: lunulis numerosis  
fuscis.

*Bombyx populifolia* Wien. Verz. 310. 5.

Habitat in Populo alba Austriae Dom. Schieffermyller.  
 Maior B. quercifolia. Os nigrum. Thorax testaceus  
 linea dorsali nigra. Alae omnes testaceae lunulis nu-  
 merosis distinctis fuscis. Posticae semitectae apice  
 pallidiores.

37. B. alis reuersis dentatis ferrugineis: strigis vndatis *quercifo-*  
*lia*, fuscis, ore tibiisque nigris.

Wien. Verz. 56. 1.

38. B. alis reuersis semitectis serratis griseis: margine po- *ilicifolia*.  
 stico albo punctato.

Wien. Verz. 56. 2.

Naturf. 15. tab. 3. fig. 5 - 14.

*Larua* cinerea: maculis duabus collaribus fuluis,  
*Puppa* folliculata brunnea.

39. B. alis reuersis subdentatis fuscis immaculatis, abdo- *Promula*,  
 mine brunneo.

40. B. alis subreversis ferrugineis: strigis obscurioribus, *Cassan-*  
 thorace antice brunneo. *dra.*

Habitat — — — — Mus. Dr. Hunter.

Media. Caput testaceum antennis vix pectinatis palli-  
 dis Thorax obscure brunneus postice cinereus.

Abdomen cinereum, immaculatum. Alae anticae  
 dentatae, ferrugineae strigis tribus distinctis aliquot-  
 que obsoletioribus, obscuris, subtus pallidiores im-  
 maculatae. Posticae cinereae, immaculatae.

41. B. B. alis reuersis heluolis: anticis strigis duabus *re-capensis*,  
 pandis, posteriore nigra inducta.

42. B. alis reuersis fuscis apice cinereis. *Aluco.*

43. B. alis reuersis heluolis: posticis basi subtus ferru- *Australa-*  
 gineis. *sia.*

44. B. alis reuersis brunneis: strigis quatuor pallidis. *quadri-*  
 Habitat in India orientali Dom. Lund. *cincta.*

Magna. Corpus hirtum, brunneum. Alae brunneae  
 strigis quatuor pallidioribus. Posticae brunneae im-  
 maculatae. Antennae pectinatae.

45. B. alis reuersis rufo cinereis: fasciis duabus linearis- *Fagi*,  
 bus luteis flexuosis.

Wien. Verz. 63. 2.

*Trifolii.* 46. B. alis reuersis ferrugineis: anticis striga punctoque albis, posticis immaculatis.

*Papilio Trifolii* Wien. Verz. 57. 4.

Roel. Ins. 1. Pap. 2. tab. 35. a. fig. 4. 5. Imago.  
tab. 35. b. fig. 1. Larua.

X Esp. Pap. 3. tab. 15.

Habitat in Germania Trifolio Mus. Dom. Romani.

Affinis B. Quercus. Differt tamen alis utriusque sexus brunneis. Posticae immaculatae.

*Larua* solitaria pilosa dilate fusca: incisuris coerule-scenti punctatis, collari rubro.

*Puppa* folliculata antice flava, postice brunnea.

*Quercus.* 47. B. alis reuersis ferrugineis: striga flava, anticis puncto albo.

Wien. Verz. 56. 3.

Roel. Ins. 1. Phal. 2. tab. 35. a. fig. 1. Larua.  
tab. 35. b. fig. 4. 5. 6. Imago.

*stigma.* 48. B. alis reuersis testaceis fusco irroratis punctoque centrali niveo.

*fusca.* 49. B. alis reuersis ferrugineis anticis macula media atra: lunula nivea.

Habitat in Coromandel Dom. Vahl.

Statura omnino praecedentium. Corpus hirtum, ferrugineum. Antennae breves valde pectinatae. Thorax striga media obscuriore. Alae anticae ferrugineae macula magna media veniformi atra et in hac lunula nivea. Versus marginem posticum striga punctorum fuscorum. Posticae uti omnes subtus ferrugineae, immaculatae.

*Pruni.* 50. B. alis reuersis dentatis flavis: strigis duabus fusco punctoque albo.

Wien. Verz. 56. 3.

*Amphi-mone.* 51. B. alis subreuersis integris cinerascentibus: strigis duabus nigris, anticis punto medio fulvo.

*potatoria* 52. B. alis reuersis subdentatis flavis: striga fulua repanda; punctis duobus albis.

Wien. Verz. 56. 1.

*ocularia.* 53. B. alis subreuersis albis: punctis ocellaribus nigris numerosis.

54. B. alis subreuersis concoloribus luteis: anticis strigis *Hibisci*.  
duabus, posticis vnicis.
55. B. alis reuersis luteis: strigis duabus annulisque tri- *Cynera*.  
bus anticarum connatis fuscis.
56. B. alis reuersis griseis: fascia ferruginea punctataque *Pini*.  
triangulari albo.  
Wien. Verz. 56. 4.
57. B. alis reuersis fuscis: anticis punto fascia margine- *dumeti*.  
que postico luteis.  
*Larua* fusco-flavo punctata maculisque transuersis atris.
58. B. alis reuersis griseis: strigis nigro albis, thorace *versicolora*.  
antice albo.  
Wien. Verz. 49. 2.
59. B. alis reuersis ceruinis: strigis duabus albidis, sub- *Rubi*.  
tus nullis.  
Wien. Verz. 56. 2.
60. B. alis subreuersis fusco venosis striatisque, corpore *Vinula*:  
albo nigro punctato.  
Wien. Verz. 63. 3.
- ~~x~~ Esp. Bomb. 3. tab. 18. fig. mal.
- ~~x~~ *Bombyx erminea* Esp. Bomb. 3. tab. 19. fig. 1. 2. nullo  
modo differt.  
*Mas Russiae* alis fere totis hyalinis Dom. Boeber.
61. B. alis reuersis ferrugineis: striga alba, anticis pun- *lanefris*.  
to basique albis.  
Wien. Verz. 57. 2.
62. B. fusca antice pallida, alis reuersis fuscresentibus: *Populi*.  
striga sesquialtera repanda albida.  
Wien. Verz. 58. 9.
63. B. alis reuersis ferrugineis vnicoloribus: punto albo. *Catax*.  
*Bombyx rimicola* Wien. Verz. 57. 1.
- ~~x~~ Esp. Phal. tab. 16. fig. 1-3.
64. B. alis reuersis luteis (brunneis faem.) punto albo *Eueria*.  
apice pallidioribus.  
*Bombyx Eueria* Knoch. Ins. 1. tab. 2.  
*Bombyx Catax* Wien. Verz. 57. 3.
- ~~x~~ *Phalaena lentipes* Esp. Bomb. 3. tab. 16. 6-9.  
Habitat in *Pruno spinosa* Germaniae Mus. Dom. Romanii.

Omnino distincta. Mas flavescentia, femina brunnea puncto medio niueo.

*Oua* aggregata hirsutie matris testa disco impresso.

*Larva* gregaria, pilosa, brunnea: incisuris nigris maculisque lateralibus coeruleis sulphureo punctatis.

*Pupa* folliculata, flavescentia.

*processio-* 65. B. alis reuersis cithereo fuscis: femina striga obscuriora, inare tribus.

*Bombyx processionea* Wien. Verz. 58. 10.

*pithyo-* 66. B. alis reuersis griseis: strigis tribus obscurioribus, posticis pallidis, puncto anali fusco.

*Bombyx pithyocampæ* Wien. Verz. 58. 11.

Habitat in Austriae Pino Mus. Dom. Schieffernmyller.

Statura et magnitudo B. processioneae. Alae anticae griseae strigis tribus vndatis nigris tantibus. Posticae albae macula anguli ani fusca. Corpus hirtum griseum ab domine flavescente.

*Larva* pilosa coeruleescens: maculis dorsalibus flavis, capite atro.

*rurea.* 67. B. alis reuersis fuscis: strigis vndatis pallidioribus. Habitat in Austria.

Corptis fusco, immaculatum. Alae anticae obscure fuscæ strigis vix distinctis repandis pallidioribus. Posticae ut omnes subtus fuscae, immaculatae.

*Mori.* 68. B. alis reuersis pallidis: strigis tribus obsoletis fuscis.

*tricolora.* 69. B. alis subreuersis coccinea, thorace niueo coccineo punctata, alis anticis niueis: striga punctorum nigrorum.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo B. neustriæ. Caput coccineum antennis pectinatis nigris. Thorax niueus punctis sex coccineis in orbem positis. Abdomen coccineum. Alae anticae niueæ costa coccinea strigaque media punctorum nigrorum, posticae ut omnes subtus coccineæ.

*neustria.* 70. B. alis reuersis griseis: striga duabus ferrugineis, subtus vñica.

Wien. Verz. 57. 4.

Schaeff. Icon. tab. 209. fig. 1. 2.

71. B. alis reuersis obscuris: fasciis duabus pallidis. *castrensis.*  
Wien. Verz. 57. 5.

72. B. alis reuersis hyalino albidis: striga pallida, limbo *franconica.*  
nigro.

*Bombyx franconica* Wien. Verz. 57. 6.

Habitat in Tritico repente Dom. Schieffermyller.

Minor B. neustria. Antennae fuscae. Caput et thorax hirta flavescentia. Abdomen fuscum. Alae omnes albo hyalinae limbo neruisque fuscis. Striga albida in medio.

*Faemina* maior tota brunnea, immaculata lunula sola media alae antica parum obscuriore.

73. B. alis subreuersis pallidis vnicoloribus: anticis puncto medio fuscō, corpore fuluo. *Taraxaci*

*Bombyx Taraxaci* Wien. Verz. 57. 7.

Habitat in Austriae Taraxaco Dom. Schieffermyller. Maior. Corpus hirtum, fuluum abdominis dorso nigrante. Alae omnes pallidae, anticis puncto parvo fuscō. Pedes apice atri.

*Larua pilosa* atra fasciis abbreviatis flavescentibus.

74. B. alis subreuersis cinereis: anticis punctis quatuor *cinerrea.*  
atris subocellaribus.

Habitat in Austria Dr. Schulz.

Media. Antennae pectinatae atrae. Thorax hirtus, cinereus. Abdomen fuscum. Alae cinereae supra punctis quatuor nigris annulo albo cinctis. Posticae vti omnes subtus immaculatae.

75. B. alis reuersis cinereis: fascia sinuata obscuriore; *Mali.*  
puncto atro.

Habitat in Malo et Corylo Hafniae Dom. de Loewenskioldt.

Statura omnino B. castrensis. Antennae valde pectinatae. Caput et thorax hirta, cinerea. Alae anticae cinereae fascia media lata obscuriore, quae antice posticeque striga sinuata nigra terminatur. In medio fasciae punctum atrum. Striga obsoleta fusca ad marginem posticum. Posticae vti omnes subtus obscuriores striga media fusca.

*Larua solitaria*, pilosa, brunnea linea dorsali pallidior, stigmatibus coeruleoscentibus.

- Auella-nae.* 76. B. alis reuersis obscure cinereis: fascia sinuata obscuriore immaculata.  
Reaum. Inf. 1. tab. 44. fig. 7-10.  
Habitat in Malo et Corylo Hafniae Dom. de Loewen-skiołd.  
Statura omnino praecedentis. Caput et thorax pilosa, obscure cinerea, immaculata. Alae obscure cinereae fascia lata media sinuata obscuriore. Antennae parum pectinatae.
- Hieracii.* 77. B. alis subreuersis atro fuliginosis.  
*Tinea graminella* Wien. Verz. 133. I.  
*Larva* intra folliculum e foliis straminibusque.
- \*\*\* *Alis deflexis.*
- lagopus.* 78. B. alis deflexis flavecentibus: atomis strigisque duabus fuscis, pedibus anticis porrectis hirsutissimis.
- imperialis.* 79. B. alis flavis fuscō maculatis, omnibus macula subocellari ferruginea.
- crassicornis.* 80. B. alis deflexis cinereis: atomis strigisque vndatis fuscis.
- Hyphinoe* 81. B. alis deflexis coeruleis: anticis flavo maculatis.
- Cyane.* 82. B. alis deflexis atris hyalino maculatis, posticis lunulis fuluis. Sp. Inf. App. 506.
- Cossus.* 83. B. alis deflexis nebulosis, thorace postice fascia atra, antennis lamellatis.  
Wien. Verz. 60. I.
- terebra.* 84. B. alis deflexis dorso dentatis cinereis: atomis strigisque vndatis fuscō ferrugineis, thorace postice striga albida.  
*Bombyx terebra* Wien. Verz. 60. 2.  
Habitat in Germaniae ligno. Dom. Schieffermyller.  
Statura B. Cossus at paullo minor. Antennae vix pectinatae albidae. Thorax hirtus fuscus striga postica albida. Alae anticae in medio dorsi angulatae, cinereae strigis vndatis atomisque fuscis. Alae posticae vti omnes subtus albidae. Abdomen albidum ano fuscō.
- Aesculi.* 85. B. niuea, alis punctis numerosis coeruleo nigris, thorace senis.

*Hepia-*

*Hepialus Aesculi* Sp. Inf. 2. 208. 5.

Habitat in Pyri, Aesculi ligno.

86. B. alis deflexis, maculis griseo fuscoque nebulosis, *dispar*.  
femineis albido: lituris nigris.

Wien. Verz. 52. 6.

87. B. alis deflexis albido: strigis nigris, posticis flauis *Amasis*.  
nigro maculatis, abdomine atro: cingulis rubris.

88. B. alis deflexis cinereis; strigis tribus vndatis fuscis. *pudibunda*.  
Wien. Verz. 55. 1.

89. B. alis deflexis cinereis: atomis nigris strigisque dua- *fascelina*.  
bus fuluis repandis,

Wien. Verz. 55. 3.

90. B. alis deflexis cinereis, strigis duabus ferrugineis *bucephala*  
maculaque terminali flaua,

Wien. Verz. 59. 1.

91. B. alis deflexis nebulosis posticis brunneis, abdomine *Helops*  
brunneo albo annulato.

92. B. alis deflexis viridibus fuso subundatis: maculis *oleagina*.  
duabus albis, anteriore pupillata, posteriore maiore,  
*Bombyx oleagina* Wien. Verz. 59. 2.

Habitat in Pruno spinosa Germaniae Dom. Rominio.

Antennae pectinatae, ferruginea vachi alba. Maculae  
duae distinctae alae anticae, antica pupilla ferruginea,  
postica maiori. Posticae albidae margini fuso,

*Larua* postice quadridentata, cinerea nigro rubroque  
punctata, collari sanguineo: punctis nigris.

93. B. alis deflexis griseis: stigmatibus albis coadanatis. *caeruleo-*  
Wien. Verz. 59. 3. *cephala*,

Antennae thorax et alae antice ferruginea.

94. B. alis deflexis dorso dentatis griseis: maculis duabus *argen-*  
argenteis; anteriori cordata. *tina*.

Alae dorso dente erecto, valido. Anticae maculis dua-  
bus, in medio punctis tribus ante maculas argenteis.

95. B. alis deflexis: anticis rubro flavo nigroque varie- *decora*.  
gatis, posticis rubris; margine nigro.

Cram. Inf. 19. tab. 219. fig. F, G.

96. B. alis deflexis supra viridibus: fascia sinuato dentata *Celsia*.  
glauca. Linn. Syst. Nat. 2. 143. 8. In Sv. 1141. tab. 2.  
fig. 1141.

Habitat in Sveciae Humulo.

Margo posticus alae anticae uti posticae totae fusca.

*Dione.* 97. B. alis deflexis albis nigro striatis punctatisque, subtus margine purpureo.

*Ziczac.* 98. B. alis deflexis dorso dentatis apicibusque macula grisea ocellari, antennis squamatis.

Wien. Verz. 62. 5.

*Tritophus* 99. B. alis deflexis dorso dentatis fusco nebulosis; lunula media ferruginea albo cincta.

*Bombyx Tritophus* Wien. Verz. 63. 6.

Habitat in Austriae Populo tremula Dom. Schieffermyller.

Statura omnino B. Ziczac. Caput et thorax hirta, fusca.

Abdomen cinereum. Alae anticae fusco nebulosae strigis aliquot obsoletis, vndatis, obscurioribus. In medio lunula alba pupilla lunata ferruginea. Posticae albae litura anali fusca.

*Larua solitaria* nuda viridis gibberibus dorsalibus tribus caudalique obtusa, capite fusco.

*elegans.* 100. B. alis deflexis glaucis: strigis duabus maculaque media nigris; lunula sanguinea.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Media. Caput fuscum punctis palpisque flavis. Antennae nigrae vix pectinatae. Thorax villosus, cinereus maculis dorsalibus quatuor flavis. Alae glaucae punctis duobus baseos strigisque duabus vndatis in medio nigris. Inter strigas color obscurior macula nigra lunula sanguinea. Alae posticae uti omnes subtus obscurae.

*diftaea.* 101. B. alis deflexis exustis: plaga albida, posticis albis.

*Bombyx difftaea* Wien. Verz. 62. 1.

*Larua glabra* postice gibba viridis: linea dorsali alba, laterali flava, pedibus anticis rufis.

*Drome-* 102. B. alis deflexis anticis nebulosis dorso dentatis: litura baseos anique flavescentibus.

Wien. Verz. 63. 7.

Ammir. Inf. tab. 14.

*Larua solitaria* nuda, viridis gibberibus quatuor dorsalibus caudalique reflexa.

103. B. alis deflexis glaucis, fascia ferruginea; puncto nigro albo annulato, thorace variegato. *Coryli.*

Wien. Verz. 55. 4.

104. B. alis deflexis obscure cinereis: fascia media lata flauomangulata nigra; macula marginali flava. *cula.*

Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.

Media. Caput et thorax hirta nigra. Alae obscure cinereae nitidulae fascia in medio lata atra, quae postice ad marginem exteriorem angulum format et in hoc angulo macula magna flava. Margo posticus fuscus punctis aliquot atris. Posticae subtus cinereae puncto strigaque postica fuscis. Pedes nigri flavo annulati. Anus flavus.

105. B. alis deflexis: anticeis nudis aqueis, posticis cinereis: macula marginali nuda.

Habitat in Amarantho spinosa Indiae Mus. Dom. Banks.

Media. Antennae pectinatae fuscae. Caput testaceum. Thorax et abdomen cinerea. Alae anticae nudae, aquae basi parum cinereae, posticae cinereae macula magna marginali nuda, aquae.

106. B. alis deflexis hyalino nigris, abdomine villoso *Morio.* atro; segmentis margine flavis.

*Phalaena Morio* elinguis alijs nigris atro striatis abdominis incisuris flavescentibus. Linn. Syst. Nat. 2, 828, 66.

*Bombyx Morio* Wien. Verz. 50. 1.

Habitat in Europae Lolio perenni Dom. Schieffermyller. Statura et magnitudo B. atrae. Antennae valde pectinatae, nigrae vachi albida. Alae fere nudae nigro hyalinae margine obscuriore. Abdomen villosum, atrum annulis quatuor flavis.

*Faemina* alijs breuibus hyalino cinereis, abdome albo.

*Larua* atra lineis sex verrucarum ferruginearum pilosarum.

*Pupa* subfolliculata atra pallido maculata.

107. B. alis reflexis hyalino pallide rufescens: puncto *Rubea.* medio pallido.

*Bombyx Rubea* Wien. Verz. 51. 2.

Habitat in Quercu Dom. Schieffermyller.

Praecedente maior. Alae omnes pallide rufescentes se re hyalinae puncto medio pallido. Antennae pectinatae.

- Alphaea*. 108. B. alis deflexis ferrugineis: puncto medio albo striataque punctata fusca.
- monacha*. 109. B. alis deflexis albis atro vndatis, abdominis incisuris sanguineis.  
Wien. Verz. 52. 5.
- flava*. 110. B. alis deflexis flauissimis apice punctis tribus nigris.
- lutea*. 111. B. alis deflexis flauissimis immaculatis.
- curtula*. 112. B. alis deflexis glaucis: strigis albis maculaque apice testacea immaculata.  
Wien. Verz. 55. 2.  
*Larua pilosa solitaria*, cinerea: striis quatuor punctorum ferrugineorum.
- reclusa*. 113. B. alis deflexis griseis; strigis albidis subanastomosantibus, macula apicis ferruginea: puncto marginali albo.  
*Bombyx reclusa* Wien. Verz. 56. 4.  
Roel. Ins. 4. tab. II. fig. 1 - 6.  
Habitat in Germaniae Salice Dom. Schieffermyller.  
Nimis affinis B. curtulae paullo minor. Strigae alarum albae magis interruptae, magis anastomosantes. Macula ferruginea apicis minor puncto tantum marginali albo et puncta atra anguli ani alae anticae omnino desunt.
- Larua fusca*: linea dorsali cinerea maculis duabus nigris.  
*Puppa folliculata*, brunnea.
- anacho-*  
*reta*. 114. B. alis deflexis griseis: strigis albidis, macula apicis fusco ferruginea: striga vndata alba.  
*Bombyx anachoreta* Wien. Verz. 56. 3.  
Roel. Ins. 3. tab. 43.  
Habitat in Salice, Populo Dom. Schieffermyller.  
Affinis praecedentibus. Alae griseae strigis quatuor albidis, quarum ultima maculam apicis vndata transit. Ad angulum ani alae anticae puncta duo atra altera maiore.
- Larua pilosa fusca*: stria dorsali incarnata, verrucis duabus eleuatis punctisque lateralibus rufis.  
*Puppa folliculata* brunnea.
- anasto-*  
*mosis*. 115. B. alis deflexis griseis: strigis tribus albidis subanastomosantibus, thorace ferruginato.  
Wien. Verz. 55. 1.

116. B. alis deflexis flavis s. ferrugineis: strigis duabus *testudo*.  
obliquis obscurioribus.

*Bombyx sulphurea* Sp. Inf. 2. 189. 86.

*Bombyx testudo* Wien. Verz. 65. 1.

Strigae ad marginem exteriorem coeunt.

*Larua apoda* ouata nuda viridis: lineis duabus dorsa-  
libus albidis.

*Puppa* folliculata, brunnea.

117. B. alis deflexis fuscescensibus immaculatis.

*afella*.

*Bombyx afella* Wien. Verz. 65. 2.

Habitat in Austriae Populo Dom. Schieffermüller.

Statura omnino praecedentis at triplo minor, tota fusca,  
immaculata, nitidula.

*Larua apoda*, ouata, rubra: linea dorsali flava nigro  
punctata, lateribus viridibus.

*Puppa* folliculata, brunnea.

118. B. alis deflexis flavescentibus: fascia lata fusca, ma- *bufo*.  
culis flavis.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Statura omnino praecedentium. Antennae flavescentes.  
Corpus flavescentes. Alae anticae flavescentes  
fascia lata fusca, quae ad marginem posticum adhuc  
magis extenditur. In hac fascia maculae duae, al-  
tera in medio, altera ante angulum ani. Posticae  
fuscæ angulo ani flavescente. Subtus anticae fuscae,  
posticae flavescentes.

119. B. alis deflexis fuscis: maculis tribus viridibus. *cippus*.

120. B. alis deflexis dentatis albidis nigro venosis, pal- *palpina*.  
pis porrectis pennaceis.

Wien. Verz. 62. 2.

121. B. alis deflexis dorso videntatis griseis: punto me- *trepida*.  
dio ocellari strigaque postica maculari fuscis.

*Bombyx tremula* Wien. 49. 4.

Habitat in Austriae Quercu Dom. Schieffermüller.

Magna. Antennae pectinatae, ferrugineae. Thorax  
fuscus. Abdomen cinereum. Alae anticae obscure  
griseae, in medio puncto oblongo fusco annulo albo  
cincto et postice striga e punctis sex fuscis. Dens  
validus, erectus niger in medio marginis interio-  
ris. Posticae albae margine interiori griseo.

*Larua solitaria nuda, viridis, lineis duabus dorsalibus albis, lateralibusque obliquis flavo rufis.*  
*Puppa folliculata dimidia sub terra.*

*querna.* 121. B. alis deflexis griseis: strigis tribus atris albae innatis.

*Bombyx querna* Wien. Verz. 49. 5.

Habitat in Austriae Quercu Dom. Schieffermyller.

Media. Antennae pectinatae, ferrugineae. Corpus hirtum, griseum. Alae anticae griseae strigis tribus vndatis albo marginatis nigris, quarum baseos minima. Ante strigam posticam litura albida. Posticae albidae.

*Larua postice gibba nuda viridis lineis quatuor flavis spiraculisque atris.*

*Gnoma.* 122. B. alis deflexis subdentatis cinereo albis: vitta marginali atra; macula alba.

*capuzina* 123. B. alis deflexis denticulatis ferrugineis denticuloque dorsaliter reflexo.

Wien. Verz. 63. 4.

*camelina.* 124. B. alis deflexis denticulatis brunneis: omnibus denticulo dorsaliter.

Wien. Verz. 63. 3.

*aulica.* 125. B. alis deflexis anticus griseis flavo punctatis, posticus fuluis nigro maculatis,

Wien. Verz. 53. 6.

*Larua solitaria nigra:* verrucis albis, subtus ferrugineo, supra albo pilosa.

*heluola.* 126. B. alis deflexis heluolis: maculis ordinariis strigaque postica cinereis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Media. Antennae pectinatae. Caput thorax heluola. Abdomen cinereum ano barbato heluolo: Alae anticae heluolae maculis ordinariis strigaque postica fere obsoleta cinereis. Ante strigam puncta aliquot cinerea. Posticae cinereae.

*vndata.* 127. B. alis deflexis cinereis: fasciis duabus fuscis cinereo vndatis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Corpus medium, cinereum. Alae anticae cinereae fascia ante medium alteraque pone medium fuscis et in

in his fasciis strigae aliquot cinereae. Ad basin et ad marginem posticum puncta aliquot fusca. Posticæ cinereæ.

128. B. alis deflexis flavescentibus: punctis nigris, abdome quinquefariam nigro punctato. *lubricipeda*.

*Bombyx lubricipeda* Wien. Verz. 54. 1.

129. B. alis deflexis nigro punctata, femoribus anticis mendica. luteis.

*Phalaena mendica* elinguis cinerea tota, femoribus luteis Linn. Syst. Nat. 2. 822. 47. mas.

Wien. Verz. 54. 3. mas.

- ♂. *Phalaena Menthastri* Wien. Verz. 54. 2. Faem.

Knoch. Beytr. 3. tab. 2. fig. 5 - 15.

Habitat in Austriae Tanaceto Balsamita Dom. Schieffermyller.

Mas cinereo fuscus, faemina albida punctis aliquot nigris. Femora antica barba lutea. Abdomen concolor.

*Larua pilosa* virescens punctis nigris verticillatis, capite flavescente.

*Puppa folliculata*, brunnea.

130. B. alis deflexis fuscis: punctis dorsalibus albis, posticis nigris; macula media fulua, puncto nigro. *aduena*.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Magnitudo et statura praecedentis. Antennæ pectinatae nigrae vachi alba. Thorax, abdomen hirta, cinerea. Alae anticae fuscae lineola baseos punctisque tribus costalibus subocellatis albis. Posticæ nigrae macula magna oblonga fulua puncto nigro. Lineola interrupta marginis tenuioris fulua.

131. B. alis deflexis pallide flaviis: margine postico ferrugineo. *rutila*.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

*Parua*. Antennæ pectinatae, fuscescentes. Corpus pallidum. Alae omnes concolores, flavescentes margine postico tenuissime ferrugineo.

132. B. alis deflexis atris: angulo ani flavo, abdomine supra flavo: linea dorsali punctata nigra. *luctifera*.

*Bombyx lucifera* Wien. Verz. 54. 4.

Habitat in Plantagine lanceolata Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Caput et thorax atra. Abdomen subitus atrum, supra flauum linea-punctorum nigrorum. Alae omnes atrae angulo ani flavo.

*leporina.* 133. B. alis deflexis albis: punctis nigris ramosis, abdome immaculato.

*Bombyx leporina* Wien. Verz. 67. 8.

*Larua* albo pilosissima.

*lota.* 134. B. alis deflexis cinereis: punto disci atro posticeque striga purpurascente fracta.

*Bombyx lota* Wien. Verz. 76. 6.

*laeta.* 135. B. alis deflexis, anticis niueis: fascia lata nigra, antennis filiformibus.

*communi macula.* 136. B. alis deflexis pallide carneis: macula magna dorsali fusca.

*Bombyx communi macula* Wien. Verz. 85. 7.

Habitat in Europa australiori Dom. Romanus.

Parua. Corpus albidum. Alae pallide carneae macula magna, oblonga marginis tenuioris fusca. Posticae omnino albidae.

*compressa* 137. B. alis compresso adscendentibus niueis: macula communi fusca, centrali grisea; lunula alba.

*Phalaena spinula* Wien. Verz. 64. 6.

Habitat in Pruno spinosa.

*Larua* fusca: antice spinis quatuor, postice duobus, acuminata.

*Puppa* antice brunnea, postice coerulea.

*Milhaueri* 138. B. alis deflexis canis: maculis duabus dorsalibus fusciis, antennis apice setaceis.

*Bombyx Milhaueri* Esp. pap. 3. tab. 21.

*Bombyx terrifica* Wien. Verz. 63. 1.

*spreta:* 139. B. alis deflexis carneo luteoque variis: stigmatibus albis.

*Phalaena spreta* Naturf. 21. 27. tab. 3.

*Phalaena piniperda spirilinguis cristata;* alis deflexis: superioribus rubicundo luteo variis, macula transversali albidiōri dolabrigem; inferioribus griseis pallidius fimbriatis Panz. Monogr. 51. tab. 1. fig. 1-12. optim.

Habitat in Pinō sylvestri Germaniae sylvas totas depa-scens, defrueens.

Media.

**Media.** Antennae simplices vti totum corpus fuscae, immaculatae. Alae anticae carneo luteoque variae striga una alteraue alba. Maculae ordinariae albae, anteriore orbiculata, posteriore veniformis. Postice fuscae. Subtus cinereae striga obscuriore.

*Larua nuda* viridis linea dorsali alba, lateralique ferruginea.

*Puppa nuda*, ferruginea.

140. B. alis deflexis atris, anticis apice, posticis basi *Lincus*. fuluis.

141. B. alis deflexis anticis griseis apice albo nigroque *strigula*. striatis.

*Noctua Vlmi* Wien. Verz. 66. 1.

Habitat in Germaniae Vlmo.

Antennae muris apice setaceae vti in B. Milhauseri.

*Larua virescens* bicaudata: lineis pallidioribus, capite fuso.

*Puppa nuda* brunnea.

142. B. alis deflexis albis: costa atra.

*Begga*.

*Phalaena Begga* Cram. Ins. 30. tab. 345. fig. E.

Habitat Surinami.

Corpus album. Antennae flavae. Pedes flavi apice nigri.

143. B. alis deflexis albis V nigro notatis.

*Vnigrum*

*Bambyx niuosa* Wien. Verz. 52. 1.

144. E. alis deflexis niveis, ano barbato ferrugineo.

*chrysor-*

Wien. Verz. 52. 3.

*rhoa*.

Aliam minorem alis subtus fuscouscentibus ex India orientali vidimus, vix tamen distincta.

145. B. alis deflexis albis: anticis subtus costa fusca, ano *auriflua*. barbato luteo.

*Bombyx auriflua* Wien. Verz. 52. 4.

Roel. Ins. 1. Phal. 2. tab. 21.

Habitat in Germaniae Pyro, Pomona Dom. Schieffermller.

Summa affinitas B. chrysorrhoeae differt tantum costa alae anticae subtus nigra. Puncta interdum nigra sparsa in pagina superiori alarum.

*Larua pilosa*, nigra rubro lineata punctisque lateribus albis, verruca collari caudalique.

*bicolora.* 146. B. alis deflexis albis: macula magna lutea nigro notata.

*Phalaena bicolora* Wien. Verz. 52. 4.

Naturf. 12. tab. 2. fig. 9. 10.

Habitat in Saxonia Mus. Dom. Romani.

Affinis B. chrysorrhoeae. Corpus album, immaculatum.

Antennae vachi alba pilis luteis. Alae omnes albae anticis in medio ad marginem tenuiorem macula magna lutea punctis aliquot nigris. Praeterea pone maculam in primis in faemina puncta aliquot nigra.

*Salicis.* 147. B. alis deflexis albis, pedibus nigris albo annulatis.

*Bombyx salicis* Wien. Verz. 52. 2.

*Cassinia.* 148. B. alis deflexis griseis: lineolis abbreviatis nigris sparsis.

*Bombyx Cassinia* Wien. Verz. 61. 1.

Habitat in Austriae Tilia Dom. Schieffermyller.

Magna. Thorax cinereus linea dorsali laterali queatra.

Alae anticae griseae lineis aliquot atris. Versus marginem posticum striga fere obsoleta angulata, pallida. Alae posticae pallidae. Subtus albidae macula centrali fusca.

*Centrali-nea.* 149. B. alis deflexis cinerea fuscoque nebulosis: lineola centrali alba atrae innata.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna statura B. Cassiniae. Antennae ferrugineae. Corpus hirtum. Thorax griseus, Abdomen fuscum. Alae cinereo fuscoque nebulosae atroque parum undatae, in medio lineola abbreviata niuea atro vtrinque marginata, subtus griseae disco fuso. Posticae supra obscurae, subtus albidae macula centrali fusca.

*Crataegi.* 150. B. alis deflexis rotundatis cinereis: fascia obscuriore, ano barbato Wien. Verz. 58. 8.

*Eridanus* 151. B. alis deflexis niuea, abdomine fulvo annulato.

*tibialis.* 152. B. alis deflexis niueis, tibiis anticis flavescentibus nigro punctatis.

*nitidula.* 153. B. alis deflexis niueis: anticis maculis duabus costalibus fasciaque marginali glaucis nitidulis.

Habitat in Coromandel. Dom. Vahl.

Media. Corpus niuem, immaculatum. Antennae filiformes, simplices, flavescentes. Alae anticae niueae

ueae maculis duabus costalibus fuscis glaucis nitidulis, anteriore oblonga. Fascia lata marginalis eiusdem coloris, margo tamen ipse albus punctis coerulecentibus. Posticae concolores albae apice fuscae.

154. B. alis deflexis subferrugineis: striga flauescente, antennis maris pectinatis. *plumigera*.

*Bombyx plumigera* Wien. Verz. 61. 2.

Habitat in Acere campestri Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus hirtum, ferrugineum. Alae anticae mox ferrugineae, vnicolores, mox flavo mixtae striga pallidiore, posticae immaculatae. Abdomen flauescens. Antennae maris radiis longissimis.

*Larua solitaria* glabra viridis albo lineata.

155. B. alis deflexis albidis: costa palpisque ferrugineis. *obsoleta*.

156. B. alis deflexis, anticis cinereis, posticis niueis. *Corones*.

157. B. alis deflexis flauescentibus basi coeruleo maculatis *festiva*. apice nigro punctatis.

158. B. alis deflexis fuscis, abdomine fulvo: punctis annoque nigris. *Dryas*.

159. B. alis deflexis luteis; margine sanguineo lunulaque *russula*. fusca, antennis sanguineis.

*Bombyx russula* Wien. Verz. 54. 13.

160. B. alis incumbentibus fuscis: linea punctisque duobus rubris, posticis rubris nigro marginatis. *Iacobaea*.

161. B. alis deflexis luteis: anticis flavis nigro striatis, posticis fascia terminali nigra. *grammica*.

Wien. Verz. 54. 12.

162. B. alis deflexis anticis flavis fuscis punctatis, posticis rubris nigro maculatis. *purpurea*.

Wien. Verz. 53. 9.

163. B. alis deflexis atris: riuulis albis, posticis luteis: *Plantaginis*. margine maculisque nigris.

Wien. Verz. 53. 4.

Variat in Russia boreali frequens alis posticis albis maculis margineque nigris. *Phalaena hospita* Wien.

Verz. App.

164. B. alis deflexis atris: vittis tribus abbreviatis albis. *vittata*.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Statura B. Plantaginis. Antennae vix pectinatae nigrae. Caput nigrum puncto frontali albo. Thorax albus punctis duobus anticis lineolisque tribus latis atris. Alae anticae atrae, vittis tribus dimidiatis albis: duabus marginalibus. Margo posticus parum albicat. Posticae atrae macula baseos rubra. Subtus concolores.

*Jugubris.* 165. B. alis deflexis flavis; riulis punctisque atris, posticis fuscis.

*Noctua sulphurea* Wien. Verz. 93. 6.

Habitat in Convolvulo arvensi.

*Larua semigeometra nigra:* linea laterali flauescente.

*Vidua.* 166. B. alis deflexis fuscis: anticis cinereo subfasciatis, posticis macula baseos fasciaque rufis.

Wien. Verz. 91. 9.

Habitat in Populo alba.

*Larua nuda viridis rubro lineata.*

*Matronula.* 167. B. alis deflexis fuscis externis flavo maculatis, inferioribus flavis nigro fasciatis.

*Phalaena Matronula* Linn. Syst. Nat. 2. 835. 92.

Wien. Verz. 53. 5.

Roel. Ins. 3. tab. 39. fig. 1. 2.

Merian. Europ. 58.

Habitat in Artemisia vulgari.

Magna thorace nigro lineis duabus sanguineis. Abdomen sanguineum dorso nigro maculato.

*Faemina* maculis alae anticae maioribus, in primis posteriori transuersa.

*Villica.* 168. B. alis deflexis atris: maculis octo albis, posticis flavis nigro maculatis. Wien. Verz. 53. 7.

*Hebe.* 169. B. alis deflexis atris albo fasciatis: posticis sanguineis atro maculatis.

*Bombyx Hebe* Wien. Verz. 52. 2.

Variat alis albis nigro fasciatis.

*Tarquinius.* 170. B. alis deflexis cinereis: macula media atra; linea ramum exferente alba.

*Tarquinius.* 171. B. alis deflexis, anticis nigris: lineata humata inter strigas duas albas.

*Caja.* 172. B. alis deflexis fuscis: riulis albis, posticis purpureis nigro punctatis.

*Bombyx Caja* Wien. Verz. 52. 1.

Variat alis posticis rubris fuluisque, rarius alis fuscis immaculatis.

173. B. alis deflexis albis: anticis fuscis maculatis, posticis *pudica*.

*Bombyx pudica* Esp. Bomb. 3. tab. 33. fig. 1.

Habitat in Gallia australi Dom. Esper.

Statura et magnitudo B. maculosae. Caput et thorax fusca thorace lunulis duabus antice connatis albis. Alae omnes albae, antice maculis fere trigonis numerosis fuscis. Posticae immaculatae. Subtus subconcolores, posticis maculis duabus fuscis.

174. B. alis deflexis atris: fasciis duabus dentatis albis, *casta*. posticis rubris: maculis marginalibus fuscis.

*Bombyx casta* Esp. Bomb. 3. tab. 33. fig. 2.

Habitat in Germania Dom. Esper.

Statura et magnitudo, B. maculosae. Corpus nigrum. Thorax fascia antica pallida. Abdomen punctis baseros rubris. Alae anticae nigrae fasciis duabus unidentatis albis. Punctum paruum in medio costae et litura versus apicem.

175. B. alis deflexis nigro maculatis: anticis fuscis, posticis rubris.

*Phalaena maculosa* Wien. Verz. 59. 10.

*Phalaena maculosa* Knoch. Beytr. 3. tab. 5. fig. 2.

Habitat in Germaniae australioris Gallio Aparineo.

Mus. Dom. Zschuck.

Magnitudo B. plantaginis. Thorax cinereus lineis tribus atris. Alae anticae fuscae punctis plurimis atris sparsis. Posticae rubrae striga; lunula maculisque tribus marginalibus atris, interiore geminata. Abdomen atrum linea laterali sanguinea, quae tamen apicem haud attingit.

*Larua solitaria pilosa nigra verrucis coeruleis lineaque dorsali flava.*

176. B. alis deflexis atris: riuulis rubicundis, posticis rubris nigro punctatis.

*Virgo.*

177. B. alis deflexis nigris: maculis albis, posticis purpureis: macula centrali margineque nigris.

*Menete.*

178. B. alis deflexis albis nigro maculatis, posticis subtus deflorata, atris: fasciis albis.

\*\*\*\*\* *Alis incumbentibus.*

- Crotalariae.* 179. B. alis incumbentibus, anticis purpurascensibus; maculis ocellaribus atris, posticis rubris nigro maculatis.
- Ricini.* 180. B. alis incumbentibus obscuris: maculis numerosis subocellaribus fuscis, posticis rubris nigro macellatis.
- sanguino-* 181. B. alis incumbentibus niueis: anticis costa sanguinea, *lenta.* posticis maculis atris.  
*Phalaena lactinea* Cram. Ins. 12. tab. 133. fig. D.
- Hera.* 182. B. alis incumbentibus virescenti nigris: ciuulis flauis, posticis rubicundis: maculis tribus nigris.  
*Wien. Verz.* 53. 3.
- Dominula* 183. B. alis incumbentibus atris: maculis albo flavescentibus, posticis rubris nigro maculatis.  
*Wien. Verz.* 53. 8.  
*Larua solitaria.*
- credula.* 184. B. alis incumbentibus corporeque atris albo punctatis.
- leatrix.* 185. B. alis incumbentibus nigris: maculis coeruleis flauis albisque, posticis rubro alboque maculatis.
- furcula.* 186. B. thorace variegato, alis griseis basi apiceque albis nigro punctatis. *Wien. Verz.* 64. 4.
- colon.* 187. c. alis incumbentibus griseo fuscis: punctis duobus nigris distantibus.
- populeti.* 188. B. alis incumbentibus griseo nitidis: striga postica punctorum nigrorum.
- antiqua.* 189. alis incumbentibus, anticis ferrugineis: lunula alba anguli postici, faemina aptera.  
*Wien. Verz.* 55. 5.
- gono-* 190. B. alis incumbentibus fuscis: maculis duabus albis *stigma.* oppositis, femina aptera.  
*Wien. Verz.* 55. 6.
- parado-* 191. B. alis subincumbentibus fusco cinereoque variis: *xa.* macula centrali albida, posticis atris, femina aptera.  
*Habitat in Tritico repente Russiae Dom. Boeber.*  
*Mas niger antennis valde pectinatis rachi albida. Alae fuscæ cinereo variae in primis ad marginem tenuiores. Macula magna albida in medio alac et margo posti-*

- posticus albo punctatus. Posticae atrae ciliis albis.  
Femina omnino aptera absque villo alarum rudimento.
192. B. alis incumbentibus nigris: fasciis albis, abdoni- *Zona*.  
ne atro: segmentorum marginibus sanguineis, femi-  
na aptera.
- Phalaena Zonaria* Wien. Verz. 100. 5.  
Habitat in Germaniae Millefolio Dr. Pflug.  
Magnitudo et statura omnino B. antiquae. Antennae  
pectinatae, nigrae rachi alba. Thorax hirtus cine-  
reus lineis tribus nigris. Alae anticae nigrae vitta  
lata abbreviata baseos, quae in primis ad marginem  
exteriorem extenditur, fascia in medio obliqua stri-  
gaque postica albis. Alae posticae albidae striga me-  
dia margineque postico nigris. Abdomen villosum  
atrum segmentorum marginibus sanguineis.  
*Femina* aptera, crassa, villosa, abdominis segmentis  
margine sanguineis. Rudimenta alarum utrinque  
duo, brevia, cylindrica, hirta, nigra.
193. B. alis conuolutis atris, fronte abdomineque fuluis. *Vmber*.
194. B. alis conuolutis fuluis: maculis albis numerosis *histrio*.  
coeruleo cinctis.
195. B. alis incumbentibus flavis: fasciis sex punctorum *Pylotis*.  
nigrorum, posticis nigro punctatis.
196. B. alis conuolutis flavis: fasciis sex punctorum nigro- *bella*.  
rum, posticis rubris apice nigris.
197. B. alis albis: anticis nigro sanguineoque punctatis, *pulchella*.  
posticis apice nigris.  
Habitat in Heliotropis, Myosotide aruensi.  
*Larua hirsuta* palleseens: linea dorsali alba punctis ni-  
gris rufisque.
198. B. alis depressis rubris atro punctatis, posticis albo *ornatrix*.  
nigroque variis.
199. B. alis incumbentibus, anticis fuscis: fascia flava, po- *priuerna*.  
sticis fuluis: margine atro.
200. B. alis incumbentibus: anticis carneis; vitta inter- *Francisca*  
rupta atra, posticis hyalinis.
- Habitat in Coromandel Dom. Vahl.  
Caput nigrum vertice carneo. Thorax carneus vitta  
dorsali lata atra. Alae anticae supra carneae vitta  
I 2 lata

lata postice interrupta atra, praeterea puncta aliquot parua atra. Posticae hyalinæ, immaculatae. Abdomen subtus fuscum, supra sanguineum maculis dorsalibus atris. Pedes nigri femoribus supra flavis.

- Iesuita.* 201. B. alis incumbentibus atris: stria fulua.
- viciella.* 202. B. alis incumbentibus cinereo hyalinis, antennis fuscis.  
*Tinea viciella* Wien. Verz. 133. 2. tab. 1. a. fig. 7.  
tab. 1. b. fig. 7.
- Tinea* inuoluero palearum vnico teeto Geoff. Inf. 2. 203. 50.  
*Reaum.* Inf. 3. tab. 11. fig. 7. 8.  
*Frish.* Inf. 6. 16. tab. 7.  
Habitat in Vicia syluatica Europæ Dom. Schieffermyller.  
Media. Corpus cinereo lunatum. Antennæ pectinatae fuscae. Alae cinereo hyalinæ, neruosæ, immaculatae. Femina intra puppam oua excludit, nec declaratur.
- vestita.* 203. B. alis incumbentibus nigris immaculatis, abdomine subtus villoso albo.  
*Tinea plumella* Wien. Verz. 133. 6.
- muscella.* 204. B. alis incumbentibus obscure hyalinis, corpore atro.  
*Bombyx muscella* Wien. Verz. 133. 3.  
Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.  
Parua. Corpus totum hirtum, atrum antennis fuscis. Alae hyalinæ, immaculatae.
- bombella.* 205. B. alis incumbentibus cinereis fusco irroratis.  
*Tinea bombycella* Wien. Verz. 133. 4.  
Habitat in Austria. Mus. Dom. Schieffermyller.  
Media. Corpus hirtum, griseum. Alae anticae, cinereæ atomis numerosis fuscis, posticae immaculatae.
- peccinella.* 206. B. alis incumbentibus cinereo hyalinis: anticis strigis obsoletis obscurioribus.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Parua. Corpus hirtum nigrum. Alae anticae cinereo hyalinæ strigis vndatis vix conspicuis obscurioribus. Posticae immaculatae.
- annulata.* 207. B. alis incumbentibus atris niveo maculatis, tibiis albo annulatis.

208. B. alis depressis griseis: linea trifurca punctoque albidis. Wien. Verz. 82. 3. Graminis  
Variat magnitudine forte sexu posticeque striga punctorum nigrorum.
209. B. alis incumbentibus fuscis albo venosis, posticis popularis. albidis.  
Habitat in Russia, Germania Dom. Boeber.  
Statura omnino B. Graminis. Antennae pectinatae, fuscae. Alae anticae fuscae venis albis. In medio maculae ordinariae pupilla obscuriore. Versus apicem striga e maculis paruis sagittatis atris. Posticae albidae margine obscuriore subtusque puncto centrali fuso.
210. B. alis incumbentibus dentatis griseo fuscoque variegatis, thorace antice albo: striga nigra. fulminea.  
*Nolua leucophaea* Wien. Verz. 82. 5.  
Habitat in Germaniae Achillaea Millefolio.  
*Larua virescens* dorso obscuriore; linea longitudinali alba.
211. B. alis incumbentibus atris rubro flauoque variegatis, posticis nigris: margine flauo. Gloriosae
212. B. alis incumbentibus atris ante marginem subferrugineis, posticis albis. Crini.
213. B. alis incumbentibus roseis: strigis tribus fuscis; secunda vndata, tertia punctata. rosea.  
*Nolua rubricunda* Wien. Verz. 68. 10.  
Habitat in Lichenibus arborum.  
*Larua brevis hirsutissima*: pilis plumosis fasciculatis griseis, ore aurantio.  
*Puppa folliculata*: folliculo denso intertextis capillis.
214. B. alis incumbentibus atra, collari sanguineo, ab domine flauo. rubricollis.
- Nolua rubricollis* Wien. Verz. 68. 11.  
Habitat in Lichene oliuaceo Pini et Fagi.  
*Larua pilosa nigricans*: fasciis atris, capite piceo: triangulo albo.
215. B. alis incumbentibus rubro fuliginosis: puncto gemino nigro, abdomine sanguineo: dorso nigro. fuliginosa.  
*Bombyx fuliginosa* Wien. Verz. 54. 11.

*cribrum.* 216. B. alis incumbentibus anticis albis transuerse nigro punctatis Wien. Verz. 68. 8.

*obscura.* 217. B. alis incumbentibus concoloribus fuscis; anticis punctis tribus albo hyalinis, abdomine flauo: linea nigra.

*Phalaena Ancilla* alis fuscis: superioribus punto maculisque quatuor albis; inferioribus luteis margine arcuque fusco. Linn. Syst. Nat. 2. 835. 93.

*Noctua Ancilla* Wien. Verz. 69. 13.

Habitat in Germaniae Lichene parietino.

Variat alis posticis fuscis immaculatis et flauis margine arcuque fuscis.

*Larua pilosa nigra,* flauo lineata: linea dorsali maiore, pedibus posticis flauis.

*punctata.* 218. B. alis incumbentibus concoloribus: anticis fuscis albo punctatis, posticis flauis apice fuscis.

### 152. HEGIALVS. *Palpi* duo reflexi, reflexi.

*Rudimentum linguae bifidae*  
inter palpos.

*Antennae* moniliformes.

*Humuli.* 1. H. alis flauis fulvo striatis maris niueis.  
*Bombyx Humuli* Wien. Verz. 61. 1.

*Iodutta.* 2. H. alis liuidis: fasciis duabus obscurioribus.  
*Bombyx Iodutta* Wien. Verz. 61. 6.

Habitat in Germania Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae omnes fusco liuidae fasciis duabus altera in medio maiore, altera in ipso margine. Posticae immaculatae.

*lupulinus.* 3. H. alis cinereis: striga albidiore,  
Variat alis cinereis ferrugineisque.

*hectus.* 4. H. luteus, alis deflexis: anticis fasciis duabus albidis obliquis punctato interruptis.  
*Bombyx hectus* Wien. Verz. 61. 4.

*carna.* 5. H. alis fuscis: anticis punctis albis nigrisque sparsis.  
*Bombyx carna* Wien. Verz. App. 310. 7.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Statura H. hecti at distinctus alis fuscis punctis albis obscurioribusque.

6. H. alis rufo luteis: lineis duabus obliquis albis, anten- *crux.*  
nis ferratis.

Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.

Statura H. hecti at paullo maior. Antennae valde ser-  
ratae, rufae. Caput et thorax hirta, grisea. Alae  
luteæ rufo mixtae lineis duabus obliquis albis ad  
marginem tenuiorem fere coeuntibus. Posticæ uti  
omnes subtus obscuriores.

7. H. niueus: strigis numerosis abbreviatis nigris stria- *scalaris.*  
que longitudinali fulua.

8. H. niueus: alis punctis numerosis transversalibus ni- *pyrinus.*  
gris, thorace duodecim cyaneis.

153. NOCTVA. *Palpi* compressi pilosi apice  
cylindrici, nudi.

*Lingua* porrecta, cornea.

*Antennæ* setaceæ.

1. N. alis patulis variegatis subtus ferrugineis nigro vn- *Zenobia.*  
datis.

*Phalaena Zenobia* Drury Ins. 3. tab. 39. fig. 1. 2.

2. N. alis patulis concoloribus albo nigroque reticulatis *Strix.*  
nebulosisque.

3. N. alis patulis dentatis fuscis nigro vndulatis: anticis *Bubo.*  
macula magna ocellari brunnea.

4. N. alis patulis dentatis fuscis ferrugineo vndatis, po- *Iphia-*  
sticis basi atris: striga coerulescente. *nasse.*

5. N. alis patulis dentatis brunneis nigro vndulatis ma- *Alueo.*  
culisque tribus marginalibus flavis.

6. N. alis patulis dentatis fuscis nigro vndulatis: anticis *caprimul-*  
ocello coerulescente. *gus.*

7. N. alis patulis dentatis fuscis nigro vndatis: anticis *odora.*  
ocello atro: lunula coerulea strigaque inaeularialba.

8. N. alis patulis dentatis: anticis vndatis strigaque coe- *Mycerina*  
rulea, posticis strigis duabus albis coeruleaque.

- Pluta.* 9. N. alis patulis dentatis nigro vndulatis: anticis fascia abbreviata alba maculaque subocellari.
- Itynx.* 10. N. alis patulis dentatis fuscis ferrugineo vndatis: medio fulvo maculaque geminata: iride alba.  
Habitat in Coromandel Dom. Vahl.  
Parua in hac familia. Alae omnes dentatae fuscae ferrugineo vndatae. In medio alae anticae macula ocellaris ferruginea et pone hanc maculae duae connatae maiores, ocellares, exteriori fulua iride nigra albaque, interiori coerulecente iride atra albaque. Subtus omnes fuscae margine albo punctato. Maculae duae atrae ad marginem interiorem alae posticae.
- spiralis.* 11. N. alis patulis griseo fuscoque vndatis: anticis linea spirali conuoluta nigra.
- crepuscu-* 12. N. alis patulis fuscis: fascia maculaque marginali albaris, anticis ocello.
- squalida.* 13. N. alis patulis: anticis basi fuscis apice cinereis, omnibus subtus striga vndata alba.  
Habitat in Coromandel Dom. Vahl.  
Corpus magnum, fuscum. Alae anticae supra basi fuscae, apice cinereae, subtus fuscae striga media alba. Posticae fuscae macula magna media alba, subtus fuscae striga media e lunulis albis. Pedes fusi puncto niueo ad basin tibiarum posticarum, apice spinarum duobus paribus.
- pandrosa.* 14. N. alis patulis nigricantibus: anticis lunula vitta que niueis.
- umminea.* 15. N. alis patulis integris obscuris: anticis macula didyma niuea; annulo fulvo Sp. Inf. App. 506.
- vespertilio.* 16. N. alis patulis integris cinereis: punctis centralibus nigris postice vndatis.  
Habitat Tranquebariae Dom. de Sianbusch.  
Magna. Caput fuscum. Thorax cinereus lobo antico fuso. Abdomen fuluum. Alae anticae cinereae in medio punctis duobus tribusque nigris. Pone haec striga pallida nigrae innata et tunc fuso vndatae striga punctorum nigrorum. Posticae eiusdem coloris at absque punctis centralibus. Subtus fuluae lunula strigisque tribus fuscis.
- illibata.* 17. N. alis patulis fuscis: macula apicis nigra.

\*\* Tho-

\*\* *Thorace laeui, alis planis incumbentibus.*

18. N. laeuis, alis incumbentibus subdentatis griseis, scro-  
biculo baseos nigro: posticis vitta marginali nigro. *scrobicu-*  
*lata.*
19. N. laeuis, alis incumbentibus dentatis griseis, posti-  
cis luteis: lunula limbique nigris. *Diosco-*  
*reae.*
20. N. laeuis, alis incumbentibus, posticis fuluis: ma-  
cula margineque albo punctato atris. *materna.*

Cram. Ins. 23. tab. 267. fig. E.

21. N. laeuis alis incumbentibus cinereis, posticis rufe-  
scentibus: macula atra. *micro-*  
*rhoea.*
22. N. laeuis alis incumbentibus griseis: punctis strigis-  
que quatuor fuscis, posticis apice nigris albo ma-  
culatis. *serua.*
23. N. laeuis, alis incumbentibus: anticis viridibus apice  
fuscis, posticis flavis: macula atra. *Tirrhaea.*
24. N. laeuis alis incumbentibus: anticis fuscis albo ve-  
nisis, posticis albo nigroque variis. *Paphos.*

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Statura omnino N. Chione. Antennae setaceae nigrae.

Palpi fului puncto baseos apicisque nigro. Caput  
fuluum. Thorax fuluu nigro punctatus. Abdo-  
men fuluum supra linea dorsali, subtus vtrinque li-  
nea laterali punctorum nigrorum. Alae anticae supra  
fuscac margin'e interiori neruisque albis. Subtus fu-  
scac macula media alba. Posticae variegatae.

25. N. laeuis, alis incumbentibus albis, anticis immacu-  
latis, posticis apice virecenti striatis. *chione.*

Variat rarius alis anticis albo lineatis, thorace abdomi-  
neque supra fuluis.

26. N. laeuis, alis incumbentibus concoloribus fuscis:  
disco hyalino, thorace niueo nigro punctato. *Astrea.*

27. N. laeuis, alis incumbentibus fuscis: vitta alba, po-  
sticis flavis apice coeruleis. *Narcissus*

28. N. laeuis alis incumbentibus: anticis fuscis maculis  
duabus strigaque albis, posticis flavis nigro maculatis. *bajularia*

29. N. laeuis alis incumbentibus fusco nitidulis: posticis  
atris; maculis duabus fuluis. *Saga.*

Habitat in Coromandel Dom. Vahl.

Magnitudo N. quercus. Caput et thorax fusca, immaculata. Antennae filiformes, simplices. Alae anticae fuscae immaculatae, subtus nigrae margine maculisque duabus fuluis. Posticae supra atrae macula magna media lunata fulua, minorique apicis. Subtus ferrugineae nigro irroratae. Abdomen dorso fuscō segmentorum marginibus fuluis.

*polita.*

30. N. laevis alis incumbentibus fuscis nitidulis: striga postica punctorum ferrugineorum.

*Noctua polita* Wien. Verz. 85. 3.

Habitat in Taraxaco, Plantagine Dom. Schieffermüller.

Statura omnino N. tetræ. Corpus hirtum, fuscum.

Alae anticae fuscae, nitidae versus apicem striga punctorum ferrugineorum.

*Larua nuda*, testaceo pallida: punctis sparsis nigris.

*tetra.*

31. N. laevis alis incumbentibus fusco nitidulis: punctis quatuor costalibus albis, posticis cinereo ferrugineis.

Habitat in Austriae Alsine Dom. Schieffermüller.

Sequenti duplo minor. Caput et thorax fusca; nitidula, immaculata. Alae anticae itidem fuscae, immaculatae punctis tribus costalibus paruis versus apicem. Posticae cinereae ferrugineo nitidulae. Subtus cinereae. Antennæ pechinatae.

*Larua nuda viridis*: lineis quinque albis: mediis tenuioribus, capite pallidiore.

*liuida.*

32. N. laevis, alis incumbentibus atris nitidulis: posticis ferrugineis; marginē fusco.

*Noctua liuida* Wien. Verz. 85. 13.

Habitat in Austriae Taraxaco Dom. Schieffermüller.

Corpus totum vti alae atrae, nitidulae.

*Larua vtrinque attenuata*, nuda, flavo virescens rubromicans: linea dorsali obscuriore, laterali tenui pallida, variegata, capite pallidiore.

*irrorata.*

33. N. laevis, alis incumbentibus cinereis nigro irroratis, postice striga obsolete rufescente. Sp. Ins. App. 506.

*Quercus.*

34. N. laevis, alis incumbentibus griseis: strigis tribus fuscis.

*Noctua trilinea* Wien. Verz. 84. 5.

*notacula.* 35. N. laevis, alis incumbentibus cinereis: stigmatibus tribus inter strigas duas flavescentes.

Habi-

Habitat — — — — Mus. Dom. Vahl.

Statura omnino N. Quercus. Corpus cinereum. Alae anticae cinereae striga baseos abbreviata flavescente, ante medium striga altera et pone medium striga tertia flavescentes in medio, posteriori maiori veniformi. Posticae supra fuscantes. Subtus oannes cinereae fusco irroratae.

35. N. laevis alis incumbentibus griseis fusco vndatis: *4 punctata*  
punctis quatuor marginis exterioris nigris.

*Noctua calicularis* Wien. Verz. 72. 6.

Habitat in Valeriana Locusta.

36. N. laevis, alis incumbentibus pallidis immaculatis: *pallens*.  
marginibus posticis subtus nigro punctatis.

*Noctua pallens* Wien. Verz. 85. 10.

Habitat in Taraxaco.

37. N. laevis, alis incumbentibus lanceolatis cinereo fuscis pallido striatis: *neruosa*.

*Noctua nervosa* Wien. Verz. 85. 12.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae singulares, lanceolatae, obscurae, pallido lineatae. Posticae albae, immaculatae, subtus fuscæ margine albo.

38. N. laevis, alis incumbentibus cinereis fusco subfasciatis postice punctis nigris: *Vaccinii*.

*Phalaena Vaccinii* spirilinguis alis ferrugineis obsolete nebulosis: puncto strigaque postica septem punctata fuscis. Linu. Syst. Nat. 2. 832. 166. In Sv. 1212.

*Phalaena Vaccinii* Wien. Verz. 85. 2.

Habitat in Sveciae Vaccinio Dom. de Paykull.

Media. Caput et thorax cinerea, innuculata. Alae anticae cinereae basi punctis duobus in medio fascia que postica fuscis. Pone hanc fasciam puncta aliquot nigra.

*Larua ferrugineo fusca*: linea laterali pallidiore, collari caudaque nigris albo striatis.

39. N. laevis alis depressis plumbeis: margine exteriori *complanata* pallidis, posticis totis flavis.

*Phalaena complanata* Wien. Verz. 68. 4.

*Larua pilosa atra*: lineis duabus punctorum pallidorum.

40. N. laevis, alis depressis luteis: anticis punctis duobus *quadra* cyanis.

*bicolora.* 41. *N. laevis*, alis incumbentibus flauis: margine postico late fuscō.

Habitat in Sierra Leon. Dr. Pflug.

Media. Caput et thorax flava, immaculata. Alae anticae itidem flavae puncto paruo medio subferrugineo. Margo posticus late fuscus. Subtus omnes pallidae marginē fuscescente.

*Delia.* 42. *N. laevis*, alis conuolutis flauis: anticis fasciis duabus cyaneis.

Habitat in Insula Amsterdam. Mus. Dom. Banks.

Statura omnino *N. comiplanae*. Caput fuluum anten-nis pectinatis nigris. Palpi omnino huius generis basi fului apice nigri. Thorax fuluu, postice cyaneus. Abdomen flatum. Alae flavae anticis costa exteriori, fascia media aliaque apicis cyaneis. Posticae immaculatae. Pedes cyanei femoribus basi flauis.

*Capreae.* 43. *N. laevis*, alis inaeumbentibus repandis iusco cinereis nitidulis: strigis tribus obliquis, stigmatisbusque albidis.

Habitat in Hafniae Salice Dom. de Sehestedt.

Media. Caput et thorax hirta obscure cinerea. Alae anticae margine postico repando obscure cinereae strigis tribus albidis, duabus ante, tertia pone mediūn. Stigmata siue maculae ordinariae albidae, anteriore rotundata, posteriori maiori veniformi. Posticae fuscae marginē cinereo. Subtus cinereae atomis puncto medio strigaque postica fuscis.

*Larua* solitaria, nuda, viridis.

*conuoluta* 44. *N. laevis*, alis conuolutis pallidis flauo venosis: anticis maculis duabus angulatis atro coeruleis.

*narbonea* 45. *N. laevis*, alis planis: anticis cinereis; strigis duabus flauis posticeque puncto fuscō.

*Boleti.* 46. *N. laevis*, alis depressis planis fuscō irroratis, antennis pectinatis.

\*\*\* *Thorace laeui, alis deflexis.*

*Ficus.* 47. *N. laevis*, alis deflexis cinereis: basi fuluo albo nigroque maculatis, antennis pectinatis apice setaceis.

*coronata,* 48. *N. laevis*, alis deflexis fuscis: strigis tribus obscurioribus stigmatisque postico nigro punctato.

49. N. laeuis, alis deflexis brunneis: posticis fascia coerulea margineque nigro. *Manlia.*
50. N. laeuis alis deflexis atris flavo maculatis: posticis *Geryon.* rubris; margine atro.
51. N. laeuis, alis deflexis brunneis: stigmatibus griseis, *leonina.* posticis flavius: maculis duabus nigris, abdomine cinguli nigris.
52. N. laeuis, alis deflexis fuscis albo striatis: posticis albis; margine nigro. *Dama.*
53. N. laeuis, alis deflexis variegatis: posticis atris marginae albo. *marginalia.*

*Noctua marginata* Sp. Inf. 2. 216. 40.

54. N. laeuis alis deflexis cinereis: punctis lunulisque marginalibus nigris, subtus macula centrali fusca. *Arundinis.*

Scheve Naturforsh. II tab. 3 fig. 1—4. pag 30

Habitat in Arundinibus caulis equis lethalis.

Magna. Corpus cinereum, hirtum, immaculatum. Alae anticae obscure cinereae, nitidulae punctis parvis nigris. In margine crassiori puncta tria pallida. Margo posticus lunulis octo atris. Posticae pallidae. Subtus anticae obscurae, posticae pallidae macula centrali fusca.

55. N. laeuis alis deflexis virescentibus strigis tribus saturatoribus. *virescens.*

56. N. laeuis, alis deflexis: anticis fuscis; maculis quinque incarnatis, posticis albidis. *Batis.*

*Phalaena Batis* Wien. Verz. 71. 7.

57. N. alis deflexis heluolis: macula postica nigro punctata. *Silene.*

*Noctua Silene* Wien. Verz. 85. 1.

Habitat in Brassica campestris Mus. Doin. Schieffermyller. Media. Caput et thorax heluola, immaculata. Alae anticae heluolae striga media abbreviata paullo obseuriore. Maculae ordinariae griseae posteriori veniformi nigro punctata. Variat macula anteriori lunula nigra.

*Larua nuda*, obscure fusca, collari nigro albo marginato: stigmatibus nigris.

58. N. laeuis alis deflexis substriatis ferrugineis: strigis nitidae. flavescentibus, posticis fuscis.

*Noctua*

*Noctua nitida* Wien. Verz. 86. 4.

Habitat in Veronica arvensi Mus. Dom. Schieffermyller.  
Affinis N. Vaccinii. Alae ferrugineae fere reticulatae  
striis vel neruis longitudinalibus strigisque vndatis  
flavescens. In medio maculae ordinariae. Ver-  
sus marginem posticum striga punctorum nigrorum.  
Posticae nigrae.

*Larua nuda* fusco, griseo rufoque varia, capite pal-  
lido collari atro: lineis duabus albis.

*rubiginea* 59. N. laevis alis deflexis flavis ferrugineo vndatis: pun-  
ctis nigris sparsis.

*Noctua rubiginea* Wien. Verz. 86. 8.

Habitat in Pyro Malo Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Antennae fuscescentes. Ca-  
put et thorax flava, immaculata. Alae anticae fla-  
uae strigis plurimis vndatis ferrugineis. Puncta ni-  
gra plurima, in primis versus apicem. Posticae fu-  
scae margine fulvo.

*rufina.* 60. N. laevis, alis deflexis rufis: fasciis fuscescens. postica latiore, subtus rufescens. Linn. Syst. Nat. 2. 830. 72. Clerk. Icon. tab. 4. fig. 8.

*Phalaena heluola* In Sy. 1142.

*Noctua rufina* Wien. Verz. 86. 9.

Habitat in Germaniae Quercu Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium fasciis tribus, intermedia te-  
nuiori.

*Larua nuda hepatica* albo punctata lineaque laterali  
alba.

*strigosa.* 61. N. laevis alis deflexis fusco cinereoque variis: lineo-  
lis tribus atris ante marginem interiorem.

*Noctua strigosa* Wien. Verz. 88. 15.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Corpus cinereum. Alae anticae variegatae stri-  
ga apicis vndata. Margo interior fuscens lineolis  
tribus longitudinalibus atris. Posticae cinereae.

*Fuluia.* 62. N. laevis, alis deflexis concoloribus fuluis: margine  
nigro.

*scutosa.* 63. N. laevis alis deflexis fusco alboque variis: posticis  
basi albis; macula fuscata; apice fuscis albo maculatis.

*Noctua scutosa* Wien. Verz. 89. 1.

Habitat in Artemisia campestris Dom. Schieffermyller.

Statura et magnitudo N. *glyphicae*. Corpus griseo fuscum. Alae anticae fuscae in medio albae maculis tribus fuscis cinctis, apice fuscae strigis punctisque marginalibus albis, subtus limbo albo punctis tribus magnis atris. Posticae basi albidae macula magna fusca, apice fuscae striga obsoleta maculisque duabus albidis, subtus albae puncto medio, striga maculaque apicis fuscis.

*Larua virescens* nigro punctata lineisque tribus obscurioribus.

64. N. laevis alis deflexis cinereo fuscoque variegatis subtus luteis fusco fasciatis. *glyphica*.

*Noctua glyphica* Wien. Verz. 94. 5.

65. N. laevis alis deflexis pallidis: fascia late fusca, posticis albo nigroque variis. *dipsacea*.)

*Noctua dipsacea* Wien. Verz. 89. 3.

Habitat in Centaurea, Plantagine, Fragopogone capitula exedens Dom. Schieffermyller.

*Larua rubra* lineis albis interruptis, capite cinereo.

66. a N. laevis alis deflexis cinereis carneo nitentibus fusco *Ononis*.  
fasciatis, posticis atris: maculis tribus albis.

*Noctua Ononis* Wien. Verz. 89. 4.

Habitat in Ononis spinosae floribus Dom. Schieffermyller.

Statura omnino N. *dipsacea*. Alae anticae basi cinereae in medio fascia lata fusca, tunc cinerea. Margo latae fuscus striga parua cinerea. Posticae atrae maculis tribus cinereis.

*Larua solitaria nuda*: striis roseis ac purpureis alternis: purpurea atomis nigris.

66. b N. laevis, alis deflexis fusco cinereoque variegatis: *Mi.*  
subtus w nigro.

*Noctua Mi* Wien. Verz. 94. 4.

Habitat in Medicagine falcata.

67. N. laevis, alis deflexis cinereis: maculis quatuor fuscis: anterioribus triquetris, posticis flavis fusco fasciatis. *triquetra*

*Noctua triquetra* Wien. Verz. 94. 6.

Habitat in Austria Mus. Dom. Romanii.

Statura omnino N. *Mi.* Corpus cinereum. Alae anticae cinereo fuscoque variae macula magna media triquetra nigra, et pone hanc tres fere coadunatae aliae

aliae fuscae. Alae posticæ flavescentes fascia baseos  
marginaque postico fuscis.

*auida.* 68. N. laeuis, alis deflexis fuscō nitidulis: stigmate fa-  
sciaque postico ferrugineis, posticis albis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Media. Caput et thorax nigricantia. Abdomen ni-  
gueum subtus fuscum. Alae anticae fuscae nitidulæ  
stigmate ordinario ferrugineo et pone stigma striga  
vndata, obsoleta nigra. Versus marginem posticum  
fascia lata marginem exteriorem haud attingens fer-  
raginea lunulis flavescentibus. Margo striga vndata  
nigra. Alae posticæ albae. Subtus anticae fuscae,  
posticæ albae.

*Roboris.* 69. N. laeuis, alis deflexis cinereis: strigis duabus vnda-  
tis albis, macula centrali niuea: lunula nigra.

*mixta.* 70. N. laeuis, alis deflexis pallidis fuscō subfasciatis: po-  
sticis basi pallidis apice fuscis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Media. Corpus album immaculatum. Alae anticae  
pallidae fuscō subfasciatae, posticæ basi pallidae, api-  
ce fuscae. Subtus omnes pallidae.

*albicollis.* 71. N. laeuis alis deflexis basi albis apice fuscis: litura  
duplici alba.

*Noctua solaris* Wien. Verz. 90. 8.

Habitat in Taraxaco, Chinopodio.

*Larua nuda grisea striata antice posticeque, attenuata,*  
capite testaceo, segmento singulo punctis duobus  
albis.

*italica.* 72. N. laeuis alis deflexis fuscis: strigis ferrugineis macu-  
laque transuersa marginali alba.

*Noctua luteosa* Wien. Verz. 90. 7.

Habitat in Plantagine.

*palliata.* 73. N. laeuis alis anticis ferrugineis: puncto apicis atro,  
posticis atris: margine fulvo.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Magnitudo N. albicollis. Caput et thorax obscure fer-  
raginea. Abdomen supra fuscum, subtus cinereum.  
Alae anticae ferrugineæ striga postica obsoleta cine-  
reæ punctoque postico distincto atro. Posticæ atræ  
marginé fulvo. Subtus omnes nigrae marginibus flavis.

74. N. laevis alis deflexis cinerascentibus: disco atro; triangulo niveo.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Media. Corpus cinereum. Alae anticae disco atro triangulo magno niveo linea interiori obliqua. Costa basi nivea. Margo posticus cineres. Subtus omnes obscurae.

75. N. laevis alis deflexis albidis: arcu medio maculaque arcuata. postice marginali atris.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Magnitudo et statura N. albicollis. Antennae pectinatae apice nudae. Alae vti totum corpus albidae, nitidae in medio macula ordinaria, quam lunula atra cingit, ad marginem exteriorem crassior. Versus apicem macula magna marginalis atra.

76. N. laevis, alis deflexis anticis obscure cinereis immaculatis posticis apice nigris albo maculatis. *Vulpina.*

77. N. laevis, alis incubentibus griseis fusco maculatis: *destituta.* striga alba fuscae innata sub marginali.

78. N. laevis alis deflexis: anticis variegatis, posticis nigris: fascia maculisque tribus marginalibus atris.

*Phalaena Melicene* Cram. pap. 27. tab. 323. fig. C. D.

79. N. laevis alis deflexis: anticis fusco variis; puncto *lyncea.* medio nivoeo, subtus flavis fusco vndatis. Sp. Inf. App. 567.

80. N. laevis alis deflexis fuscis: macula magna atra; fasciis duabus: anteriore nivea. *geometrica.*

81. A. laevis, alis deflexis fuscis: fasciis duabus niveis; *folidia.* posteriore vndentata.

82. N. laevis alis deflexis corporeque albis, antennis lineis nivea. quaque testaceis.

83. N. laevis alis deflexis cinereis: macula transuersa nigra postice inaequali albo marginata Sp. Inf. 507.

84. N. laevis alis deflexis fuscis: strigis tribus coeruleo-*inplyta.* scutibus brunneae adnatis.

85. N. laevis, alis deflexis: strigis tribus vndatis maculosa. lisque ordinariis miniaceis.

Noctua miniosa Wien. Verz. 88. 14.

Habitat in Austriae Quercu Mus. Dom. Schieffernyller.  
 Statura omnino N. trapezinae. Antennae pectinatae,  
 ferrugineae strigis tribus miniaceis. Versus margi-  
 nem striga punctorum nigrorum. Posticae albidae  
 striga marginali fusca.

*Larua nigra*: linea laterali interrupta flava, collaris  
 trilineato.

*trapezina* 86. N. laeuis alis deflexis albidis: fascia latissima satura-  
 tiore; puncto nigro margineque punctato.

*Noctua trapezina* Wien. Verz. 88. 13.

*Cerasi*. 87. N. laeuis, alis deflexis griseo ferrugineis: maculis  
 strigaque postica flavescentibus, margine nigro pun-  
 cato.

*Noctua stabilis* Wien. Verz. 76. 2.

Habitat et in Tilia.

*Larua viridis*: lineis lunulaque postica albis.

*instabilis*. 88. N. laeuis, alis deflexis griseis: fascia media ferruginea.

*Noctua instabilis* Wien. Verz. 76. 1.

Habitat in Austriae Amygdalo communi Dom. Schieff-  
 fermyller.

Rustica media. Corpus hirtum, subferrugineum. Alae  
 anticae griseae subundatae fascia media vndata ferru-  
 ginea. Posticae supra fuscae, subtus cinereae pun-  
 cito centrali fusco.

Color alae anticae variat fascia ferruginea tamen sem-  
 per constans.

*Larua nuda viridis*: linea dorsali alba, lateraliter flava.

*humilis*. 89. N. laeuis, alis deflexis griseis: strigis tribus flave-  
 scens mediaque fusca, margine punctato.

*Noctua humilis* Wien. Verz. 76. 3.

Habitat in Leontodonte Taraxaco. Dom. Schieffernyller.

Antennae ferrugineae. Corpus griseum. Alae griseae  
 maculis duabus ordinariis annulo flavescente cinctis.  
 Strigae tres flavescentes, unica ad basin, duabus ver-  
 sus apicem et praeterea unica in medio, quae macu-  
 lam posteriorem transit. Posticae fuscae, subtus albi-  
 dae puncto medio fusco.

*Larua nuda*, obesa, viridis: linea dorsali lateralique  
 albis; priore nigro marginata.

*Lychnidis* 90. N. laeuis, alis deflexis ferrugineo fuscis flavo striatis.

*Noctua Lychnidis* Wien. Verz. 76. 5.

Habi-

Habitat in Lychnidis dioceae capsalis Mus. Dom. Schieffermylex.

**Rustica.** Corpus griseum antennis ferrugineis.. Alae anticae obscurae, subferrugineae striis flavis 6-7. a basi ultra maculas ordinarias ducit, strigam posticam tamen haud attingunt. Versus apicem strigae duae, altera stria fere terminat, altera posterior. Maculae ordinariae in medio. Margo subpunctatus. Posticæ fuscae.

*Larua* viridis ferrugineo punctata lineaque laterali ferruginea.

91. N. laevis, alis deflexis: anticis basi pallidis apice vi-*fixa*. rescentibus: striga pallida, posticis flavis: margine nigro.

Habitat in Gibraltar. Dom. Boeber.

**Parua.** Corpus supra fuscescens, subtus flavum. Alae anticae basi cinerascentes, in media fascia fusca, apice virescentes striga cinerea. Posticæ flavae strigis ante marginem margineque nigris.

92. N. laevis, alis deflexis brunneis: punctis quatuor ap-*monilis*. proximatis albis, antennis pectinatis.

93. N. laevis alis deflexis griseis: strigis vndatis fuscis, *vndata*. posticis cinereis: fascia marginali nigra.

94. N. laevis alis deflexis dentatis cinereis: strigis fuscis, *vittata*. posticis flavescentibus: *vitta* marginali atra.

95. N. laevis, alis deflexis cinereis: striga postica flave-*munda*. scente; punctis duobus atris.

*Noctua munda* Wien. Verz. 76. 7.

Habitat in Pyro communi Dom. Schieffermyller.

Statura omnino praecedentium. Maculae ordinariae obsoletiores. Postice striga flavescentia et in hac puncta duo approximata atra.

*Variat* interdum punctis et duobus atris ad angulum ani.

*Larua* nuda griseo nigroque varia: linea laterali testaceo rufa.

96. N. laevis alis deflexis cinereo fuscis: strigis albidio-*blanda*. ribus.

*Noctua blanda* Wien. Verz. 77. 8.

Habitat in Austria. Mus. Dom. Schieffermyller.

*Rustica media.* Alae anticae cinereo fuscae strigis albidioribus. In medio maculae ordinariae et pone has saepe striga punctorum nigrorum. Posticae albidae.

*ambigua* 97. *N. laevis cinerea:* atomis strigaque pone medium nigris.

*Noctua ambigua* Wien. Verz. 77. 10.

Habitat in Leontodonte, Soncho, Chenopodio Mus. Dom. Schieffermyller.

*Rustica indistincta,* cinera punctis aliquot baseos strigaque pone medium nigris. Maculae ordinariae in medio. Posticae albidae subtus puncto medio nigro.

*Larua ferrugineo fuscoque variegata capite fuscō.*

*gracilis.* 98. *N. laevis,* alis deflexis fusco cinereis: striga vndata fusca baseos, flauescenteque apicis, intermedia punctata.

*Noctua gracilis* Wien. Verz. 76. 4.

Habitat in Lysimachia vulgari Dom. Schieffermyller.

*Noctua fere-indistincta.* Alae obscurae, basi striga nigrante, in medio maculae ordinariae fere obsoletae, pone has striga e punctis nigris, aliaque flauescens. Posticae subtus albidae striga punctorum nigrorum.

*Larua nuda* virens lateribus flauescentibus, incisuris flauis: singulis segmentis punctis quatuor obscuris maculaque antica nigra.

*frugalis.* 99. *N. laevis,* alis deflexis cinereis: fascia obliqua strigaque punctorum nigrorum.

*flava.* 100. *N. laevis,* alis deflexis flauis: strigis vndatis ferrugineis.

*stigmatis-  
zans.* 101. *N. laevis,* alis deflexis angulatis flauis: strigis obscurioribus stigmateque niueo.

*equifris.* 102. *N. laevis,* alis deflexis fuscis: fascia lata viridi.

*dorsalis.* 103. *N. laevis,* alis deflexis viridibus: macula magna communis fusca.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

*Parua.* Palpi porrecti huius generis. Caput et thorax virescentia. Alae anticae virides macula magna communis fusca, quae fere fasciam constituit.

*erythro-  
cephala.* 104. *N. laevis,* alis deflexis atris albo punctatis, capite fulvo.

Habi-

Habitat in Germania Dom. Lund.

*Parua.* Caput piloso fuluum antennis setaceis nigris.

Palpi magni atri, articulo primo pilosissimo, secundo cylindrico nudo. Corpus atrum pedibus apice albo annulatis. Alae anticae atrae punctis plurimis albis quatuor vtrinque marginalibus. Posticae, uti omnes subtus atrae.

105. N. laeuis alis deflexis albis: macula postica virescente. *reiecta.*

106. N. laeuis, alis deflexis griseis fusco maculatis: posticis flauis striga margineque postico fuscis. *ta.*

Habitat in Germania Dom. Boeber.

*Parua.* Alae anticae griseae macula baseos, altera in medio sinuata, tertia ad marginem crassiorem fere strigam efficiens. Posticae flauæ striga ante marginem margineque ipso nigris. Subtus flauescentes.

107. N. laeuis alis deflexis: anticis fusco nebulosis: litora maculaque cinereis, posticis nigris. *elata.*

108. N. laeuis, alis deflexis lanceolatis cinereis: anticis *Boleti.* fusco irroratis.

\*\*\*\* *Thorace cristato, alis incumbentibus.*

109. N. cristata alis planis cinerascentibus fusco vndulatis: posticis rubris; fasciis duabus nigris, abdomine vndique cinereo. *sponsa.*

*Noctua spinosa* Wien. Verz. 90. 5.

Minor fascia antica magis angulata.

110. N. cristata, alis planis cinerascentibus: posticis rubris: fasciis nigris, abdomine cano subtus albo. *nupta.*

*Noctua rubra* Wien. Verz. 90. 4.

Fascia anterior alac posticae magis rotundata, integra.

111. N. cristata, alis grisescientibus subundatis; posticis rubris: fasciis duabus nigris, abdomine supra rubro. *pallia.*

*Noctua pallia* Wien. Verz. 90. 3.

Abdomen supra roseum. Alae posticae roseae: fascia anteriore marginem interiore haud attingente.

112. N. cristata, alis dentatis fusco cinereoque variis: strigis dentatis atris, posticis rubris fasciis duabus nigris. *promissa.*

*Noctua promissa* Wien. Verz. 90. 6.

Habitat in Austriae Quercu Dom. Schieffermyller.  
 Nimis praecedentibus affinis at N. pactae duplo minor.  
 Alae anticae cinereo fuscoque variae: strigis dentatis  
 atris. Thorax griseus fascia atomisque nigris.

*Fraxini.* 113. N. cristata, alis dentatis cinereo nebulosis, posticis  
 supra nigris: fascia coeruleocente.

*Noctua Fraxini* Wien. Verz. 90. 2.

*forniofa.* 114. N. cristata, alis incumbentibus purpurascens vitta  
 maculisque duabus flavis, posticis fulua macula  
 margineque nigris.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Magnitudo N. pronubæ. Caput nigricans lineis duabus albidis. Thorax purpurascens. Abdomen flavidum. Alae anticae vitta versus marginem interiorem apicem haud attingente, interrupta maculisque duabus posteriore transuersa flavis. Subtus flavae apice fuscæ maculis duabus flavis. Posticae fuluae macula media transuersa margineque postico nigris. Subtus concolores.

*pronuba.* 115. N. alis incumbentibus: posticis testaceis; fascia nigra submarginali.

*Noctua pronuba* Wien. Verz. 79. 20.

*Orbonga.* 116. N. cristata, alis incumbentibus hepaticis: posticis flavis; lunula strigaque postica fuscis.

Habitat in Germania Doin. Boeber.

Statura omnino N. pronubæ. Caput et thorax hepatica. Alae anticae hepaticæ strigis aliquot punctorum nigrorum obsoletorum. Subtus macula magna nigra. Posticae flavae lunula media strigaque postica fuscis, subtus lunula margineque interiori hepaticis.

*Solani.* 117. N. cristata, alis incumbentibus virescenti griseoque variis, posticis rufis: fascia lata submarginali.

Naturf. 9. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Europæ Solano tuberofo, fabis, in aliis larvis saeuiens.

Nimis N. pronubæ affinis, differt tamen alis anticis magis virescentibus. Versus apicem puncta aliquot alba ad marginem crassiorem et iuxta haec macula parua atra. Posticae rufae fascia lata atra. Subtus omnes multo dilutiores.

*Larua obesa*, rugosa, cinerea.

*Puppa nuda*, brunnea.

118. N. cristata alis incumbentibus dentatis variegatis apicem ferrugineis, posticis flavis margine fuscō. *linogrisea*

*Noctua linogrisea* Wien. Verz. 79. 22.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Affinis N. pronubae, at distinctus alis dentatis anticis valde variegatis apice ferrugineis.

*Larua dorso rubicundo lineolis obliquis punctisque nigris.*

119. N. cristata, alis deflexis griseis: strigis angulatis nigris, posticis flavis: fasciis duabus arcuatis atris. *hymenaea*

*Noctua hymenaea* Wien. Verz. 91. 8.

Habitat in Pruno spinosa Dom. Schieffermyller.

Nimis affinis N. paranymphe, at alae anticae magis griseae absque strigis albis.

*Larua flavo virescens*: lineis duabus tuberculorum eleuatorum denteque medio eleuato porrecto.

120. N. cristata, alis incumbentibus variegatis, corpore raptā supra nigro: vitta dorsali alba.

Habitat Tranquebariae Dom. de Sianbusch.

Magna. Antennae ferrugineae rachi alba. Palpi magni albi. Caput et thorax supra nigra linea media albida. Abdomen cinereum dorso fuscō, vitta pallida. Alae anticae variegatae, posticae pallido nigroque variae, subtus flavescentes angulo ani macula transuersa fusca.

121. N. cristata alis incumbentibus variegatis: punctis duobus albis, posticis atris: margine albo. *Epione*.

122. N. cristata, alis planis: anticis fuscis; strigis angulatis albis nigrisque, posticis flavis: fasciis duabus arcuatis atris. *paranymphe*. Wien. Verz. 91. 7.

*Larua nuda* cinerea: tuberculo dorsali luteo caudalique reflexo, acuto, subtus nigro punctata.

123. N. cristata, alis planis griseo fasciatis, posticis heluo-*fimbria*: macula linearī atra.

Wien. Verz. 78. 18.

Habitat in Primula veris.

*Larua obesa* ochraceo grisea: linea dorsali, pallida, stemmatibus atris: pupilla alba.

*Ianthina*. 124. N. cristata, alis incumbentibus griseis: litura albida, posticis atris: macula media margineque ferrugineis.

*Noctua Ianthina* Wien. Verz. 78. 19.

*Phalaena domiduca* Knoch. Ins. 1. tab. 4. fig. 5.

*Phaena domiduca* Fyssl. Arch. 3. tab. 16.

Habitat in Germaniae Aro. Dom. Romanus.

In medio alii anticeae lunulae aliquot albae.

*Larua albida* fusco vndata posticeque punctis nigris.

*meretrix*. 125. N. cristata alis incumbentibus griseis: lunula centrali fusca inter strigas albidas, posticis basi albidis. Sp. Ins. App. 597.

*alienata*. 126. N. cristata alis incumbentibus fulvis: maculis ocellariibus flaviis; posticis luteis macula margineque nigris.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pfug.

Corpus paruum, flavidum. Alae anticeae fulvae maculis duabus basin ocellantibus, connatis, tribus in medio fere fasciam constituentibus, tribusque maioribus, tribusque minoribus connatis apice flaviis, omnibus annulo nigro cinctis. Posticae flavae puncto medio margineque nigris.

*Augur*. 127. N. cristata alis incumbentibus fuscis: characteribus atris.

*Segetis*. 128. N. cristata, alis incumbentibus ferrugineis: strigis vndatis obscurioribus, posticis albidis.

*ambusta*. 129. N. cristata alis incumbentibus griseo fuscis: strigis tribus annuloque medio flavescentibus, striga postica vndata.

*Noctua ambusta* Wien. Verz. 88. 16.

Habitat in Lichene parietino Dom. Schieffermyller.

Parua. Antennæ ferrugineæ basi albidae. Caput et thorax rufi grisea. Alae griseo fuscae strigis tribus annuloque medio oblongo flavescentibus. Posticae albidae apice fuscae.

*Larua nuda*, fusca alba lineata. Quies 3 mensium.

*subtusa*. 130. N. cristata, alis incumbentibus fusco cinereis: strigis quatuor annulisque tribus flavescentibus.

*Noctua subtusa* Wien. Verz. 88. 17.

Habitat in Populo tremula Dom. Schieffermyller.

Statura praeecedentis. Antennae pallidae. Corpus cinereum, inimaculatum. Alae anticae obscure cinereae striga parva baseos, altera ante medium, tunc annuli tres, anteriori striga secunda connexa, posteriori maiori, veniformi, demum striga incurua et ultimo striga vndata flavescentibus. Posticae fuscae. *Larua nuda*, albida, albo lineata, capite nigro: fronte alba.

131. N. cristata alis incubentibus fusco griseis subemarginatis: strigis tribus pallidioribus. Linn. Syst. Nat. 2. 858. 193. In Sv. 1218.

*Noctua retusa* Wien. Verz. 88. 18.

Habitat in Salice Dom. Schieffermyller.

Distincta alis anticis subemarginatis. Maculae ordinariae in medio.

*Larua nuda viridis*: lineis dorsalibus tribus, laterali solitaria.

132. N. cristata, alis incumbentibus ferrugineis: strigis fuscis vndatis, posticis apice nigris albo maculatis. mercatoria.

133. N. cristata, alis incumbentibus subdentatis griseis: partita. macula baseos atra, stigmatibus duobus brunneis strigaque media alba.

134. N. cristata, alis incumbentibus dentatis cinereo nimaura. groque variis, subtus margine albo.

*Noctua maura* Wien. Verz. 90. I.

135. N. cristata, alis incumbentibus dentatis fuscescentibus in medio griseis: puncto atro lunulaque fusca. lunaris.

*Noctua lunaris* Wien. Verz. 94. I.

Habitat in Quercu Austriae Mus. Dom. Schieffermyller.

Antennae fuscae basi albae. Caput et thorax fusco grisea. Alae anticae basi griseae tunc fuscae striga cinerea, in medio griseae puncto parvo atro lunulaque vel macula veniformi fusca, tunc striga cinerea, demum fuscescentes fascia obsoleta dentata cinerea punctisque ante marginem nigris. Posticae basi cinereae apice fuscae. Corpus magnum abdomine cinereo.

*Larua ferrugineo fusca pallido punctata*, antice punctis duobus fulvis tuberculisque duobus caudalibus.

136. N. cristata alis incumbentibus glaucis: puncto lunula thoraceque antice atris Linn. Syst. Nat. 2. 851. 74. lusoria.

*Noctua lusoria* Wien. Verz. 94. 2.

Reaum. Inf. 1. tab. 14. fig. 10.

Habitat in Europae Astragalo Glycyphyllo Dom. Schiefermyller.

*Larua cinerea nigro punctata*: lineis duabus atris, intermediaque interrupta flava.

*Craccae.* 137. N. cristata, alis striatis cinereis: puncto albido, lunula punctata thoraceque antice atris.

*Noctua Craccae* Wien. Verz. 94. 3.

Habitat in Vicia Cracca Mus. Dom. Schiefermyller.

Statura praecedentis at paullo minor. Thorax cinereus antice ater. Alae anticae venis striatae cinereae puncto paruo albo ante medium. In medio lunula e punctis aliquot atris. Postice fascia obsoleta obscurior. Costa punctis quatuor fusca.

*Larua fusco griseoque varia*, cauda bifida.

*libatrix.* 138. N. cristata, alis incumbentibus dentato erosis rufo griseis: punctis duobus albis.

*Noctua libatrix* Wien. Verz. 62. 1.

*plecta.* 139. N. cristata alis incumbentibus fuscis: margine crassiori albo.

*Noctua plecta* Wien. Verz. 77. 6.

*C. nigrum* 140. N. cristata, alis planis fusco cinereis macula nigra extus albida lineolaque apicis atra. Linn. Syst. Nat. 852. 162. In Sv. 1193. Clerk. Icon. tab. 1. f.g. 3.

*Noctua C. nigrum* Wien. Verz. 77. 7.

Habitat in Spinacia oleracea Dom. Schiefermyller. Thorax fuscus antice albus striga ferruginea. Alae posticæ albidae.

*Larua cinereo fuscoque varia*: lineolis lateralibus transversis atris lineaque lateralī pallida.

*signum.* 141. N. cristata alis maculis tribus fuscis: costa baseos cinerascente, thorace fusco antice brunneo.

*Noctua signum* Wien. Verz. 78. 8.

Habitat in Austriae Atriplice hortensi Mus. Dom. Schiefermyller.

Statura praecedentis. Alae anticae fuscae costa usque ad medium cinerea fusco vndata apice albo punctata. In medio loco macularum lunulae duae cohaerentes, atrae. Margo posticus striga punctorum alborum. Posticæ obscurae.

142. N. cristata alis incumbentibus fuscis cinereo strigosis; lineolis duabus centralibus atris; anteriore arcuata. *Nun atrum*.

*Noctua Nun atrum* Wien. Verz. 78. 9.

Habitat in Gallio Aparinis Dom. Schieffermyller.

Nimis affinis N. gothicae. Antennae ferrugineae pectinatae. Alae anticae fuscae strigis aliquot albidis. In medio lineolae duae, quarum anterior maior arcuata. Costa ultra medium punctis atris postice cineris. Posticae fuscae subtus puncto centrali albo.

*Larua glabra, viridis, albo punctata: linea laterali nivea.*

143. N. cristata, alis incumbentibus fuscis: macula media *cincta*, grisea linea flexuosa atra cincta pupillaque atra.

*Noctua i cinctum* Wien. Verz. 78. 10.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Antennae pectinatae, fuscae. Caput et thorax cinerea. Alae anticae ultra medium fuscae. In medio macula magna grisea, et in hac punctum transversum atrum. Maculam ipsam cingit linea flexuosa atra ante basin interrupta. Alae apice griseae margine punctato. Posticae fuscae.

144. N. cristata alis subincumbentibus fuscis maculisque *rectangulis* quatuor medii atris, duabus costalibus, thorace antennae atro.

*Noctua rectangula* Wien. Verz. 78. 15.

Habitat in Trifolio Melilotus Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Caput et thorax ferrugineo fusca, hic antice ater. Alae anticae fuscae punctis aliquot baseos maculisque quatuor medii, quarum duas costalis, nigris. Costa albo punctata.

145. N. cristata, alis planis fusco cinereoque nebulosis: *polymita*. angulo ani macula atra.

*Noctua polymita* Wien. Verz. 72. 4.

146. N. cristata alis incumbentibus cinereo nebulosis: *Brassicae*. vno nigro ad maculam priorem.

*Noctua Brassicae*. Wien. Verz. 81. 21.

*Larua fusca vel viridis: linea dorsali obscuriore stigmatis albis.*

147. N. cristata alis incunibentibus griseis: linea flexuosa *flammatra*. baseos nigra, thorace fascia atra.

*No-*

*Noctua flammatrix* Wien. Verz. 80. 1.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Affinis N. exclamationis. Corpus cinereum fascia lata abbreviata thoracis atra. Alae anticae griseae linea magna baseos flexuosa atra. In medio maculae ordinariae macula fusca distinctae.

*Cespitis.* 148. N. cristata alis incumbentibus fusca: strigis tribus vndatis albidis nigrae innatis, posticis albis.

*Noctua Cespitis* Wien. Verz. 82. 2.

Habitat in Aira cespitosa Dom. Schieffermyller.

Media. Caput et thorax fusca, immaculata. Alae anticae fuscae nitidulae strigis tribus vndatis pallidis, vnlca ante medium, duabus pone medium, quae interne terminantur striga atra. In medio maculae ordinariae annulo albo. Posticae albae margine interdum fuscescente.

*Larua nuda* fuscescens: lineis tribus pallidioribus concurrentibus.

*Chenopo-* 149. N. cristata alis planis cinereis nigro maculatis: striga postica bidentata alba, thoracis crista breui bifida.

*Noctua Chenopodii* Wien. Verz. 82. 6.

Habitat in Austriae Chenopodio Dom. Schieffermyller.

Media. Antennae fuscae. Caput et thorax cinerea immaculata. Alae anticae cinereae atomis in primis costae marginisque postici nigris. In medio maculae ordinariae. Ante marginem posticum striga cinerea bidentata.

*Larua viridis* linea dorsali obscuriore, laterali rubra,

*contigua.* 150. N. cristata alis planis fusco cinereoque nebulosis: striga postica bidentata alba, thoracis crista bifida.

*Noctua contigua* Wien. Verz. 82. 7.

Habitat in Chenopodio bon. Henrico Austriae Mus. Dom. Schieffermyller.

Nimis praecedenti affinis at magis obscura.

*Larua viridis* capite maculisque duabus primi segmenti brunneis, stigmatibus nigris.

*dentina.* 151. N. cristata alis planis cinereo fuscoque variis: macula marginis interioris strigaque postica flavis.

*Noctua dentina* Wien. Verz. 82. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae anticae cinereae in medio in primis fuscantes  
maculis ordinariis maculaque cinerea bifida. Distin-  
cta macula marginis interioris ad basin strigaque po-  
stica vndata flavis.

152. N. cristata alis albido cinerascentibus: anticis subne- *bimaculo-*  
bulosis, posticis nigro bimaculatis. Linn. Syst. Nat. sa.  
2. 856. 184.

*Noctua bimaculosa* Wien. Verz. 82-5.

Habitat in Germania.

*Larua nuda grisea* albo punctata cornubus caudalibus  
duobus.

153. N. cristata alis incumbentibus fuscis: linea atra *exclamā-*  
maculaque cordata, posticis atris. *tionis.*

Habitat in Senecione vulgari.

*Larua ferrugineo fusca nigro punctata:* linea dorsali  
pallida.

154. N. cristata alis incumbentibus luteo cinereis: macu- *distincta.*  
lis duabus centralibus atris apice obscuris.

Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.

Statuta omnino praecedentis. Caput et thorax hirta.

Palpi subtus fusi. Alae anticae ultra medium luteo  
cinereae strigis aliquot obsoletis fuscis. In medio  
macula potius vntica oblonga atra stigmate rotundato  
in duas diuisa. Margo posticus obscurus striga gri-  
sea terminalique e punctis atris. Posticae subtus ci-  
nereae punto medio strigaque postica fuscis.

155. N. cristata alis incumbentibus fuscis apice pallidio- *suffusa.*  
ribus: linea media duabusque apicis punto albo  
notatis atris.

*Noctua suffusa* Wien. Verz. 80. 4.

Habitat in Soncho arvensi Dom. Schieffermyller.

Corpus fuscum fascia antica atra. Alae anticae fuscae  
interdum griseo variegatae apice pallidiores. Pone  
medium linea crassa atra et versus apicem duas mi-  
nores, cuspidatae punto albo notatae. Posticae  
albidae.

156. N. cristata alis subincumbentibus cinereis fusco vni- *signifera.*  
datis: linea baseos atra, pupilla apicis oblonga al-  
bida.

*Noctua signifera* Wien. Verz. 80. 8.

Habitat in Cochlearia, Draba. Dom. Schieffermyller.

Caput

*Caput et thorax grisea, immaculata. Alae anticae cinereae fusco paullo vndatae. Linea atra a basi usque ad medium ducta, quae apice dilatatur pupilla oblonga, albida. Maculae ordinariae in medio altera oblonga, altera veniformis. Margo nigro striatus. Posticæ albidae.*

*Larua nuda cinereo fuscoque varia punctis lineisque nigris, collari flavescente: lineis tribus albis.*

- valligera.* 157. N. cristata alis incumbentibus cinereo fuscoque variis: macula oblonga baseos nigricante: puncto ocellari ferrugineo.

*Noctua valligera* Wien. Verz. 80. 9.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Antennæ pectinatae. Corpus griseum. Alae griseac maculis ordinariis punctisque variis fuscis. Macula magna, oblonga, nigricans ad basin et in hac punctum ferrugineum annulo albido cinctum. Costa fufca punctis tribus albis. Antennæ pectinatae.

- Caecima-* 158. N. cristata alis incumbentibus dentatis griseis: punctis duobus baseos nigris strigisque duabus cinereis.

*Noctua caecimacula* Wien. Verz. 81. 14.

Habitat in Austriae Sio falcaria Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus griseum antennis fuscis. Alae anticae basi griseae punctis duobus nigris, altero ad basin, altero ante medium in striga ipsa vndata cinerea. Medium parum obscurius maculis ordinariis. Pone has striga altera cinerea. Margo griseus striga punctorum nigrorum.

*Larua carnea atomis nigris: lateribus capiteque flavescentibus.*

- I. album.* 159. N. cristata grisea, alis incumbentibus l. albo notatis.

Habitat in Plantagine.

Margo posticus fuscus.

- viminalis* 160. N. cristata alis incumbentibus basi fuscis: strigis vndatis fuluis apice cinereis.

- pagana.* 161. N. cristata, alis incumbentibus griseo fuscis: punctis marginalibus fuscis quinque, albis tribus, posticis albis: fascia nigra.

\*\*\*\*\* *Thorace cristato, alis deflexis.*

162. N. cristata, alis deflexis flauis: strigis ferrugineis; *fuluago*.  
posteriore punctata, posticis albis.

*Phalaena fuluago* Linn. Syst. Nat. 2. 858. 190. In Sv. 1173.

*Noctua fuluago* Wien. Verz. 86. 1.

Clerk. Icon. tab. 6. fig. 15.

Habitat in Europae Betula alba,

Maior N. Citrago.

*Larua nuda pallida*: capite brunneo.

163. N. cristata, alis deflexis ferrugineis: strigis fuscis, *croceago*.  
costa albo punctata.

*Noctua croceago* Wien. Verz. 86. 2.

Habitat in Quercu Austriae Dom. Schieffermyller.

Caput et thorax ferruginea, immaculata. Thoracis  
crista valde elevata, compressa. Alae anticae ferru-  
ginea strigis tribus obscuris. Costa punctis duobus  
baseos quatuorque in medio niueis. Posticae albidae  
puncto strigaque vndata sanguineis.

*Larua flavescentis linea dorsali fusca lineolisque obli-  
quis lateralibus aurantiis.*

164. N. cristata alis deflexis fuscescentibus: litura baseos *aurago*,  
fasciaque media late flauis.

*Noctua aurago* Wien. Verz. 86. 7.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Alae anticae basi apiceque fu-  
scae litura flavescente. In medio fascia lata dentata  
flava. Posticae cinereae.

*Larua nuda grisea*: lineolis obliquis fuscis. Quies  
quatuor hebdomadum.

165. N. cristata, alis deflexis deflexis flauis: punctis nu- *sulphura-*  
merosis strigisque fuscis. *go.*

*Noctua sulphurago* Wien. Verz. 86. 8.

Habitat in Austriae Betula Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Alae anticae pallide flavae pun-  
ctis baseos fuscis. In medio strigae duae, anteriore  
maiore, posteriore valde vndata. Pone strigam an-  
teriorum annuli duo fuscii. Margo fusco punctatus.

*Larua nuda albida*, capite flavo. Quies 17 dierum.

166. N. cristata alis deflexis flauis fusco subfasciatis, po- *Cerago*.  
sticis albis.

*Noctua Cerago* Wien. Verz. 86. 9.

Habitat in Germaniae Salice Dom. Schieffermyller.

Praecedentibus affinis at maculae latiores fere fascias constituunt. Thorax flauus crista in altero sexu eleuata, acuminata.

*rutilago.* 167. N. cristata, alis deflexis flauis ferrugineo strigosis: fascia baseos apicisque fusca.

*Noctua rutilago* Wien. Verz. 86. 4.

Habitat in Europe Populo.

Media. Corpus fuscum, abdomine albido. Alae anticae fluae strigis numerosis atomisque ferrugineis, maculisque ordinariis distinctis. Fascia baseos lata ad marginem interiorem totam basin occupat.

*citrago.* 168. N. cristata, alis deflexis luteis: strigis tribus ferrugineis obliquis.

*luteago.* 169. N. cristata, alis deflexis flauis: strigis duabus dentatis fuscis.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Statura praecedentium. Antennae ferrugineae rachi alba. Alae anticae flavescentes strigis duabus in medio ad marginem interiorem fere coeuntibus, valde dentatis, fuscis. Posticae albidae.

*ferrago.* 170. N. cristata alis deflexis ferrugineis: macula media fusca; lunula alba.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Alae anticae ferrugineae, in medio macula fusca et in hac lunula alba. Pone fasciam striga e punctis vix conspicuis nigris. Posticae fuscae. Subtus omnes argenteae nitidae.

*flavago.* 171. N. cristata, alis deflexis flauissimis: punctis fascia que lata fuscis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Statura et summa affinitas N. Cereago. Caput fuscum. Thorax antice fuscus, postice cristatus, flauus. Alae anticae flauissimae punctis aliquot fuscis. Macula magna baseos ad marginem exteriorem fusca. Pone medium fascia lata, sinuata, fusca, in qua puncta tria costalia, flava. Pone hanc striga e punctis paruis fuscis. Alae posticae cinereae.

172. N. cristata, alis deflexis luteis: puncto medio fusco *gilyago*, strigaque postica punctorum nigrorum.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Statura praecedentium Alae anticae flavae vix strigosa puncto magno medio fuscō et pone hoc striga e punctis sex nigris. Alae posticae albac.

173. N. cristata alis deflexis orichalceis: margine fascia *chrysitis*, que griseis.

*Noctua chrysitis* Wien. Verz. 92. 2.

174. N. cristata alis deflexis purpurascensibus: maculis *concha*, duabus punctisque apicis aureis.

*Phalaena C. aureum* Knoch Beytr. t. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Austriae plantis.

Caput et thorax antice ferruginea. Antennae pallidae. Alae anticae purpurascentes lineola baseos maculis magnis duabus in medio punctisque quatuor versus apicem aureis. Posticae pallidae.

175. N. cristata alis deflexis fuscis: macula magna *lunata* *orichalcea*.

176. N. cristata alis deflexis cinereis: macula marginali *lumina*, atra vtrinque auro marginata maculaque aurea.

*Noctua lumina* Wien. Verz. 314. 8.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Affinis N. bractea at minor. Caput et thorax grisea. Abdomen basi fascientis pilorum nigrorum. Alae anticae cinereae macula in medio marginis tenuioris magna atra vtrinque striga aurea terminata. Externe in apice macula magna aurea et in hac macula nigra.

177. N. cristata alis deflexis variegatis: macula magna *bractea*, media aurea nitida.

*Noctua bractea* Wien. Verz. 314. 7.

Habitat in Europa australi Dom. Zschuck.

Statura omnino N. festucae. Caput et thorax obscure ferruginea. Alae anticae cinereo, fuscō, ferrugineoque variae. In medio macula magna, angulata, nitida aurea. Posticae cinereae.

178. N. cristata alis deflexis: anticis flavo fuscoque variiss; *Festucae*, maculis tribus argenteis.

*Noctua Festucae* Wien. Verz. 92. 1.

- circumflexa.* 179. *N. cristata* alis deflexis: anticis fuscous charætere flexuoso argenteo Linn. Syst. Nat. 2. 884. 128. Wien. Verz. 93. 4.  
Habitat in Germaniae Achillaea Mellefolio.  
*Larva* subnuda viridis: linea laterali obscuriore.  
*Puppa* dimidiato alba nigraque.
- Artemisiae.* 180. *N. cristata*, alis deflexis anticis viridibus: maculis argenteis sparsis.  
*Noctua argentea* Sp. Inf. App. 507.  
*Noctua Artemisiae* Wein. Verz. 312. 9.  
Knoch. Beytr. 1. 45. tab. 3. fig. 1, 2.
- Gamma.* 181. *N. cristata* alis deflexis dentatis: anticis fuscis et aureo inscriptis.  
*Noctua gamma* Wien. Verz. 39. 5.
- moneta.* 182. *N. cristata*, alis deflexis aureis: strigis vndatis annuloque genuinato argenteo.  
Habitat in Austriae montosis Dom. Schieffermüller.  
Magnitudo N. Festucae. Thorax cristatus griseus punctis nigris. Alae anticae aureae strigis atomisque fuscis, apice obscuriores. In medio annulus duplicatus argenteus quadro fusco notatus. Posticae cinereac.
- aemula.* 183. *N. cristata* alis deflexis dentatis nigro cinereoque variegatis: lineola media duplicita argentea.  
Habitat in Austria Dom. Schieffermüller.  
Statura et summa affinitas N. gamma at alae omnes nigro cinereoque variegatae. Signum medio alae inscriptum paruum, minus distinctum. Posticae basi cinereae, apice fuscae.
- diuergens* 184. *N. cristata* alis deflexis integris: anticis griseis medio fuscis signo albo inscriptis, posticis fuluis: margine fusco.  
Habitat in Austriae montosis Dom. Schieffermüller.  
Affinis praecedentibus at minor. Alae anticae cinerascentes macula magna fusca ad medium marginis interioris et in hoc signum album. Posticae fuluae margine fusco.
- argentina* 185. *N. cristata* alis deflexis griseis: vitta lata abbreviata argentea.  
Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

**Parna.** Corpus pilosum album. Alae anticae griseae vitta lata fere marginali argentea ab basi ultra medium ducta, nitida. Posticae niueae.

186. N. cristata alis deflexis: anticis fusco cinereoque variis signo? albo inscriptis. interrogationis.

Wien. Verz. 93. 3.

Habitat in Vrtica yrente.

187. N. cristata, alis deflexis obscuris basi nigro punctata signata. tis signo medio? aureo inscriptis.

188. N. cristata, alis deflexis griseis: macula apicis dorsalique brunneo aurea. Peponis.

189. N. cristata alis deflexis: anticis ferrugineo griseis i iota. resupinato aureo inscriptis.

190. N. cristata alis deflexis fusco cinereoque variis: ar lunata. cu medio flavo marginato.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lund.

Statura omnino praecedentium. Thorax valde cristatus cinereus. Alae anticae fusco cinereoque variae. In medio arcus magnus cinereus margine flavo. Posticae basi cinereae apice fuscae.

191. N. alis deflexis fuscis cinereo variegatis, posticis albo hyalinis. pauperrata.

192. N. alis deflexis eroso dentatis pallidis: anticis basi incarnata: triangulo fusco. meticulosa.

Wien. Verz. 83. 1.

193. N. cristata alis deflexis dentatis viridibus: margine ciliata. postico cinereo.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Magnitudo N. lacerae. Antennae pectinatae apice setaceae. Corpus cinereum thorace antice parum brunneo. Alae anticae obscure virides, minime nitidae margine postico dentato, late cinereo. Posticae fuscae margine exteriori pilis fusciculatis ciliato, postico dentato cinerascente. Subtus omnes fuscescentes. Tibiae anticae barbatae.

194. N. cristata, alis deflexis integris virescentibus nitidulis: strigis duplicatis albis; anteriore inflexa, maculisque duabus apicis fuluis. confusa.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Nimis sequenti affinis at minor et maculae tantum duae distinctae apicis fuluae.

- illustris.* 195. N. cristata alis deflexis integris viridi cinereoque nitidulis: maculis tribus ferrugineis distinctis.  
Habitat in Germania australiori Dom. Zschuck.  
Similis N. meticulosae at paullo minor. Corpus obscure cinereum. Thorax valde cristatus antice parum ferrugineus. Alae anticae cinereo, viridi carneoque variegatae, nitidae et ad marginem posticum maculae tres distinctae ferrugineae, strigis duabus pallidis inclusis. Posticæ cinereæ.
- lacera.* 196. N. cristata, alis deflexis fusco ferrugineo variegatis dorso emarginatis, fronte fulua.
- Oo.* 197. N. cristata, alis deflexis cinerascentibus ferrugineo strigosis oo notatis. Linn. Syst. Nat. 2. §32. 81.  
In Sv. 1159.  
*Noctua Oo* Wien. Verz. 87. 1.  
Roef. Ins. I. Phal. 2. tab. 63.  
Wilks pap. tab. I. a. 22.  
Habitat in Europæ Quercu.  
*Larua violacea*: punctis lineisque albis: dorsali interrupta.
- flamma.* 198. N. cristata alis deflexis ferrugineo flavoque variis: maculis ordinariis confluentibus.  
Habitat in Austriae Muñ. Dom. Schieffermyller.  
Minor N. Oo. Alae anticae ferrugineo flavoque variegatae; apice albido striatae. In medio maculae ordinariae interne lineola albida cinctæ. Posticæ fuscae subtus rufescentes puncto strigaque fuscis.
- gothica.* 199. N. cristata, alis deflexis: anticis fuscescentibus; arcu punctoque medio atris.
- derasa.* 200. N. cristata, alis deflexis: anticis supra decorticatis.  
*Noctua derasa* Wien. Verz. 87. 2.
- Serici.* 201. N. cristata, alis deflexis albis: strigis tribus nigris, posticis luteis, punctis strigaque nigris.  
*Noctua Serici* Thunb. Act. Holm. 1781. 243. tab. 5. fig. 12.  
Habitat in Iaponia culta fericum praebens.  
Magnitudo N. Mori. Corpus album collari sanguineo.  
Alae anticae albae strigis tribus areuatis nigris.

202. N. cristata alis deflexis cinereis fusco vndatis: major.  
cula media grisea.

*Noctua or* Wien. Verz. 87. 5.

Habitat in Austriae Populo Dom. Schieffermyller.

Media. Alae anticae cinereae strigis numerosis vndatis  
in primis baseos fuscis. In medio macula magna trans-  
versa grisea. Posticae obscurae.

*Larua virescens*, capite brunneo: margine antico atro.

203. N. cristata alis deflexis cinereis: fasciis duabus ferrugineis obsoletis puncto que medio albo.

*Noctua diluta* Wien. Verz. 87. 6.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Media. Alae cinereae basi fascia ferruginea postice stri-  
ga fusca terminata, pone medium fascia altera minus  
distincta striga fusca terminata. Subtus cinereae stri-  
ga fusca. Thorax cinereus.

*Larua pallida*: linea dorsali fusca; capite atro.

204. N. cristata alis deflexis obscure cinereis: fasciis duabus obscurioribus, thorace antice brunneo.

*Noctua ruficollis* Wien. Verz. 87. 7.

Habitat in Quercu Robore Dom. Schieffermyller.

Antennae thoraxque antice ferruginea. Abdomen ci-  
nereum. Alae posticae cinereae.

*Larua nuda*: dorso plumbeo; lateribus albis nigro  
punctatis.

205. N. cristata alis deflexis dentatis brunneis: anticis pun-  
cto flavo inter punctula duo alba.

*Noctua satellitia* Wien. Verz. 86. 5.

*Larua nigra* albo sublineata, collari anque flavo li-  
neatis, in alias laruas saeuit.

206. N. cristata, alis deflexis ferrugineis: muculis tri-  
bus costalibus albis, postice punctis nigris duobus.

*Noctua diffinis* Wien. Verz. 88. 10.

*Larua viridis* albo lineata, capite pedibusque anticis  
atris.

207. N. cristata alis deflexis ferrugineis: angulo inferiori affinis.  
puncto gemino nigro, posticis nigris.

*Noctua affinis* Wien. Verz. 88. 11.

Habitat in Europae Populo.

*Larua* subnuda albo virescens lineis alternis clare vel obscure viridibus: punctis eleuatis nigris piliferis, stigmatibus superne arcu nigro.

*Variat* pallide virens atomis albis nigrisque.

*triptera.* 208. *N. cristata* alis deflexis: maculis tribus longitudinalibus rotundatis atomisque sulphureis adspersis.

*margi-* 209. *N. cristata*, alis deflexis flavescentibus: strigis fer-  
*nata.* ruginosis, postice fuscis.

*Absinthii.* 210. *N. cristata* alis deflexis canis: fasciis punctisque in tetragenum positis nigris.

*Noctua Absinthii* Wien. Verz. 73. 1.

*Abrotani* 211. *N. cristata* alis deflexis fusco cinereis: strigis vndatis nigris, costa punctis quatuor albis.

*Noctua Abrotani* Wien. Verz. 73. 2.

Roef. Inf. 3. tab. 51. *Larua.*

Habitat in Artemisia Abrotano Dom. Schieffermyller.

Statura N. Absinthii. Antennae ferrugineae. Thorax cinereus margine antico albido striga tenuissima nigra. Alae anticae cinereo fuscoque variae strigis vndatis nigris. Maculae ordinariae in medio. Puncta quatuor alba in margine crassiori. Posticae cinereae nitidulae.

*Larua* viridis ferrugineo maculata: tuberculis dorsali-  
bus conceis.

*occulta.* 212. *N. cristata* alis deflexis nebulosis apice cinereis: ma-  
culis tribus nigris.

*Phalaena occulta* spirilinguis cristata, alis deflexis fu-  
sco nebulosis, inferioribus breuioribus: margine al-  
bis. Linn. Syst. Nat. 2. 849. 247. In Sv. 1203. ?

Habitat in Svecia Dom. de Paykull.

Magna. Thorax cristatus linea laterali strigaque an-  
tica abbreviata nigris. Alae anticae basi cinereae in  
medio nebulosae striga postica vndata alba, postice  
cinereae maculis tribus nigris striga albida adiacente  
maiori anuli. Posticae fuscae marginé albido.

*Alni.* 213. *N. cristata* alis deflexis fuliginosis: areis duabus ci-  
nerascentibus: priore puncto marginali nigro.

*Noctua degener* Wien. Verz. 70. 4.

214. N.

214. N. cristata, alis deflexis purpurascensibus: fasciis *Delphinii*.  
duabus albidis, posticis obscuris.

*Noctua Delphinii* Wien. Verz. 87. 8.

215. N. cristata, alis deflexis purpurascensibus basi flavis. *purpuri-*  
*Noctua purpurina* Wien. Verz. 88. 9. *-na.*

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Affinis *N. Delphinii* at distincta. Alae anticae basi fla-  
uescentes apice purpureae striga vna alteraue. Po-  
sticae fuscae.

216. N. cristata alis deflexis fuso variis: strigis duabus *geogra-*  
postice coeuntibus niueis, apice striatis. *phica.*

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

*Parua.* Thorax cinereus punctis duobus albis. Alae  
anticae fuscescentes basi macula albida. In medio  
strigae duae dentatae ad marginem tenuiorem coeun-  
tes niueae. Margo posticus albo striatus.

217. N. cristata alis deflexis nigro substriatis fuso *cine-* *Hyperici:*  
reoque variis: macula baseos oblonga albida.

*Noctua Hyperici* Wien. Verz. 76. 10.

Habitat in Austriae Hyperico Mus. Dom. Schieffermyller.

*Antennae nigrae.* Thorax pallidus strigis duabus ab-  
breuiatis nigris. Abdomen fuscum. Alae anticae  
variegatae macula magna oblonga alba interne linea  
nigra terminata. In medio maculae ordinariae po-  
stica maiori veniformi. Margo albo nigroque stria-  
tus. Posticae fuscae nitidulae. Pedes albo annulati.

*Larua violacea:* dorso lineis tribus albis interruptis.

218. N. cristata, alis deflexis exusto striatis postice bis *perspicil-*  
bidentatis: macula ordinaria solitaria veniformi. *laris.*

*Phalaena perspicillaris* Linn. Syst. Nat. 2. 849. 148. In  
Sv. 1198.

*Noctua perspicillaris* Wien. Verz. 76. 11.

Clerk. Icon. tab. 2. fig. 3.

Habitat in Europae Astragalo, Acere, Pruno;

Margo alae inferior parum purpurascit.

*Larua subpubescens* scabra, viridis: linea dorsali al-  
ba, lateralibus tenuioribus punctisque albis sparsis.

219. N. cristata, alis deflexis fuso cinereis apice albo ni- *Linariae:*  
groque striatis: maculis ordinariis niueis.

*Noctua Linariae* Wien. Verz. 73. 6.

Habitat in Antirrhino Linaria Dom. Schieffermyller.

*Parua.* Caput antice albidum. Thorax griseus marginē antico albo striga parua nigra. Alae fusco cinereoque variae, apice albo nigroque striatae striis albis terminantibus. In medio maculae ordinariae niueae annulo paruo atro cinctae. Posticae pallidae margine fuscō.

*Larua linea* dorsali flava lateralibusque striis albis nigrisque, capite cinereo nigro punctato.

*Pisi.* 220. N. cristata, alis deflexis ferrugineis bimaculatis: striga postica vndata pallida.

*Noctua Pisi* Wien. Verz. 83. 14.

*mendica.* 221. N. cristata, alis deflexis pallida incarnatis: macula media fusca, stigmatibus flavis.

*Oxyd-*  
*canthe.* 222. N. cristata, alis deflexis bimaculatis: margine tenuiore coerulescente: lunula alba.

*Noctua Oxyacanthe* Wien. Verz. 70. 3.

*brunnea.* 223. N. cristata, alis deflexis fuscis: macula media transversa flava, marginē brunneo.

*Noctua brunnea* Wien. Verz. 83. 15.

Habitat in Piso arvensi Mus. Dom. Schieffermyller.

*Media.* Corpus subtus brunneum. Thorax fuscus. Abdomen supra cinereum. Alae anticae fuscae maculis aliquot in primis marginis exterioris fuscis. In medio loco maculae ordinariae posticae macula transversa flava. Margo alae ipse brunneus. Posticae fuscae margine brunneo.

*Larua nuda brunnea* albo maculata lineaque lateralī coerulescente, capite nigro: lineis duabus albīs.

*culta.* 224. N. cristata alis deflexis vndatis fuscescentibus: punctis duobus albīs; anteriore duplicata, thoracis marginib⁹ albīs.

*Noctua culta* Wien. Verz. 70. 4.

Habitat in Pyro sylvestri Dom. Schieffermyller.

*Media* palpi subtus albi. Antennae ferrugineae. Caput niueum striga punctisque atris. Thorax fuscus margine antico lateralibusque albīs parum nigro maculatis. Abdomen cinereum. Alae anticae fuscae albo nigroque parum albidae nigro punctatae. In medio maculae due magnae ordinariae, anteriore duplicata. Margo posticus albo fuscoque varius. Posticae albae

albae litura ani nigricante. Tibiae anticae albae nigro punctatae tarsis nigris albo annulatis.

*Larua obscure variegata*: lineis vtrinque duabus vndatis nigris, aro quadridentato.

225. N. cristata alis deflexis fusca nigro vndatis: fascia *compta*. media lata alba.

*Noctua compta* Wien. Verz. 70. 5.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Praecedentibus minor. Capit et thorax fusco alboque varia. Abdomen cinereum. Alae anticae fuscae, nigro vndatae basi parum albicant. Fascia lata in medio et striga postica fere obsoleta albis. Posticae fuscae basi pallidiores. Tarsi nigri albo annulati.

226. N. cristata alis deflexis fusco viridique variis: lituris duabus albis, thoracis crista dupliqui.

*Noctua prasina* Wien. Verz. 82. 11.

Habitat in Cochlearia Armoracia Dom. Schieffermyller.

Magna. Alae fuscae nigro parum vndatae viridique variae. Liturae duae magnae, altera ad basin, altera pone medium. Posticae fuscae ciliis albis, subtus puncto strigaque vndata nigris.

*Larua sub violacea*: dorso nigro maculato stigmatibus albis, capite fusco.

227. N. cristata alis deflexis: anticis fusco nebulosis: litura inedia flava bifida.

*Atriplicis*

228. N. cristata, alis deflexis basi cinereis: macula magna sinuata nigra.

*sinuata*.

229. N. cristata alis deflexis variegatis, posticis albis: *histrionica*. striga marginali nigra.

230. N. cristata, alis deflexis cinereis bimaculatis: posticis fascia rufa abbreviata.

*Noctua praecox* Wien. Verz. 82. 12. vix differre videatur, at tota virescens,

231. N. cristata alis fusca: strigis tribus vndatis flavescentibus repandis, posticis ferrugineis.

*pyramidea*.

*Noctua pyramidea* Wien. Verz. 71. 1.

232. N. cristata, alis deflexis obscure cinereis: strigis vndatis maculisque ordinariis flavescentibus.

*lucipeta*.

*Noctua lucipeta* Wien. Verz. 71. 2.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

**Magna.** Caput et thorax hirta, obscure cinerea, immaculata. Alae obscure cinereae strigis punctisque vndatis flavescentibus. In medio maculae ordinariae, altera orbiculata, altera veniformi.

**pyrophila** 233. N. cristata alis cinereis lunulis maculisque fuscis, posticis fuscis nitidulis.

*Noctua pyrophila* Wien. Verz. 71. 4.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

**Praecedente minor.** Corpus cinereum thorace striga interrupta fusca. Alae cinereae strigis tribus lunularum fuscuarum. Maculae ordinariae fere obsoletae. Margo posticus nigro punctatus. Alae posticae fuscæ nitidae, supra immaculatae, subtus pallidiores lunula strigaque fuscis.

**typica.** 234. N. cristata, alis deflexis fuscis: strigatis marginatis strigisque pallidis reticulatis.

**lucipara.** 235. N. cristata, alis deflexis cinereo nitidis: fascia media lata fusca.

**oleracea.** 236. N. cristata alis deflexis: anticis ferrugineis: lunula latecente strigaque alba: postice bidentata.

*Phalaena dissimilis* Knoch. Beytr. 57. 12. tab. 4. fig. 1 - 4.

*Noctua oleracea* Wien. Verz. 83. 19.

Conf. *Noctua suasa* Wien. Verz. 83. 18. vix distincta.

**xanto-grapha.** 237. N. cristata alis deflexis testaceis: maculis ordinariis flavis.

*Noctua xantographa* Wien. Verz. 83. 26.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Statura omnino praecedentis at paullo minor. Caput thorax, alae anticae obscure testaceae maculis ordinariis flavescentibus, postice striga punctorum nigrorum. Posticae vti et abdomen cinereae.

**leucomelas.** 238. N. cristata, alis deflexis atris: posticis basi niueis.

*Noctua leucomelas* Wien. Verz. 90. 6.

**conuergens.** 239. N. cristata alis deflexis subdentatis griseo fuscis apice cinereis: angulo ani macula fulua.

*Noctua conuergens* Wien. Verz. 84. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Alae anticae ultra medium fusco griseoque variae basi lineola atra. In medio maculae ordinariae, posteriore

riori veniformi lunula obsoleta alba, apice cinereae macula anuli ferruginea punctisque marginalibus nigris.

*Larua coerulescens* lineis punctisque albis, capite brunneo.

240. N. cristata alis deflexis dentatis nigris atro vndatis apice cinerascentibus, posticis basi maculisque duabus marginalibus albis. *alchymista*.

*Noctua alchymista* Wien. Verz. 89. 5.

Habitat in Austria Dom. Saldoner.

Afinis N. leucomelas at paullo maior. Corpus atrum dorso cristato. Alae nigrae strigis quatuor vndatis atris apice striga cinerascente, quae versus angulum ani maculam format. Posticae nigrae macula magna baseos duabusque minoribus marginalibus albis. Subtus omnes nigrae posticis basi albis puncto nigro.

241. N. cristata, alis deflexis fuscis: fascia grisea apice *riuularis*; bifida flavo marginata.

*Noctua Cucubali* Wien. Verz. 84. 5.

*Noctua triangularis* cristata, alis deflexis fuscis triangulo fasciaque dentata flavo marginatis Thunb. nou. sp. 3. fig.

Habitat in Europae Cucubalo.

*Larua nuda* glabra virescenti cinereoque varia: punctis obscurioribus.

Conf. *Noctua capsincola* Wien. Verz. 84. 6. vix differt.

242. N. cristata alis deflexis albidis: fascia lata fusca vtrinque flavo maculata. *serena*.

*Noctua perlata* Wien. Verz. 84. 4.

Habitat in Austria Doin. Schieffermyller.

*Parua:* Corpus albidum atomis fuscis. Alae anticae basi albae punctis aliquot nigris, in medio fuscae, qui color utrinque striga vndata flauescente terminatur maculis ordinariis albidis, apice albae striga nigra fuscaque. Costa albo nigroque punctata.

243. N. cristata alis deflexis nigris: margine tenuiori anguloque ani obscure cinereis.

*Phalaena Pinastri* alis deflexis nigris: margine dorsali *Pinastri*: posticeque pallidis. Linn. Syst. Nat. 2. 851. 160. In Sv. 1188.

*Noctua Pinastri* Wien. Verz. 82. 1.

Clerk. Icon. tab. i. fig. 8.

Habitat in Europae pratis graminosis.

Magnitudo et statura N. riicularis. Caput nigrum antennis fuscis. Thorax niger crista longitudinali, compressa, obscure cinerea. Alae anticae nigrae maculis ordinariis obsoletis, margine tenuiori anguloque ani late cinereis subtus cinereae.

*Ligustri.* 244. N. cristata, alis deflexis fusco virescentique variis nigro subundatis: macula magna postica albida.

Noctua Ligustri Wien. Verz. 70. 1.

Habitat in Austriae Ligistro Dom. Schieffermyller.

Paullo minor N. aprilina. Thorax albo nigroque varius. Alae anticae obscurae, variegatae. In medio macula ordinaria annula albo cincta. Versus apicem macula magna alba. Margo ipse albo variegatus, nigro punctatus.

Larua pilosa viridis flavo lineata.

*strigilis.* 245. N. cristata, alis deflexis nebulosis; denticulis setaceis intra fasciam albam terminalem.

Phalaena strigilis Linn Syst. Nat. 2. 851. 161. In Sv. 1199. Clerk. Icon. tab. 9. fig. 6.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Parua. Alae basi litura alba.

*runica.* 246. N. cristata, alis deflexis: anticis virentibus; maculis variis atris, postice vtrinque punctis trigonis.

Noctua runica Wien. Verz. 70. 5.

Phalaena aprilina Linn. Syst. Nat. 2. 847. 138.

Larua solitaria, glabra, cinerea: quadris fuscis.

Puppa brunnea.

Imaginis thorax arcubus duobus nigris. Margo alae punctis trigonis in duplice serie.

*apriliina.* 247. N. cristata, alis deflexis viridibus: maculis fascia que atris apice punctorū trigonum serie vnicā.

Noctua apriliina Wien. Verz. 70. 6.

Phalaena aprilina Linn. In Sv. 1178.

Habitat in Quercu Dom. Schieffermyller.

Difserit sane a praecedente. Minor Thorax anticē niger postice virescentis. Alae pone medium fascia nigra et pone hanc series vnicā punctorum nigrorum.

Larua pilosa supra fuscescens: fasciis ferrugineis maculisque albis.

248. N. cristata, alis deflexis anticis viridibus; lunula me- *virens*.  
dia alba, posticis albis immaculatis.

*Noctua virens* Wien. Verz. 85. 8.

*Phalaena virens* Linn. Syst. Nat. 2. 847. 129.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Margo alae anticae albidus.

249. N. cristata alis deflexis: anticis abdomineque trifaria nigro punctato flauis. *tudifica*.

Habitat in Salice.

*Larua taberculata*, pilosa coeruleo flauoquo lineata:  
collo caudaque albo maculatis.

*Puppa folliculata nigra*: angulis rubris.

250. N. cristata alis deflexis albo fuscoque variis apice nigro striatis: stigmatibus subocellatis; posteriori veniformi.

Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

Media. Antennae fuscae. Thorax cristatus strigis fere indistinctis albis fuscisque alternis. Alae anticae albo fuscoque variae, versus apicem striis septem abbreviatis atris et in medio stigmata ordinaria annulo atro cincta, anteriori orbiculato, posteriori veniformi. Alae posticae nigrantes margine albo.

251. N. cristata alis deflexis cinereis nigro vndatis: maculis duabus fuscis.

*Noctua perla* Wien. Verz. 70. 3.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Afinis videtur N. Algae. Alae anticae supra obscure cinereae strigis vndatis nigris. In medio maculae duae magnae fuscae. Posticae albidae puncto centrali fuso.

252. N. cristata alis deflexis: anticis viridibus: maculis *Lichenes*. variis atris subtus fuscis.

*Noctua glandifera* Wien. Verz. 70. 2.

253. N. cristata alis deflexis: anticis fuscis; fasciis duabus *Algae*. viridibus.

254. N. cristata, alis deflexis cinereis: maculis atris trifidis, posticis albidis. *tridens*.

*Noctua tridens* Wien. Verz. 67. 1.

Habitat in Austriae Pruno Armeniaco Dom. Schieffermyller.

- Nimis affinis N. Psi at larua diuersissima.  
*Larua nigra*: lateribus rubro punctatis lineaque dorsali sulphurea, tuberculo conico porrecto.
- Psi.* 255. N. cristata alis deflexis cinereis: anticis lineola baseos characteribusque nigris, pedibus immaculatis.  
*Noctua Psi* Wien. Verz. 67. 2.
- auricorna* 256. N. cristata alis deflexis: anticis cinereo fuscis: strigis characteribusque nigris, pedibus apice albo annulatis,  
*Noctua auricoma* Wien. Verz. 67. 6.  
 Habitat in Austriae Rubo caesio Dom. Schieffermyller.  
 Nimis affinis N. Psi at omnia obscuriora. Alae posticae albidiioris. Pedes albidi apice fisci albo annulati.  
*Larua pilosa* atra verrucis fuluis, pilis capitis caudaeque albis, dorsi aureis.
- Lamda.* 257. N. cristata, alis deflexis fusco cinereis: lineola baseos duabusque in medio atris.  
 Habitat in Germania Dom. Schneider.  
 Statura et magnitudo omnino N. Psi. Caput et thorax obscure cinerea, valde cristata. Alae anticae obscure cinereae, nitidae fascia baseos mediique obsoletis obscurioribus. Lineola atra ad basin, duaeque in medio: interiori longiori.
- Chi.* 258. N. cristata, alis deflexis canis: anticis  $\chi$  nigro notatis.  
*Noctua Chi* Wien. Verz. 72. 3.
- Aceris.* 259. N. cristata alis deflexis canis nigro vndatis, abdome subtus basi brunneo.  
*Noctua Aceris* Wien. Verz. 67. 7.  
*Phalaena Aceris* Linn. Syst. Nat. 2. 846. 137. In Sv. 1179.  
 Wilks pap. 52. tab. 2. c. 6.  
 Reaum. Ins. 1. tab. 34. fig. II.  
 Frish. Ins. 1. tab. 5.  
 Habitat in Acere, Aesculo.  
*Larua hirsuta*: fasciculis flavis rubrisque, dorso albo nigro maculato.
- Euphorbiae.* 260. N. cristata alis deflexis fusco vndatis: maculis ordinariis; anteriore orbiculata, posteriori veniformi albidis.  
*Noctua Euphorbiae* Wien. Verz. 67. 4.  
 Habitat in Austriae Euphorbia Dom. Schieffermyller.

Rustica media. Caput et thorax hirta cinerea. Alae cinereae striga baseos breuissima, altera ante medium vndata, tertia pone medium incurva. In medio pallidiores maculis ordinariis distinctis annulo fuscō cinētis. Margo fusco punctatus.

*Larua pilosa virescens*: maculis dorsalibus atris, colari lunula ferruginea.

261. N. cristata, alis deflexis cinereis nigro vndatis: m-  
eula vnica orbiculata albida. *megacephala*.

*Noctua megacephala* Wien. Verz. 67. 5.

Habitat in Salice Mus. Dom. Schieffermyller.

Rustica media affinis N. Euphorbiae. Antennae nigrae.  
Caput et thorax hirta, cinerea. Abdomen albidum.  
Alae anticae obscure cinereae strigis variis vndatis  
nigris. In medio macula ordinaria vnica. Margo  
fuscō punctatus. Posticae albae subtus puncto cen-  
trali fuscō.

*Larua pilosa fusca ferrugineo maculata*, capite corpo-  
re latiore segmentoque postico macula sulphurea.

262. N. cristata, alis deflexis canis: litura media atra; litura.  
puncto albo.

- *Noctua litura* Wien. Verz. 77. 2.

Habitat in Europae Salice, Pruno.

*Larua nuda viridis*: linea dorsali pallida, laterali al-  
bo flavoque varia, capite pallido.

263. N. cristata, alis deflexis cinereis apice obscurioribus *pistacina*,  
vndatis, posticis fuscis.

*Noctua pistacina* Wien. Verz. 77. 1.

Habitat in Centaurea Scabiosa Mus. Dom. Schieffer-  
myller.

Rustica media. Corpus griseum. Alae cinereae striae-  
tae, basi parum pallidiores punctis nigris, apice ob-  
scurores striga vndata pallida posteriorique e pun-  
ctis nigris.

*Larua nuda scabra viridis*: punctis lineaque lateralī  
albis.

264. N. cristata alis deflexis ferrugineis: puncto paruo *Baja*,  
baseos geminatoque apicis nigris.

*Noctua Baja* Wien. Verz. 77. 3.

Habitat in Atropa Belladonna Mus. Dom. Schieffer-  
myller.

Rustica media. Palpi ferruginei apice pallidi. Thorax ferrugineus. Abdomen cinereum. Alae anticae ferrugineae puncto baseos distincto atro, in medio paullo obscuriores maculis ordinariis et apice versus marginem exteriorem puncta duo approximata atra. Posticae fuscae ciliis ferrugineis.

*Larua cinereo fuscoque varia: linea tribus dorsalibus albis, laterali flavescente.*

*rubricosa* 265. N. cristata, alis deflexis fuscescentibus: costa alba fusco maculata, apice fusca: punctis albis.

*Noctua rubricosa* Wien. Verz. 77. 4.

Habitat in Kumice acuta Dom. Schieffermyller.

Media. Caput et thorax hirta, flavescentia. Alae anticae flavescentes, cinereo vndatae margine tenuiori baseos rufescente. Costa ultra medium albida maculis tribus nigris apice fusca punctis paruis duobus albis. Subtus obscurae.

*Larua grisea: linea dorsali pallida segmentoque singulo punctis duobus albis.*

266. N. cristata alis deflexis ferrugineis cinereo fuscoque vndatis: macula posteriori nigro punctata, capite rufa.

*Noctua erythrocephala* Wien. Verz. 77. 5.

Habitat in Plantagine Dom. Schieffermyller.

Caput rufescens. Thorax suberistatus, fuscus. Alae rufescentes cinereo fuscoque vndatae. Costa baseos cinerea. In medio maculae ordinariae, quarum posterior punctis aliquot marginalibus atris. Posticae fuscae margine ciliato cinereo. Subtus anticae limbo cinereo, posticae cinereae puncto strigaque vndata fusca.

*polygona*. 267. N. cristata, alis deflexis subundatis extus fuso nigroque variis, intus pallidis, thorace variegato.

*Noctua polygona* Wien. Verz. 78. 16.

Habitat in Plantagine Dom. Schieffermyller.

Magna. Thorax fuso ferrugineoque varius postice linea utrinque obliqua, atra. Alae anticae subundatae ferrugineo fuscoque variae maculis ordinariis, intus cinereae fusco vndatae. Costa punctata. Posticae albidae.

*Larua nuda viridis: linea laterali albida stigmatibusque fuluis.*

268. N. cristata alis deflexis fusco nebulosis: stigmate ye. *Perfica-*  
niformi albo; pupilla lunari flava. *riae.*

*Noctua Perficariae* Wien. Verz. 71. 8.

*Larua nuda viridis*: linea dorsali alba segmento quar-  
to et quinto macula obscuriori, cauda conica.

269. N. cristata alis deflexis obscure cinereis nitidulis: *simulans*.  
strigis vndatis fuscis; posteriore punctata.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Media. Caput et thorax obscura abdomine pallidiore.

Alae anticae cinereae nitidae strigis vndatis obse-  
rioribus marginali punctata. Posticae fuscae, ni-  
tidulae.

270. N. cristata alis deflexis: anticis fuscis: punctis ni- *Tragopo-*  
gris tribus approximatis, posticis liuidis. *ginis.*

*Noctua Tragopoginis* Wien. Verz. 85. 14.

271. N. cristata, alis deflexis obscure griseis: macula fu- *hepatica.*  
sea punctisque tribus costalibus albis.

*Noctua hepatica* Wien. Verz. 83. 16.

272. N. cristata alis deflexis heluolis: strigis duabus obli. *Acetosel-*  
quis cinereis, posticis fuscescentibus; margine lae.  
brunneo.

*Noctua Acetosellae* Wien. Verz. 84. 1.

Habitat in Rumice Acetosella Dom. Schieffernyller.

Antennae rufescentes. Caput et thorax heluola. Alae  
anticae heluolae strigis duabus postice conuergenti-  
bus cinereis. Inter strigas has maculae ordinariae.  
Posticae fuscae margine brunneo.

*Larua nuda* dorso fulvo striis duabus longitudinalibus  
fuscis, lateribus rufescientibus, capite rufo: lineis  
duabus purpureis atro punctatis.

273. N. cristata alis deflexis flauescientibus: strigis duabus *turca.*  
fuscis lunulaque lutea.

*Noctua turca* Wien. Verz. 84. 2.

Habitat in Junco piloso.

Margo alarum purpureus.

*Larua rufo ochracea*: linea dorsali albida subtus luteo  
albida, incisuris lineolis nigris, lateraliter obscuriore,  
capite fuso.

274. N. cristata alis deflexis flauescientibus: strigis duabus *conigera.*  
fuscis punctoque medio albo trigono.

*Noctua conigera* Wien. Verz. 84. 3.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Minor N. turca. Antennae flavescentes. Alae anticae flavescentes striga baseos recurva, in medio punctum trigonum album, postice striga obliqua, posticæ obscuræ.

*Larua grisea* albo nigroque lineata, capite fuscō, segmento primo atro: lineis tribus albis.

*albipuncta*. 275. N. cristata alis deflexis cinereis: lunula media alba, strigisque duabus lunularum fuscarum.

*Noctua albipuncta* Wien. Verz. 84. 4.

Habitat in Plantagine maiori Dom. Schieffermyller.

Corpus cinereum. Alae anticae cinereæ, interdum parum rufescentes strigis duabus e lunulis interruptis fuscis. Inter has strigas lunula albida.

*Larua grisea* albo lineata nigroque punctata: primo segmento fuscō: lineis tribus albis.

*polyodon*. 276. N. cristata, alis deflexis dentatis nebulosis: striga postica dentata alba.

*Noctua polyodon* Wien. Verz. 72. 1.

Habitat in Europæ Betula alba.

*Larua fusca*: lateribus pallidis; lineolis obliquis nigris.

*flavicincta*. 277. N. cristata, alis dentatis deflexis fuscō cinereoque variis fulvo punctatis.

*Noctua flavicincta* Wien. Verz. 72. 2.

Roes. Ins. 1. pap. 2. tab. 54. 55.

Habitat in Pruno Ceraso Dom. Schieffermyller.

Minor N. polyodon. Caput cinereum basi parum fuluum. Thorax cinereus atomis fuscis fuluisque. Alae anticae fuscō cinereoque variegatae punctis sparsis fuluis. Costa albo punctata. Posticæ cinereæ supra striga, subtus puncto strigaque fuscis.

*Larua viridis*: linea laterali pallida.

*eremita*. 278. N. cristata alis deflexis ferrugineis: strigis duabus vndatis albis; anteriore obsoleta, posteriore repanda.

*nigricans* 279. N. cristata, alis deflexis nigricantibus: stigmatibus ordinariis pallidioribus.

*Noctua nigricans* Wien. Verz. 81. 19.

Habitat in Cichorio Intybo.

*Larua nuda* cinereo fusca nigro punctata: linea dorsali pallidiore.

280. N. cristata; alis deflexis subdentatis cinereis: fascia *perflua*.  
lata atra; puncto ocellari.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Magna. Caput et thorax fuscum. Alae anticae subdentatae cinerascentes. Fascia in medio lata vtrinque dentata atra, et in hac punctum paruum nigrum annulo cinereo cinctum. Margo posticus obscurior lumen fuscis. Posticae fuscae.

281. N. cristata, alis deflexis nigricantibus: striga postica *fumosa*, punctorum alborum.

*Noctua sumosa* Wien. Verz. 81. 18.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Nimis N. nigricans affinis. Differt tantum striga postica punctorum cuspidatorum alborum. Corpus totum nigricans.

282. N. cristata alis deflexis fusco nitidulis: fascia media *aurita*. repanda cinerea, capite bi-, thorace quadridentato.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Statura et magnitudo omnino B. strigulae at omnino huius generis. Caput cinereo hirtum, denticulis duabus erectis e fasciculis pilorum. Thorax itidem quatuor eleuatis validis. Alae fusco nitidulae, in medio fascia lata repanda cinerea apice albo nigroque striatae.

283. N. cristata alis deflexis fusco ferrugineoque variis: *oculea*. stigmate veniformi pallido.

284. N. cristata alis deflexis: anticis cinereis; strigis tribus atris antennis luteis. *flauicornis*.

*Noctua flauicornis* Wien. Verz. 72. 6.

*Larua nuda virescens*: punctis lateralibus albis, capite carneo.

285. N. cristata alis deflexis fuscis: strigis tribus vndatis *caluaria*. cinereis maculaque media testacea.

*Noctua caluaria* Wien. Verz. Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus griseum. Palpi magni reflexi fere Pyralidum. Alae anticae obscurae fuscae strigis tribus vndatis maculisque duabus marginalibus albidis. In medio inter strigas punctum paruum maculaque posterior magna fulua, et in hac puncta duo parua nigra. Posticae fuscae, subtus albo vndatae.

*triplacia*. 286. N. cristata alis deflexis: anticis arcu duplice contrario maculisque tribus glaucis intermediis.

*Noctua triplacia* Wien. Verz. 91. 1.

Conf. *Noctua Asclepiades* Wien. Verz. 91. 2. vix differt at larva nuda pallida nigro punctata: linea laterali flava.

*trifinis*. 287. N. cristata alis deflexis cinereis fusco subundatis marginique exteriori punctato, subtus pallidis: fascia fusca.

*Rumicis*. 288. N. cristata alis deflexis cinereo fuscoque variis: litora marginis tenuioris alba.

*ridens*. 289. N. cristata alis deflexis viridi fusco alboque variis macula baseos strigisque duabus vndatis albis, antennis flavescentibus.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Statura et magnitudo N. Rumicis. Caput et thorax virescentia albo irrorata. Antennae flavescentes. Abdomen pallidum. Alae viridi fusco alboque variae macula magna distincta alba baseos ad marginem extriorem, quae strigam vndatam albam attingit. Pone maculas ordinarias striga altera vndata alba. Versus apicem strigae lineolis albis lunulisque atris.

*exoleta*. 290. N. cristata, alis lanceolatis conuolutis fusco cinereoque nebulosis: punctis quatuor marginalibus albis.

*Noctua exoleta* Wien. Verz. 75. 1.

*Verbasci*. 291. N. cristata alis deflexis dentato erosis: margine laterali fusco immaculato, Wien. Verz. 73. 4.

*Asteris*. 292. N. cristata alis integris striatis cinereis: marginibus nigris; exteriore punctis tribus nigris.

*Noctua Asteris* Wien. Verz. 312. 10.

Habitat in Astere chinensi Dom. Schieffermyller.

Statura et magnitudo omnino N. Verbasci at alae integræ. Antennæ supra albae, subtus ferrugineæ.

Alae in medio pallidae lateribus fuscis. In costa punctaria alba, in margine tenuiori lunula alba. Posticeae fuscae disco ciliisque albis.

*Chamomillæ*. 293. N. cristata alis lanceolatis striatis canis: punctis duobus centralibus minutissimis nigris, subtus immaculatis.

*Noctua Chamomillæ* Wien. Verz. 73. 3.

Habi-

Habitat in Chamomilla flores exedens Dom. Schieffermyller.

Nimis affinis N. vmbiatricae vix distinguenda, at larua diuersissima. Antennae ferrugineae. Caput fuscum strigis cinereis. Thorax hirtus cinereus striga antica marginali nigra. Abdomen griseum basi fasciculis aliquot dorsalibus. Alae anticæ supra striatae, canæ in medio punctis duobus hirsutissimis costaque punctis tribus cinereis. Subtus cinereæ punctis tribus costalibus albis. Posticæ striatae, cinereæ ciliis albis, subtus immaculatae lunula parua centrali fusca.

*Larua* nuda cinerea vtrinque lineolis duabus incuruis ferrugineis in singulo segmento. Iunior flauo alboque maculata.

294. N. cristata alis lanceolatis striatis canis: lineolis duabus atris, posticis albis subtus immaculatis. *Tanaceti.*

*Noctua Tanaceti* Wien. Verz. 73. 5.

Habitat in *Tanaceti vulgaris* floribus Dom. Schieffermyller.

Affinis N. Chamomillæ. Antennæ ferrugineæ basialbidae. Caput cinereum. Thorax cinereus striga antica fusca. Abdomen basi albidum. Alae anticæ striatae, canæ lineola a basi fere ad medium ducta, et alia in medio brevior, apice parum flexa. Puncta tria costalia. Subtus obscuræ nitidae. Posticæ albae supra margine nigricante, subtus immaculatae.

*Larua* nuda cinerascens nigro punctata flauoque linea-  
ta similis *laruae* N. *Verbasci*.

295. N. cristata alis anticis striatis lanceolatis canis fusco *Lactucae*. obsoleto vndatis, subtus fuscis, posticis disco albo.

*Noctua Lactucae* Wien. Verz. 76. 7.

Habitat in *Lactuca sativa* Dom. Schieffermyller.

Summa affinitas N. vmbiatricae. Striga antica thoracis interrupta. Alae striatae vndis aliquot fuscis at absque punctis centralibus costalibusque. Subtus fuscae basi margineque pallidae punctis tribus costalibus albidioribus. Posticæ fuscae disco albicante.

*Larua* atra annulis lateralibus albis lineaque dorsali maculari fulua, capite atro: linea antica bifida alba.

- vibrati-* 296. N. cristata, alis striatis lanceolatis canis: macula centrali ferruginea; punctis duobus nigris.  
*Noctua lucifuga* Wien. Verz. 312. 11. vix differt.  
 Alae subtus fuscae, posticis limbo albido.
- lacaea.* 297. N. cristata, alis deflexis niueis nitidis immaculatis.  
 Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.  
 Statura omnino N. vibraticeae at duplo minor. Antennae, caput, thorax alba, immaculata. Alae omnes niueae, nitidae omnino immaculatae.
- putris.* 298. N. cristata alis deflexis obsoletis subpunctatis: margine exteriori fuso; adiecta macula subocellari.  
*Noctua putris* Wien. Verz. 75. 4.  
 Habitat in Europae graminibus.  
*Larua nuda* nigro punctata flavo albido fuscescenti striata, capite nigro.
- lithoxy- laea.* 299. N. cristata alis deflexis dentatis cinereis fusco maculatis: margine postico fuso.  
*Noctua lithoxyla* Wien. Verz. 75. 2.  
 Habitat in Pyro Mui. Dom. Schieffermyller.  
 Media. Corpus cinereum. Thorax linea dorsali brunea. Alae anticae dentatae cinereae maculis punctisque obsoletis fuscis. Margo posticus tenuissime fuscus. Subtus cinereae margine tenuiori nitido. Posticae cinereae margine postico fuso, subtus immaculatae.
- petrifica- ta.* 300. N. cristata alis dentatis griseo fuscoque nebulosis, posticis fusiis, capite antice quadrifido.  
*Noctua petrificata* Wien. Verz. 75. 3.  
 Habitat in Austriae Quercu Dom. Schieffermyller.  
 Statura et magnitudo N. lithoxyleae. Antennae fuscae. Caput antiæ dentibus quatuor distinctis. Thoracis crista itidem bifida. Alae anticae dentatae cinereo fuscoque variae maculis ordinariis pallidis.  
*Larua nuda* viridis; linea dorsali candida lineolisque albis sparsis, stigmatibus niueis annulo nigro cinctis, capite viridi.
- rhizoli- tha.* 301. N. cristata alis subdentatis cinereis: lineola baseos intermediaque atris, thoracis crista bifida.  
*Noctua rhizolitha* Wien. Verz. 75. 6.  
 Habitat in Quercu Mus. Dom. Schieffermyller.

Magnitudo praecedentis. Caput cinereum transuersē bifidum. Thorax hirtus, cinereus lunula marginali antica nigra. Crista erecta, bifida. Alae griseae lineola baseos distincta atra, in medio lunulae linea laque nigrae, apice puncta nigra. Posticae supra fuscae, subtus cinereae puncto medio strigaque postica fuscis.

*Larua* subpilosa viridis albo irrorata: linea dorsali coerulecente.

302. N. cristata alis dentatis griseis: lineolis duabus atris, conformis abdome subtus brunneo.

*Noctua conformis* Wien. Verz. 76. 7.

Habitat in Betula alba Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Antennae nigricantes. Caput et thorax hirta fusca. Abdomen hirtum, imprimis subtus brunneum. Alae anticae griseo vix vndatae. In medio alae lineolae duae vtrinque bifidae, exteriori adnata macula rufescens. Posticae obscurae. Subtus omnes cinereae rufo nitentes puncto medio strigaque postica fuscis.

303. N. cristata alis dentatis cinereis: lineola baseos nigra: adiacente tenuiori albae. comma

*Phalaena comma* Linn. Syst. Nat. 2. 850. 156; In Sv. 1191.

*Noctua comma* Wien. Verz. 76. 9.

Habitat in Europa.

Alae posticae supra albidae margine fusco.

304. N. cristata alis deflexis dentatis cinereo fuscoque variis, thoracis crista bifida.

*Noctua aduena* Wien. Verz. 77. 11.

Habitat in Betula alba Dom. Schieffermyller.

Magna cinereo fuscoque varia postice striga abbreviata nigra. In medio maculae ordinariae. Posticae fuscae. Thoracis crista elevata, bifida quasi canaliculata.

305. N. cristata alis deflexis fusco griseis vndatis: lineola basilinea: baseos atra, thoracis crista bifida.

*Noctua basilinea* Wien. Verz. 78. 72.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Color variat ferrugineis griseisque, distincta lineola parua flexuosa atra bascos. Antennae albidae.

- radicea.* 306. N. cristata alis deflexis dentatis variegatis: striga postica dentata alba; thoracis crista elevata bifida.  
*Nolua radicea* Wien. Verz. 81. 15.  
 Habitat in graminum radicibus Dom. Schieffermyller.  
 Magna. Antennae fuscae. Caput et thorax ferruginea striga antica atra. Alae anticae dentatae, variegatae lineola atra baseos. In medio marginis tenuioris litura alba lineola atra, apice striga valde dentata albida. Posticæ basi albidae apice fuscae. Subtus apice rufescentes.  
*Larua nuda cinerea:* maculis elevatis capite caudaque atris.
- rurea.* 307. N. cristata alis deflexis griseo fuscoque variis, posticis fuscis: margine crassiori albo.
- Myrtilli.* 308. N. cristata alis deflexis ferrugineis albo maculatis, posticis luteis: fascia lata nigra submarginali.
- Arbuti.* 309. N. cristata, alis deflexis fuscis, posticis nigris fascia flava.

154. PHALAENA. *Palpi cylindrici.*

*Lingua* porrecta, membranacea.

*Antennae* filiformes.

\* *Antennis pectinatis.*

- lactearia.* 1. P. bipectinicornis, alis angulatis niveis immaculatis, antennis apice setaceis. Wien. Verz. 98. 9.
- nivearia.* 2. P. pectinicornis alis subangulatis albis: margine posticis anticisque subtus fuscis, posticis puncto centrali nigro.
- vernaria.* 3. P. pectinicornis alis angulatis virescentibus: strigis duabus albis repandis, antennis apice setaceis.  
*Phalaena vernaria* Wien. Verz. 97. 3.
- bupleuraria.* 4. P. pectinicornis alis dentatis viridibus: striga sesquialtera alba, margine fuscopunctato.  
*Phalaena bupleuraria* Wien. Verz. 97. 4.  
*Phalaena sesquistriata* Knoch. Beytr. I. tab. I. fig. I.  
 Habitat in Austriae Bupleuro Dom. Schieffermyller.

Statura omnino praecedentis. Alae valde dentatae, vi-  
rides anticis strigis duabus, posticis vnicā albīs. Mar-  
go posticus fuscō punctatus.

5. P. pectinicornis alis angulatis dentatis viridibus: stri- *thyminia*  
ga vndulata obsoleta alba sesquialtera. *ria.*  
Wien. Verz. 97. 5.  
Schaeff. Icon. 202. fig. 1.  
*Larua obscura maculis dorsalibus carneis, capite col-*  
larique bidentatis.  
*Puppa tenuissime folliculata brunnea linea nigra antice*  
acuminata, postice bifida.
6. P. pectinicornis alis angulatis albīs: strigis duabus can- *putataria*  
didis repandis, antennis apice setaceis.  
Wien. Verz. 98. 10.
7. P. pectinicornis, alis angulatis albidis: strigis duabus *friataria*  
flauescētibus obsoletis.
8. P. pectinicornis alis angulatis albidis: fascia saturatiore *margari-*  
striga alba terminata. *taria.*  
*Phalaena margaritaria* Wien. Verz. 95. 1.  
*Phalaena margaritata* Linn. Syst. Nat. 2. 865. 231.  
Habitat in Germaniae Carpino Betulo.  
Fascia saturatiōr alae anticae vtrinque, posticae tan-  
tum postice striga alba terminata.  
*Larua elongata, 12. poda, variegata: ultimo segmento*  
punctis duobus albīs, cauda bifida.
9. P. pectinicornis, alis angulatis cinereis: striga ferru- *pundaria*  
ginea ordineque punctorum nigrorum.  
Reaum. Inf. 2. tab. 29. fig. 1 - 4.  
Knoch. Beytr. 1. 13. tab. 1. fig. 4.  
Habitat in Europae Quercu.  
*Larua geometra cinerea maculis lateralibus flavis rubro*  
notatis.  
*Puppa folio alligata supra subcarnea, subtus flauescens.*
10. P. pectinicornis, alis angulatis fuscis: strigis purpu- *Dioraria.*  
reis, apice pallidis.
11. P. pectinicornis, alis angulatis omnibus pallidis pul- *amata-*  
uerulentis: fascia purpureo recta strigaque fusca re- *ria.*  
panda. Schaeff. Icon. tab. 214. fig. 3.

*pennaria*. 12. P. pectinicornis alis subdentatis rufescens: strigis duabus fuscis punctoque apicis albo Linn. Syst. Nat. 2. 861. 209. Wien. Verz. 103. 12.

Habitat in Germaniae Pomona.

Alae anticae rufescentes fasciis duabus punctoque medio fuscis. Pone apicem punctum distinctum album. Posticae rufescentes puncto medio fusco.

*Larua solitaria*, glabra, rufescens.

*falcataria* 13. P. pectinicornis alis fulcatis glaucis: anticis vndis fasciaque griseis; puncto fusco.

*Bombyx falcataria* Wien. Verz. 64. 2.

*Larua dorso virescente fusco punctato*, antice aculeis quatuor paruum, cauda acuminata, subtus viridis linea laterali rubra.

*culturaria*. 14. P. pectinicornis alis subfalcatis luteis: fascia saturatiore, antennis apice setaceis.

*Bombyx sacula* Wien. Verz. 64. 1.

*strigaria*. 15. P. pectinicornis alis angulato caudatis albis: strigis duabus fuscis supra duabus subtus vnicis.

*Phalaena sambucana* Clerk. Icon. tab. 50. fig. 3. 4.

*sambuca*- 16. P. pectinicornis alis caudato angulatis flavescentibus: strigis duabus obscurioribus, posticis apice bipunctatis. Wien. Verz. 103. 1.

*lacertina*- 17. P. pectinicornis alis erosis lutescentibus: strigis duabus fuscis.

*Phalaena erosaria* Wien. Verz. 103. 4.

*equestra*- 18. P. pectinicornis alis angulatis: anticis fuscescentibus; fascia lata flava, posticis flavis.

*alniaria*. 19. P. pectinicornis alis erosis flavis fusco pulueratis: strigis duabus fuscis.

Wien. Verz. 103. 2.

*syringa*- 20. P. pectinicornis alis suberosis: omnibus griseo flavescentibus: strigis repandis fuscis albisque.

Wien. Verz. 103. 8.

*lunaria*. 21. P. pectinicornis alis angulato dentatis basi rufis: lunula alba, postice cinereis.

*dentaria*. 22. P. pectinicornis alis angulato dentatis supra pallidis: strigis ferrugineis, subtus ferrugineis: lunula obscuriori.

23. P. pectinicornis alis dentatis griseis: atomis strigis- *roboraria-*  
que numerosis fuscis.
- Phalaena roboraria* Wien. Verz. 101. I.  
Habitat in Quercu Mus. Dom. Schieffermyller.  
Magna tota grisea atomis strigisque vndatis fuscis. Sub-  
tus alae albidae lunulis fuscis.
- Larua* griseo fusca: linea dorsali arcubusque singuli  
guii segmenti obscurioribus.
24. P. pectinicornis alis dentatis griseis fuscō strigosis: *conforta-*  
posticis puncto oblongo ocelari albido. *ria.*  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Statura omnino praecedentis paullo minor grisea ato-  
mis strigisque fuscis distincta puncto oblongo albo  
annulo fuscō cincto in medio alae posticae. Subtus  
omnes griseae puncto medio strigaque fuscis.
25. P. bipectinicornis, alis dentatis albis fuscō vndatis, *vndaria.*  
antennis apice setaceis.
26. P. pectinicornis alis angulatis flavis: strigis ferrugi- *dolabra-*  
neis: angulo ani violaceo. *ria.*  
Wien. Verz. 104. 16.
27. P. pectinicornis, alis angulatis viridibus: anticis stri- *ilyraria.*  
gis tribus fuscis.
28. P. pectinicornis alis dentatis viridibus: striga puncto- *monilaria*  
rum nigrorum, posticis puncto duplici alba.
29. P. pectinicornis alis rotundatis albis: margine fuscō; *feruida-*  
striga vndata alba. *ria.*  
Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.  
Magna. Antennae pectinatae, nigrae. Corpus flave-  
scens thorace postice albo. Alae hirtae albae margi-  
ne postico fuscō striga vsde vndata alba. Costa alae  
anticae nigra albo maculata. Subtus onines albae  
margine fuscō.
30. P. pectinicornis, alis anticis griseis: posticis fer- *rondela-*  
rugineis. *ria.*
31. P. pectinicornis, alis rotundatis flauescitibus: stri- *vibicaria.*  
gis tribus purpureis; anteriore obsoletiore.  
Wien. Verz. 117. 2.
32. P. pectinicornis, alis rotundatis flauescitibus: stri- *flauaria.*  
gis duabus repandis fuscis.

Habi.

Habitat in India orientali Dom. Vahl.

Maior. Corpus flauum fronte fulua. Alae omnes flauentes in medio strigis duabus fuscis repandis. Pone strigas maculae due paruae fuscae. Subtus concolores.

*papilionaria*. 33. P. pectinicornis alis viridibus subrepandis: striga squalteria repanda.

Wien. Verz. 196. I.

*macularia*. 34. P. pectinicornis alis fuluis apice nigris: fascia maculari alba.

*Phalaena Helcita* Drury Ins. 3. tab. 29. fig. 4.

*catenaria*. 35. P. pectinicornis, alis rotundatis albis: lunula media strigaque postica vndata nigris.

*flabellaria*. 36. P. pectinicornis alis rotundatis albis: anticis apice obscurioribus.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.

Media. Corpus albidum antennis valde pectinatis fuscis. Alae omnes rotundatae, albae, anticae fusco venosae apiceque obscuriores, posticae immaculatae.

*prunaria*. 37. P. pectinicornis, alis subdentatis luteis fuscopuluerulentis: anticis lunula fusca. Wien. Verz. 104. 17.

*furcaria*. 38. P. pectinicornis, alis griseo nebulosis: omnibus subtus puncto nigro; lunula alba.

*piniaria*. 39. P. pectinicornis, alis fuscis flavo maculatis subtus nebulosis: fasciis duabus fuscis.

Wien. Verz. 106. 7.

*timbaria*. 40. P. pectinicornis alis ferrugineis: limbo nigro, posticis subtus nigris albo striatis.

*albidaria*. 41. P. pectinicornis, alis rotundatis albis: anticis costa apiceque, posticis macula marginali atris.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.

Media. Antennae pectinatae apice setaceae, atrae. Caput album collari flavo. Thorax albus antice niger. Abdomen basi album apice fuscum. Alae anticae albae margine exteriori et postico lato atris, posticae albae macula apicis atra.

*conspersa*. 42. P. pectinicornis, alis rotundatis cinereis: atomis nuncrosis fuscis.

*Phalaena conspersaria* Wien. Verz. 106. 8.

Habi-

Habitat in Austriae Salviae pratensi Dom. Schieffermyller.  
Statura et magnitudo P. piniariae, tota cinerea atomis  
numerosis fuscis. Interdum punctum medium sub-  
ocellatum, fuscum. *Mas* antennis minus pectina-  
tis albidior.

*Larua* caudata albida, rufo striata, cauda bidentata.

43. P. pectinicornis alis cinereis fusco irroratis: anticus *roraria*.  
puncto medio apice nigris.

*Phalaena plumaria* Wien. Verz. 106. 9.

Habitat in Loto Dorycnio.

*Larua* cinerea, segmentis albis, capite pallido: striis  
duabus fuscis.

44. P. pectinicornis, alis nigro punctatis maculatisque: *melana-*  
anticis albidis posticis flavis. *ria.*

Knoch. Beytr. I. II. 3. tab. 1. fig. 3.

45. P. pectinicornis alis omnibus luteis fusco irroratis. *adspersa-*  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. *ria.*

Statura omnino P. limbareae, at alae omnes supra sub-  
tusque luteae atomis numerosissimis fuscis.

46. P. pectinicornis, alis omnibus lutescentibus: strigis *atomaria*  
atomisque fuscis.

*Phalaena artemisiaria* Fyesh. Arch. 2. tab. 4.

Wien Verz. 105. 5.

Habitat in Centaurea Scabiosa.

Conf. *P. glarearia* ex Lathyro pratensi Wien. Verz.  
106. 6. an satis distincta.

47. P. pectinicornis alis lutescentibus: atomis strigisque *prosapia-*  
tribus fuscis; tertia maculari. *ria.*

48. P. pectinicornis alis anticis cinereis fusco vndatis: fa- *bipuncta-*  
scia media obscuriori; punctis duobus atris. *ria.*

*Phalaena bipunctaria* Wien. Verz. III. 5.

*Phalaena undulata* Scop. carn.

Habitat in Lolio perenni Austriae Dom. Schieffermyller.

Media. Antennae fuscae parum pectinatae apice seta-  
ceae. Alae anticæ cinereae fusco vndatae. In me-  
dio fascia lata obscurior et hac puncta duo atra. Po-  
sticae striga punctorum nigrorum. Posticae cinereae.

49. P. pectinicornis alis viridi cinereoque variis: strigis *Lichena-*  
duabus nigris; anteriore recurva, posteriore vndato *ria.*  
flexuosa.

*Pha-*

*Phalaena Lichenaria* Wien. Verz. 100. 8.

Habitat in Austriae Lichenibus Mus. Dom. Schieffermyller.

*Parua tenera.* Alae anticae cinereae viridi colore in primis in medio mixto. Striga ante medium atra, recurva et altera valde flexuosa vndata versus marginem. Margo ipse nigro punctatus. Posticae griseae striga vndata punctisque marginalibus fuscis.

*Larua scabra* viridis aut cinerea luteo varia: lateribus atro maculatis, pedibus anticis macula atra: puncto viridi.

*Variat color laruae secundum colorem Lichenum.*

*cineraria* 50. P. pectinicornis alis anticis griseis: strigis duabus nigris, posticis cinereis: striga vntica.

*Phalaena cineraria* Wien. Verz. 100. 10.

Habitat in Rysso candelario Dom. Schieffermyller.

Parua, tenera, grisea, margine nigro punctato.

*Larua fusca* dorso cinereo: maculis transuersis albis.

*pufaria.* 51. P. pectinicornis, alis niveis: strigis tribus obsoletis fuscis. Wien. Verz. 107. 4.

*ocularia.* 52. P. pectinicornis alis rotundatis flavis: omnibus puncto ocellari flavo.

*annularia* 53. P. pectinicornis alis cinereis: striga annulo fasciaque fuscis.

*Phalaena omicronaria* Wien. Verz. 107. 3.

Habitat in Acere campestri.

*capreola-*] 54. P. pectinicornis alis griseis: fascia saturatiore; punto medio lineolaque apicis nigris.

*Phalaena capreolaria* Wien. Verz. 105. 2.

Habitat in Pinio Picea Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura P. desfoliariae at minor. Antennae pectinatae fuscae. Alae anticae griseae sive cinereae atomis fuscis. In medio fascia lata postice sinuata, obscurior et in hac punctum nigrum. In apice lineola nigra. Posticae cinereae strigis atomisque fuscis. Subtus omnes cinereae, anticis punto, posticis puncto strigaque punctorum nigrorum.

*murina-* 55. P. pectinicornis alis griseis: strigis duabus puncto que medio fuscis.

*Phalaena murinaria* Wien. Verz. 105. 4.

Habi-

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua, tenera. Corpus griseum. Alae omnes griseae, anticae strigis duabus subundatis punctoque medio fuscis. Posticae punto medio strigaque postica fuscis. Subtus omnes griseae, immaculatae.

56. P. pectinicornis alis griseis: atomis fuscis medio al- *defoliaria* bis: puncto fuso, femina aptera nigro punctata.  
Wien. Verz. 195. 1.

Roef. Ins. 3. tab. 14. ♀

Roef. Ins. 3. tab. 40. fig. B. ♂

57. P. pectinicornis alis cinereis: striga fusca vndata al- *hirfuta-*  
*ria innata* Gen. Ins. Mant. 285.

58. P. pectinicornis alis griseo virescentibus fuscō irorra- *pedaria*.  
tis pedibus albo annulatis, femina aptera.

Habitat in Betula Alno Dom. Hybner.

Obscura. Alae griseae viridi colore nitentes maculis atomisque fuscis. Posticae albidores strigis atomis- que obscurioribus. Pedes omnes grisei albo annulati.

59. P. pectinicornis alis cinereo fuscis: striga vndata ob- *hispida-*  
seuriore, margine albo punctato, antennis flauis. *ria*.  
*Phalaena hispidaria* Wien. Verz. 99. 4.

Habitat in Austria. Mus. Dom. Schieffermyller.

Nimis affinis P. hirtariae at paullo minor. Corpus hir-  
tum griseo fuscum. Antennae flauae. Alae obse-  
rae striga media vndata obscuriore. Margo albo  
punctatus.

60. P. pectinicornis alis hirtis canis: strigis tribus nigris; *hirtaria*.  
posterioris approximatis, antennis atris.

Wien. Verz. 99. 3.

61. P. pectinicornis alis nigris nitidulis: strigis obscurio- *horrida*.  
ribus. Wien. Verz. 100. 7.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Parua. Corpus atrum, immaculatum. Alae omnes ni-  
grae, nitidulae strigis aliquot obscurioribus.

62. P. pectinicornis, alis flavescentibus: strigis duabus, *vesperta*:  
posteriore limbum obscurum distaminante. *ria*.  
*Phalaena parallelaria* Wien. Verz. 104. 15.

63. P. pectinicornis, alis cinereis: anticis fasciis quatuor *Wauaria*  
nigris abbreviatis inaequalibus.

Wien. Verz. 106. 12.

- nivearia*. 64. P. pectinicornis, alis niveis immaculatis, anticis subtus fuscescensibus.  
*Phalaena nivearia* Wien. Verz. 116. 4.  
*Phalaena niveata* Scop. carn.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Media. Antennae fuscae. Alae omnes albae supra immaculatae, subtus anticae fuscescentes.
- pluviaria* 65. P. pectinicornis alis cinereis fuscō irroratis: strigis anticarum duabus, posticarum vnicā fuscis.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Media. Antennae pectinatae rachi pallida. Corpus cinereum. Alae omnes cinereae parum lutescentes. Anticae strigis duabus, posticae vnicā fuscis. Subtus concordes at anticis loco strigae anticae macula oblonga disci.
- prasinaria*. 66. P. pectinicornis alis viridibus: strigis tribus anticis obscurioribus, postica pallida.  
*Phalaena cythifaria* Wien. Verz. 97. 2.  
 Habitat in Germaniae Cytiso.  
*Larua viridis*: linea laterali alba, capite collari caudaque bidentatis.
- smaragdaria*. 67. P. pectinicornis, alis viridibus: anticis strigis duabus punctoque medio albis.  
 Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.  
 Statura praecedentis. Antennae pectinatae fuscescentes. Alae omnes virides, anticis striga baseos e lunulis duabus cohaerentibus alba. In medio punctum album et postice striga vndata alba. Posticae immaculatae. Subtus omnes virescentes striga pallida.
- ditaria*. 68. P. pectinicornis alis viridibus: maculis marginalibus ferrugineis.  
*Phalaena bajularia* Wien. Verz. 97. 6.  
 Habitat in Quercu Germaniae.  
*Larua grisea* foliolis squamisque obtecta.
- viridaria* 69. P. pectinicornis alis rotundatis viridibus albo strigosis maculisque marginalibus atris.
- pagaria*. 70. P. pectinicornis alis rotundatis coeruleo nigris: fascia maculari apicis alba.  
*Phalaena Panthorea* Cram. Inf. 27. tab. 322. fig. C.].  
 Habitat in China Mus. Dom. Banks.

Statura omnino P. tripunctariae. Corpus fuscum coeruleo nitidum. Alae omnes fuscae viridi nitentes postice fascia maculari niuea.

71. P. pectinicornis alis fuscis; anticis basi striatis fasciaque maculari, posticis basi albis. *tripunctaria.*  
 72. P. pectinicornis alis rotundatis fuscis flavo subfasciatis, carbonaria. apice setaceis.

*Phalaena carbonaria* Wien. Verz. 108. 5.

Habitat in Bryo murali Dom. Schieffermyller.

Parua. Antennae pectinatae apice setaceae. Caput et thorax nigra. Alae omnes fuscae strigis vvidatis obscurioribus aliisque flauis, quae ad marginem terminorem macula magna flaua terminantur.

73. P. pectinicornis alis concoloribus nigris: anticis maculis duabus, posticis unica flauis. *Iatropharia.*  
 74. P. pectinicornis alis atris: anticis fascia maculari, posticis punto medio albo. *luctinaria*

*Phalaena luctinaria* Cram. Inf. II. tab. 128. fig. E.  
 Edw. Av. 35. tab. 35.

Habitat in India orientali.

Statura et summa affinitas P. tripunctariae.

75. P. pectinicornis, alis concoloribus nigris: fasciis duabus virescentibus strigaque maculari alba. *Catilina.*  
 76. P. pectinicornis, alis concoloribus albis nigro variis, cenaria. corpore flavo nigro maculato.  
 77. P. pectinicornis alis fusco ferrugineis: strigis tribus lateraria fuscis maculaque costali cinerea.

Habitat in Indiis.

Statura et magnitudo P. moeniariae. Antennae pectinatae, albae. Corpus fuscum. Alae anticeae obscure ferrugineae strigis tribus punctoque medio fuscis. Macula cinerea magna costalis inter secundam tertiamque strigam. Margo posticus cinerascit. Postice obscure ferrugineae. Subtus omnes plumbeae margine postico obscuriore.

78. P. pectinicornis alis rotundatis atris coeruleo striatis fenestra- maculatisque. *ria.*  
 79. P. pectinicornis alis luteis: margine venisque dilata- venaria. tis ramosis nigris.

- moenia-* 80. P. pectinicornis alis anticis cinereis: fascia lata fusca; puncto gemino nigro.  
*Phalaena moeniaria* Wien. Verz. 112. 1.  
*Phalaena moeniata* Scop. carn.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Statura et magnitudo P. chenopodiatae. Corpus cinereum. Alae anticae cinereae fascia lata postice vndenta vtrinque flauo marginata fusca. In medio fascia dilutior punctis duobus approximatis nigris. Apex terminatus lineola fusca. Posticae cinereae.
- obliqua-* 81. P. pectinicornis alis atris: anticis fascia obliqua alba, posticis lata flava.  
 Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.  
 Magna. Antennae pectinatae nigrae rachi coerulea. Corpus nigrum cyaneo subtus maculatum segmentis abdominalibus margine albis. Alae anticae atrae fascia obliqua alba. Posticae atrae fascia lata flava puncto marginis exterioris atro. Subtus concolores at cyaneo inaculatae.
- puluera-* 82. P. pectinicornis alis omnibus testaceo puluerulentis: fascia lata ferruginea.  
*fasciaria.* 83. P. pectinicornis, alis omnibus rufescensibus: fascia lata ferruginea: margine albo.  
*Phalaena fasciaria* Wien. Verz. 96. 2.  
*Phalaena prasinaria* Wien. Verz. 96. 3. vix distincta.  
 Habitat in Europae Pino.  
*Larua* 12 poda, rufa fusco alboque varia, capite rufescente.
- margina-* 84. P. pectinicornis alis albidis puluerulentis: omnibus striga marginali punctorum nigrorum.  
*ria.*
- betularia.* 85. P. pectinicornis alis omnibus albis: atomis nigris, thorace fascia nigra, antennis apice setaceis.  
 Wien. Verz. 99. 2.
- nitidaria* 86. P. pectinicornis alis argenteis: anticis strigis duabus obliquis fuscis.  
 Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.  
 Minor P. betulariae. Corpus album. Antennae parum pectinatae. Alae anticae argenteae, nitidae strigis duabus obliquis fuscis. Posticae immaculatae subtus atomis strigaque postica fuscis.

87. P. pectinicornis alis albis nigro punctatis: fasciis duabus latis fuscis. prodromaria.

*Phalaena prodromaria* Wien. Verz. 99. 1.

Habitat in Germaniae Quercu, Tilia.

Statura omnino P. betulariae. Caput, album antennis nigris albo annulatis. Thorax hirtus albus fasciis duabus abbreviatis nigris. Abdomen griseum. Alae albae nigro punctatae fasciis duabus fuscis nigro marginatis. Mas minor pallidior.

*Larua geometra* mox cinerea, mox fusca, mox ferruginea, capite carneo.

*Puppa* folliculata brunnea sub terra.

88. P. pectinicornis alis flavis; striga obliqua sanguinea. *sacraria*.

89. P. pectinicornis alis griseis: anticis fascia lata obscuriore; puncto medio nigro. *elinguaria*.

Wien. Verz. 103. II.

90. pectinornis alis plumbeis: strigis tribus punctoque medio fuscis. *plumbaria*.

*Phalaena palumbaria* Wien. Verz. 102. 7.

91. P. pectinicornis alis nigricantibus griseo subfasciatis. *lignaria*.

Habitat in Saxoniae ligno putrido Mus. Dom. Romani.

Alae omnes nigricantes strigis numerosis griseis.

*Larua geometra nigra*: lineis quatuor punctorum nigrorum.

92. P. pectinicornis alis luteis: margine anticaruinque purpura-fasciis duabus purpureis, Wien. Verz. 102. 9. *ria*.

*Larua viridis*: dorso fuso; linea pallida.

93. P. pectinornis, alis griseis: striga obliqua alba macula ferruginea. *artesaria*

*Phalaena artesaria* Wien. Verz. 102. 2.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Minor. Alae anticae griseac pone medium striga obliqua albida et pone hanc macula ferruginea strigae contigua. Posticae inmaculatae.

94. P. pectinicornis alis flavissimis: strigis tribus marginaque fuscis. *aureolaria*.

*Phalaena aureolaria* Wien. Verz. 102. 8.

Habitat in Austriae Vicia dumetorum. Dom. Schieffer-myller.

*Parua.* Alae omnes concolores flavae anticis strigis tribus, posticis duabus margineque fuscis.

*Larua tenuis,* glabra, albida dorso obscuriore: linea fusca.

*giluaria.* 95. P. pectinicornis alis anticis flavescentibus: fascia obliqua atomisque fuscis.

*Phalaena giluaria* Wien. Verz. 102. 10.

Habitat in Achillaea Mellefolio Dom. Schieffermyller.

Paullo praecedente maior. Alae anticae flavescentes fascia a medio marginis tenuioris ad apicem ducta posticae albidae.

*Larua obscure cinerea ferrugineo lineata lineaque dorsali albida.*

*fuligina-* 96. P. pectinicornis alis atris albo fasciatis, subtus griseis: *ria.* fasciis fuscis.

*minuta-* 97. P. pectiunicornis alis cinereis: strigis fasciaque postica fuscis.

*pygma-* 98. P. pectinicornis, alis cinereis: basi fusca striga atra terminata.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

*Parua.* Antennae pectinatae. Corpus cinereum. Alae anticae basi fuscae et hic color terminatur striga atra, tunc cinereae striga postica vna alterae fusca, subtus cinereae lunula centrali fusca.

\*\* *Antennis setaceis.*

*politata.* 99. P. seticornis alis angulato caudatis flavis: anticis fasciis duabus punctatis rufis.

*caudata.* 100. P. seticornis alis angulato caudatis albis fusco fasciatis punctisque tribus caudalibus atris.

*fasciata.* 101. P. seticornis alis angulatis plumbeis: fascia nivea.

*Phalaena Eleonora* Cram. Inf. 24. tab. 288. fig. E. F. G.

*angulata.* 102. P. seticornis alis angulato caudatis strigis striolisque griseis punctoque caudali atro.

Habitat in Africa aequinoctiali.

*Parua tenera.* Corpus album. Alae omnes albæ strigis duabus distinctis et praeterea lineolis plurimis transuersis griseis. Alae posticae caudatae puncto magno caudali atro duobusque lateralibus minoribus. Subtus omnes albæ.

103. P. seticornis alis angulatis fusco albo nigro fuluoque *cynata*. variis, posticis subtus albis.

104. P. seticornis alis angulatis supra immaculatis subtus *arenata*. atomis strigisque fuscis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Media. Alae omnes cinereae, obscurae, immaculatae, anticae acuminatae, posticae angulatae, subtus saturatores fusco irroratae strigaque ante medium, dein aliae punctis, demum aliquot vndatae fuscae. In alis anticis strigae omnes abbreviatae.

105. P. seticornis alis angulatis cinereis: anticis litura *regulata*. fuscata.

106. P. seticornis alis falcatis fuluis: punctis duobus fuscis inter strigas luteas.

*Bombyx hamula* Wien. Verz. 64. 4.

107. P. seticornis alis emarginatis griseis: punctis duobus *flexula*. fuscis inter strigas albidas.

*Phalaena sinuata* Sp. Ins. 2. 254. 69.

*Phalaena flexula* Wien. Verz. 64. 3.

*Larua virescens*, collo gibbo clauato, cauda acuminata, capite pedibusque rufescens.

108. P. seticornis alis angulatis fuscis: fascia obscuriore, *mantata*. anticarum puncto ocellato atro.

109. P. seticornis alis angulatis griseo flavoque variis: *liturata*. anticis macula media liturisque costalibus albis.

Habitat in India Dom. Lund.

Statura praecedentium. Corpus subtus album. Alae griseo flavoque variae strigis fuscis. Anticae in medio flavescentes macula magna alba et ad costam liturae aliquot, e quibus postica maior; distinctior strigam obsoletam terminat. Ad marginem posticum macula magna nigricans arcu niveo cincta. Posticae eiusdem coloris at absque macula media costali, in angulum excurrunt. Subtus omnes cinereae puncto centrali nigro.

110. P. seticornis alis angulato dentatis viridibus: posticis macula media alba.

111. P. seticornis alis angulatis viridibus: macula subocellari fulua.

*demandata*. 112. P. seticornis alis subangulatis latescentibus: strigis tribus fuscis punctoque medio atro.

Wien. Verz. 104. 10.

*explanata*. 113. P. seticornis alis dentatis ferruginelis: fascia fusca; puncto nigro.

*rhamnata*. 114. a P. seticornis alis dentatis fusciscentibus: fascia media dentata obscuriore; lunula atra, puncto strigaque fuscis.

*Phalaena rhamnata* Wien. Verz. 109. 2.

Habitat in Austriae Rhamno cathartico Mus. Dom. Schiefermuyller.

Magna. Alae omnes obscurae cinereo valde vndatae in primis basi apiceque. In medio alae anticae lunula parua nigra. Subtus omnes cinereae puncto medio strigaque postica vndata fuscis.

*Larua viridis* linea dorsali fusca, segmentorum marginibus flavis, capite fusco.

*dubitata*. 114. b P. seticornis alis obscuris fusco cinereoque vndatis: nervis albo punctatis.

*Phalaena dubitata* Wien. Verz. 109. 3.

Habitat in Austriae Rhamno cathartico Mus. Dom. Schiefermuyller.

Nimis praecedenti affinis differt tamen alis obscuris fusco pallidoque vndatis nervis albo punctatis. Alae posticae haud concolores ut in praecedente, sed cinereae nervis albo punctatis apice striga pallida nigraque. Subtus cinereae lunula media punctisque nervorum fuscis.

*Larua viridis* fusco pallidoque sublineata: linea laterali flava.

*cinerata*. 115. P. seticornis alis subangulatis cinereis: strigis quatuor fuscis.

*dimidiata*. 116. P. seticornis alis dentatis antice flavis postice fuscis.

*146 irrorata*. 117. P. seticornis alis dentatis flavis fusco irroratis subtus macula fasciaque postica fuscis.

*carinata*. 118. P. seticornis alis dentatis flavo fuscoque variis: striga angulata atra.

*viridata*. 119. P. seticornis alis angulatis omnibus viridibus: striga pallida. Wien. Verz. 97. 7.

Schaeff. Icon. tab. 225. fig. 5.

*Larua carnea*: linea dorsali obscuriore, capite colloque bidentatis.

120. P. seticornis alis dentatis fusco griseis: fascia lata *furuata*.  
dentata obscuriore.

*Phalaena furuata* Wien. Verz. 108. 1.

Habitat in Viburno Lantana Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Antennae intus ferrugineae. Alae omnes dentatae obscure griseae. Ante medium fascia lata; vtrinque dentata obscurior et pone hanc striga obsoleta pallida. Subtus omnes basi obscurae apice pallidiores.

*Larua liuida carneo vndata nigroque punctata postice denticulorum tribus paribus: intermedio minori.*

121. P. seticornis alis dentatis griseis nigro vndatis puncto medio subocellari.

*Phalaena obscurata* Wien. Verz. 108. 3.

Habitat in Rubo Caesio Austriae Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Alae omnes valde dentatae, griseae strigis obsoletis interruptis nigris. In medio punctum subocellatum, album. Subtus cinereae striga vndata apicis nigra.

*Larua fusca albo punctata postice bidentata, capite cinereo.*

122. P. seticornis alis griseis: strigis pallidioribus vndatis obsoletis.

Habitat in Myrtillo Sueciae.

123. P. seticornis alis angulatis pallidis: strigis tribus subfuscis: anticis punctis quatuor approximatis.

*Phalaena notata* Wien. Verz. 104. 1.

Schaeff. Icon. tab. 230. fig. 1.

124. P. seticornis alis subdentatis obscure griseis subtus nitata, pallidioribus: puncto fasciaque fuscis.

125. P. seticornis alis angulatis niueis: anticis macula marginali, posticis strigis quatuor approximatis fuscis.

126. P. seticornis alis angulatis fusco cinereis fulvo variis: macula media fenestrata punctisque costalibus albis.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

*Media.* Corpus cinerascens fuluo irroratum. Alae anticae obscure cinereæ strigis vndatis obscurioribus maculisque in primis ad costam maiori que in medio fuluis, et in hac lunula magna fenestrata. Puncta praeterea quinque niuea in ipsa costa. Posticæ angulatae, obscuræ macula media fulua. Subtus omnes albidae striga vndata margineque postico fuscis.

- fuscata.* 127. P. seticornis alis angulatis fusca: anticis fascia obscuriore; macula ocellari albida.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

*Media.* Palpi elongati apice cylindrici. Alae angulatae fuscae, anticae fascia media lata nigra et in hac macula ocellaris albida, versus apicem alae puncta duo atra. Posticæ fuscae strigis duabus pallidioribus. Subtus omnes fuscae, anticis macula ocellari albida.

- decorata.* 128. P. seticornis alis subangulatis cinereis: anticis fasciis tribus, posticis vnicæ flaviis auro marginatis.

- porata.* 129. P. seticornis alis pallidis rufo puluerulentis: omnibus puncto ocellari albo.

*Phalaena punctaria* Wien. Verz. 107. 2.

*Larua viridis:* lineolis lateralibus punctisque rufis,

- emarginata.* 130. P. seticornis alis subemarginatis pallidis: fasciis duabus griseis punctaque fuso.

*Phalaena lineolata* Wien. Verz. 102. 1.

- bicolora.* 131. P. seticornis alis coerulecentibus striatis: anticis apice atris albo maculatis.

- grossula-* 132. P. seticornis alis albidis; maculis rotundatis nigris: anticis strigis luteis.

Wien. Verz. 114. II.

- vudulata.* 133. P. seticornis alis omnibus strigis confertissimis vndatis fuscis. Wien. Verz. 109. 15.

- hesperata* 134. P. seticornis alis rotundatis concoloribus coerulecentibus: fascia lata alba.

- flavocola-* 135. P. seticornis, alis concoloribus nigris: disco communni flavo crenato.

- populata.* 136. P. seticornis alis flavo pallidis: anticis subfasciatis, apice subtus fuso contaminatis. Wien. Verz. 113. 17.

137. P. seticornis alis flauis: strigis quatuor vndatis fuscis; posteriori maculari. *pyraliata*  
*Phalaena pyraliata* Wien. Verz. 117. 1.  
 Habitat in Austriae Gallio vero Dom. Schieffermyller.  
 Statura omnino P. populatae. Alae anticae flauae strigis quatuor, quarum tres vndatae, quarta vero macularis. Subtus puncto medio, striga postica maculaque apicis fuscis. Posticae supra pallidiores striga fusca, subtus puncto medio strigisque duabus fuscis.
138. P. seticornis alis anticis flavescentibus: fasciis tribus *comitata*. griseis puncto apicisque lineola fusca.  
*Phalaena comitata* Wien. Verz. 112. 3.  
*Phalaena chenopodiata* Wien. Verz. 112. 2. vix. differt.  
*Larua viridi ferrugineoque varia*, capite pallido: lineis duabus fuscis.
139. P. seticornis, alis albidis: fasciis duabus ferrugineo *vilmata*. fuscis: postica maculari.  
*Phalaena pantaria pectinicornis* alis albis: fascia maculari flauicante, abdomine luteo nigro punctato.  
 Linn. Syst. Nat. 2. 863. 218.  
*Phalaena pantaria* Wien. Verz. 115. 12.  
*Phalaena syluata* Scop. carn.
140. P. seticornis, alis albis subtus nigro venosis. *dealbata*.  
*Phalaena dealbata* Wien. Verz. 116. 3.
141. P. seticornis, alis rotundatis fuluis: punctis strigaque postica aureis. *aurata*.
142. P. seticornis, alis griseo fuscis: fasciis duabus pal- *prunata*. lidis repandis; postica semiterminali.  
*Phalaena prunata* Wien. Verz. 113. 19.  
*Larua cinerea*: maculis dorsalibus pedibusque rufis, collari atro.
143. P. seticornis, alis flauissimis: anticis maculis costa: *crataega*- libus tribus ferrugineis; media subargentea. *ta*.  
 Wien. Verz. 104. 13.
144. P. seticornis alis ferrugineo fuscis cinereo substrigo. *aurantia-* sis, posticis aurantiis: puncto centrali fuso. *ta*.  
*Phalaena diversata* Frank. Beytr. 2. 1. 457. tab.  
 Wien. Verz. 315. 14.  
 Habitat in Germania Mus. Dom. Schieffermyller.

Magnitudo et statura P. prunatae. Alae anticae fuscae ferrugineo parum nitentes. Costa cinereo punctata, quae in strigas obsoletas excurrunt. Posticae aurantiae, fusco irroratae puncto medio magno distincto margineque fuscis. Subtus anticae aurantiae atomis punctoque medio fuscis. Posticae atomis numerosioribus strigaque postica fuscis.

*Faemina* pallidior alis magis rotundatis.

*equestra-* 145. P. seticornis alis omnibus nigris, fascia fulua.  
ta. *Phalaena alpinata* Wien. Verz. 115. 14.

*dimidiata* 146. P. seticornis alis atris: anticis fascia fulua, posticis iminaculatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino P. jatrophariae at paullo minor. Antennae setaceae. Alae oinnes atrae; anticis fascia lata fulua, posticis immaculatis.

*lucidata.* 147. P. seticornis alis obscure coeruleis; striga punctorum aureorum.

*margina-* 148. P. seticornis alis omnibus albis: margine exteriori limbo fusco interrupto. Wien. Verz. 114. 10.

*miata.* 149. P. seticornis alis griseis: fasciis tribus viridibus; intermedia latiore fusco vndata.

*Phalaena miata* Wien. Verz. 113. 21.

*rubidata.* 150. P. seticornis alis anticis fuscis: fasciis duabus ferrugineis.

*Phalaena rubidata* Wien. Verz. 113. 22.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Paullo minor P. miatae. Alae anticae basi fuscae tunc fascia lata ferruginea, demum fuscae ad marginem tenuiorem cinerascentes fusco parum vndatae denique fascia altera rufa postice cinereo vndata apice fuscae.

*coerulata.* 151. P. seticornis alis obscure viridibus fusco fasciatis fasciisque duabus coeruleis.

*rufata.* 152. P. seticornis: alis cinereis postice ferrugineis: striga alba punctisque marginalibus nigris.

*Phalaena obliquaria* Wien. Verz. 102.

*spartiata.* 153. P. seticornis, alis oblongis fuscis: vitta albida, posticis cinereis.

*Phalaena spartiata* Fyesl. Arch. 2. tab. 5.

Habi-

Habitat in Germaniae Spartio Mus. Dom. Romani.  
Distincta alis obliquis longioribus fuscis: vitta pallida,  
postice praeterea striga albida.

*Larua viridis* aut flava: linea laterali alba.  
*Puppa* brunnea.

154. P. seticornis alis anticis cinereis: fasciis tribus fuscis; *Berberata*  
posteriori nigro vndata.

*Phalaena berberata* Wien. Verz. 113. 23.

Habitat in Austriae Berberis vulgari Dom. Schieffermyller.

Media. Alae anticae cinereae fasciis duabus ante medium fuscis. Pone medium tertia magis obsoletanigro vndata. Ala apice terminatur lineola nigra.  
Posticae cinereae.

*Larua scabra* fusco rufo alboque variegata.

155. P. seticornis, alis omnibus nigricantibus: fascia laterali alba immaculata. *albicilla*  
ta.

Wien. Verz. 114. 8.

Knoch. Beytr. 1. 40. 1. tab. 2. fig. 8.

Habitat in Europae Rubo Idaeo.

*Larua viridis* segmentis anticis posticisque linea laterali, intermediis lunula dorsali brunneis.

*Puppa* nuda, fusca.

156. P. seticornis alis omnibus albis immaculatis. *illibata*.

*Phalaena illibata* Wien. Verz. 116. 5.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Minor P. albicillatae. Alae omnes albae immaculatae.

157. P. seticornis, alis omnibus nigris albo maculatis; fasciis duabus albis nigro punctatis hastato dentatis. *hastata*.

Wien. Verz. 113. 25.

158. P. seticornis alis omnibus nigris albo subundatis: fasciis duabus albis immaculatis. *tristata*.

Wien. Verz. 113. 26.

159. P. seticornis, alis omnibus flavescentibus: lineis nigris decussatis. *clathrata*

Schaeff. Icoñ. tab. 216. fig. 2. 3.

Wien. Verz. 107. 6.

160. P. seticornis alis omnibus fusco cinereis: lineis strigisque albis diuersatis. *diuersata*

*Phalaena diuersata* Wien. Verz. 107. 7.

Habi-

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Statura omnino P. clathratae. Differt tamen manifeste  
 alis omnibus concoloribus fusco cinereis lineis baseos  
 strigisque apicis albis.

*grisata.* 161. P. feticornis alis griseis: anticis striga fascia puncto-  
 que fuscis.

*fusca.* 162. P. feticornis alis rotundatis nigris: striga ferruginea,  
 anticis margine crassiori cinereo.

*cinerea.* 163. P. feticornis alis griseo cinereis immaculatis.

*Phalaena griseata* Wien. Verz. 116. 2.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Alae omnes griseae immaculatae. Statura et magnitu-  
 do P. chaerophyllatae.

*chaero-  
 phyllata.* 164. P. feticornis atra, alis erectis: anticis apice albis.  
 Wien. Verz. 116. 1. *Atrata, lineata* Fn. IV, 1274.

*procellata* 165. P. feticornis alis anticis albis: fasciis tribus fuscis;  
 media dimidiata, postica marginali: macula alba.

*Phalaena procellata* Wien. Verz. 114. 1.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Alae anticae albae fasciis tribus altera baseos,  
 media dimidiata et tertia marginali fuscis. Costa fe-  
 re tota fusca. Striga vndata maculaque magna albae  
 in fascia marginali. Posticae albae margine fusco.  
 Caput et thorax fusca. Abdomen albidum.

*fluctuata.* 166. P. feticornis alis cinerascentibus: anticis fasciis tribus  
 abbreviatis fuscis. Wien. Verz. 114. 1.

*reticulata* 167. P. feticornis alis anticis fuscis albo reticulatis,

*Phalaena reticulata* Wien. Verz. 114. 3.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magnitudo P. fluctuatae. Alae anticae fuscae strigis li-  
 neisque variis albis reticulatae. Posticae obscure ci-  
 nereae apice strigis albidis.

*bilineata.* 168. P. feticornis alis luteis testaceo vndatis: fascia repa-  
 da, margine fusco alboque.

*Phalaena bilineata* Wien. Verz. 110. 12.

Habitat in Lichnide dicica.

*Larua virescens* subimmaculata, interdum albo subli-  
 neata.

169. P. seticornis alis albis: anticis maculis duabus costalibus fuscis; *bimaculata*.  
*Phalaena torninata* Wien. Verz. 116. 6.
170. P. seticornis alis niueis: fasciis duabus ferrugineis; rubiginosa posteriori dimidiata: puncto subocellari atro. *nata*.  
*Phalaena rubiginata* Wien. Verz. 114. 5.  
*Phalaena Astroemeriana* Sulz. Ins. tab. 23. fig. 5.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Fascia altera baseos, altera in medio. Margo posticus fuscus striga alba.
171. P. seticornis alis albidis: macula costali fusca; lunula atra. *centaureata*.  
*Phalaena centaureata* Wien. Verz. 114. 7.  
 Habitat in Centaureae Seabiosae floribus Dom. Schieffermyller.  
 Parua. Alae anticae albae atomis aliquot fuscis. In medio costae macula magna fusca et in hac lunula atra. Posticae albae puncto medio nigro.  
*Larua viridis* rubro maculata.
172. P. seticornis alis anticae albidis: fasciis duabus fuscis; *adustata*; posteriore repanda cinereo vndata.  
*Phalaena adustata* Wien. Verz. 114. 9.  
 Habitat in Austriae Euonymo Europaeo Dom. Schieffermyller.  
 Media. Fascia altera baseos, altera fere marginalis.  
*Larua viridis*: macula marginali alba rubro punctata.
173. P. seticornis alis omnibus viridibus: strigis duabus *volutata*. albis..
174. P. seticornis, alis plumbeis: fascia lata fusca flavo *fimbriata* marginata.  
*Phalaena deriuata* Wien. Verz. 113. 24.  
 Habitat in Germaniae Rosa.  
*Larua viridis* flavo annulata: macula collari oblonga ferruginea.  
*Puppa viridis* antice ferruginea.
175. P. seticornis alis griseo fuscis: fascia lata nigra; puncto subocellari atro. *quadrisciata*. Wien. Verz. 112. 6.
176. P. seticornis alis anticae cinereis: fasciis duabus ferrugineis; posteriore nigro marginata. *propugnata*.  
*Phalaena propugnata* Wien. Verz. 112. 7.

Habi-

- Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Statura et magnitudo P. quadrifasciatae. Alae anticae  
 cinereae fascia parua baseos ferruginea. In inedio  
 fascia latior, quae vtrinque nigro marginata. Po-  
 sticae cinereae apice fusco vndatae.
- fuluata.* 177. P. seticornis alis anticis griseis: fascia media sinuata  
 rufescente.  
 Habitat Svecia Dom. de Paykull.  
 Statura praecedentium. Alae anticae obscure griseae  
 litura baseos fasciaque media rufescensibus. Posti-  
 cae cinereae.
- ocellata.* 178. P. seticornis alis albidis: fascia lata fusca: puncto  
 subocellari atro.  
*Phalaena montanata* Wien. Verz. 113. 14.  
 Habitat in Gallio sylvatico.  
 Fascia alae integra in medio pallidior puncto atro.  
*Larua* fusca lineolis lateralibus albis.
- lynceata.* 179. P. seticornis alis rotundatis albis: fasciis duabus pun-  
 ctoque apicis fuscis.
- ruficata.* 180. P. seticornis alis albidis: anticis fascia lata fusca, omni-  
 busque puncto centrali nigro.  
*Phalaena ruficata* Wien. Verz. 113. 15.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Affinis praecedentibus at triplo minor. Alae anticae  
 albidae fascia media lata fusca et in hac punctum  
 atrum. Posticae albidae puncto medio atro.
- riuulata.* 181. P. seticornis alis albidis: fasciis duabus nigris poste-  
 riori terminali.
- mellinata* 182. P. seticornis alis flavo testaceis: fascia media obsole-  
 ta obscuriore.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Media. Alae fere unicolorles testaceae parum flavescentes. In medio fascia fere obsoleta marginibus obscu-  
 rioribus. Posticae pallidiores.
- ianata.* 183. P. seticornis alis cinereis: posticis supra fuscis: fa-  
 scia punctisque tribus albis.
- brumata.* 184. P. seticornis alis flavescentibus; striga nigra postice  
 pallidioribus, femina aptera nigro punctata.  
 Wien. Verz. 109. 9.  
*Larua viridis* pallido sublineata.

185. P. seticornis alis anticis ferrugineo cinereoque fascia- *linariata*: tis: medio fascia lata apice maculis fuscis.

*Phalaena linariata* Wien. Verz. 113. 10.

Habitat in Antitrbino Linaria Mus. Dom. Schieffermyller.

Minuta. Alae anticae basi cinereae fascia lata ferruginea, in medio fascia lata fusca puncto centrali atro, tunc fascia ferruginea cinereae iuncta et in hac maculae duea fuscae. Posticæ fusco cinereoque variae.

*Larua* flava maculis dorsalibus pedibusque rubris.

186. P. seticornis, alis rotundatis viridibus: margine fer- *exspec-*  
ruginoso. *etata*.

187. P. seticornis alis anticis testaceis: fasciis tribus gri- *cheno-*  
seis; puncto prominulo apicisque lineola supra fusca. *podiata*

*Phalaena mensuraria* Wien. Verz. III. 2.

188. P. seticornis alis ferrugineo fuscoque variis: fascia *centum-*  
media grisea C atro notata. *notata*.

*Phalaena russata* Wien. Verz. 113. 15.

189. P. seticornis alis fusco griseoque variis: posticis al- *hexapte-*  
bis basi duplicatis. *rata*.

*Phalaena hexapterata* Wien. Verz. 109. 10.

Habitat in Fago sylvatica Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Alae anticae griseae fusco vndatae in primis basi apiceque, in medio parum dilutiores lunula fu- scæ. Posticæ albae ad basin ala notha, rotundata, alba, immaculata. Subtus omnes cinereae puncto medio fusco.

190. P. seticornis alis griseis: fasciis duabus trilineatis *duplicata* fuscis.

*Phalaena plagiata seticornis*, alis canis: fasciis tribus trilineatis nigricantibus repandis. Linn. Syst. Nat. 2. 869. 248. In Sv. 1271.

*Phalaena plagiata* Wien. Verz. III. 4.

Schaeff. Icon. tab. 12. fig. 1. 2.

Clerk. Icon. tab. 6. fig. 1.

Habitat in Europæ Hyperico.

*Larua* fusco ferrugineoque varia: linea laterali flave- scente.

191. P. seticornis alis fuscis postice strigis vndatis flavis. *lunulata*.

- alchemil-* 192. P. seticornis, alis fuscescens: anticis vndatis, fascia nivea cinereo vndata lineolaque intra apicem.  
Wien. Verz. 112. 8.
- psittacata* 193. P. seticornis alis anticis viridibus nigro vndatis: fasciis duabus cinereo ferrugineoque variis.  
*Phalaena psittacata* Wien. Verz. 112. 8.  
Habitat in Austriae Tilia Dom. Schieffermyller.  
Statura omnino P. alchemillatae. Alae anticae virides nigro vndatae. Ante medium fascia lata albo ferrugineoque varia et pone medium altera itidem albo ferrugineoque varia. Posticae fuscae, subtus cinereae puncto strigisque fuscis.
- tuttuata*. 194. P. seticornis alis anticis fusco virescentibus: fasciis duabus albis punctoque centrali nigro.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Statura praecedentium. Alae anticae fusco virescentes fascia ante medium sordide alba in medio punctum nigrum, in medio fascia altera alba vndata fusco strigosa. Posticae cinereae puncto centrali strigisque fuscis.
- rettan-* 194. P. seticornis, alis viridibus fusco subfasciatis.  
*gulata*. Wien. Verz. 112. 9.  
*Larua* pallide viridis: linea dorsali obscure purpurea.  
Habitat in Europae Pyro Malo.
- succentu-* 196. P. seticornis alis albido: puncto nigro limboque ob-  
*riata*. scuriore. Wien. Verz. 110. 24.
- ferrugata* 197. P. seticornis alis purpurascens: cinereo vndulatis postice macula didyma fusca Wien. Verz. 113. 11.  
Habitat in Alsine media.  
*Larua* grisea: linea laterali fusca.  
Conf. *Phalaena spadicearia* Wien. Verz. 113. 12. vix differt.
- maculata* 198. P. seticornis alis flavis nigro maculatis.  
Wien. Verz. 115. 13.
- cribrata*. 199. P. seticornis alis flavis nigro punctatis: punctis baseos subocellatis.
- auersata*. 200. P. seticornis alis pallidis: striga baseos fascia media punctoque fuscis. Linn. Syst. Nat. 2. 869. 251. In Sv. 12. 86. Clerk. phal. tab. 5. fig. 7. Wien. Verz. 117. 3.

Habi-

Habitat in Europa.

Fascia in medio omnis alae. Margo parum nigro punctatus.

201. P. seticornis alis omnibus cinereis: strigis nigris fasciaque postica fusca; striga moniliformis cinerea. *moniliata*

*Phalaena moniliata* Wien. Verz. 117. 10.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua. Alae omnes cinereae strigis anticae quatuor posticae tribus nigris. Inter ultimas strigas fascia obsoleta obscurior striga moniliformi cinerea. Margo ipse nigro punctatus.

202. P. seticornis alis fusco cinereis immaculatis.

*Phalaena euphorbiata* Wien. Verz. 116. 9.

*euphorbiata*.

Habitat in Austriae Euphorbia Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua alis immaculatis mox obscurioribus mox pallidioribus.

203. P. seticornis, alis griseis: fascia striga punctisque laeuigata marginalibus fuscis.

*Phalaena laeuigata* Wien. Verz. 117. 10.

*Phalaena laeuigata* Scop. Ent. carn.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller,

Minuta.

204. P. seticornis alis rotundatis niveis: anticis punto punctata, medio fusco margineque nigro punctato.

*Phalaena temerata* Wien. Verz. 116. 7.

205. P. seticornis, alis canis: strigis nigris fasciisque undatis albidis subanastomosantibus.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua. Alae anticae canae striga baseos incurva atra, ante medium fascia angulata albido nigro undata, in medio striga atra, tunc fascia albida dentibus cum striga nigra cincta. Margo nigro striatus.

206. P. seticornis alis omniibus griseo undatis: punto centrali fusco margineque nigro punctato.

*Phalaena strigilata* Wien. Verz. 117. 4.

207. P. seticornis alis flauissimis: fascia lata fusca retrofusca sum dentem exferente, sociata.

*Phalaena fuluata* Wien. Verz. 112. 4.

- sagittata*. 208. P. seticornis alis fuscescentibus: fasciis duabus atris  
albo marginatis, posteriori dentem exserente.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Statura et magnitudo P.-sociatae. Alae anticae fuscae  
ferrugineo mixtae. Fascia baseos parua atra albo  
marginata et in medio atera maior itidem atro albo  
marginata, quae retrorsum dentem validum exserit.  
Posticae cinereae striga pallidiore.
- luteata*. 209. P. seticornis alis pallide flauis ferrugineo fasciatis  
punctoque medio fuluo.  
*Phalaena luteata* Wien. Verz. 110. 18.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Statura P. rubricatae. Alae omnes pallide flauae fasciis  
plurimis vndatis ferrugineis. In medio alae anticae  
punctum fuluum.
- centrata*. 210. P. seticornis alis flauescensibus fusco vndatis: anti-  
cis puncto centrali nigro.  
*Phalaena remutata* Linn. Syst. Nat. 2. 872. 266.  
*Phalaena remutata* Wien. Verz. 117. 5.  
Habitat in Vieia, sepium.
- cinerata*. 211. P. seticornis alis cinereis: puncto centrali margineque  
postico vndato nigris.  
*Phalaena decorata* Wien. Verz. 117. 13.
- ornata*. 212. P. seticornis, alis niueis: puncto medio margineque  
postico vndato fuscis.  
*Phalaena ornata* Wien. Verz. 117. 14.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Numis P. cineratae affinis at alae magis niueae et margo  
posticus minus niger.
- purpu-  
rata*. 213. P. seticornis alis virescentibus: anticis fasciis duabus  
purpleis.  
*Noctua aenea* Wien. Verz. 85. 6.  
Schaeff. Icon. tab. 205. fig. 4.5.
- rubricata* 214. P. seticornis, alis purpurascensibus: strigis vndatis  
fuscis.  
*Phalaena rubricata* Wien. Verz. 110. 19.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Parua. Alae omnes purpurascentes strigis quatuor fu-  
scis, quarta pallidiore. Subtus concolores at striga  
baseos deest.

215. P. seticornis alis flavescentibus: strigis numerosis ob- ochreata.  
scerioribus.

*Phalaena ochreata* Wien. Verz. 110. 20.

Habitat in Festuca duriuscula Austriae Dom. Schieffermyller.

Parua. Alae omnes flavescentes strigis vndatis obscurioribus. Subtus concolores at obscuriores.

216. P. seticornis alis fuluis: strigis vndatis fusco ferruginineis. corrigata

217. P. seticornis alis omnibus fusco virescentibus: strigis immorata  
vndatis albis.

*Phalaena immorata* seticornis alis omnibus lutescentibus: fasciis obsoletis albidis marginisque striga nigricante. Linn. Syst. Nat. 2. 871. 265. In Sv. 1290.

*Phalaena immorata* Wien. Verz. 107. 8.

Habitat in Lonicera Caprifolio Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae omnes fusco virescentes strigis quatuor albis ultima  
valde vndata.

*Larua fusca* linea dorsali rufescente, laterali coerulecente.

218. P. seticornis alis albidis: fascia baseos lunula media extre-  
maculaque postica nigris. mata.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Minuta. Alae anticae albidae fascia baseos lata nigra  
albo vndata. In medio lunula nigra et versus apice  
macula magna fusca.

219. P. seticornis alis cinereis: puncto medio fasciaque scutata.  
postica punctorum ocellatorum fuscis.

*Phalaena scutata* Wien. Verz. 117. 12.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Alae omnes cinereae basi subimmaculatae in me-  
dio puncto fusco. Postice striga vndata fusca, cui  
adhaerent puncta subocellata. Margo nigro punctatus.

220. P. seticornis alis omnibus niveis: strigis vndatis ob- immutata  
scerioribus; margine postico nigro punctato.

*Phalaena candidata* Wien. Verz. 110. 23.

221. P. seticornis alis albis obscurius vndatis: puncto me- offeata.  
dio nigro, anticis costa ferruginea.

*Phalaena offeata* Wien. Verz. 110. 22.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Corpus cinereum thorace antice ferrugineo.  
Alae omnes pallidae apice strigis vndatis obscurioribus et in medio punctum nigrum. Costa alae anticae ferruginea.

*albulata.* 222. P. seticornis alis anticis niueis: strigis vndatis obscurioribus.

*Phalaena albulata* Wien. Verz. 109. 12.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Affinis P. immutatae sed distincta alis posticis anticis haud concoloribus sed albis immaculatis. Subtus anticae obscurae, posticae albae puncto strigis obscurioribus.

*nassata.* 223. P. seticornis alis anticis fuscis: fascia media vndata niuea; striga fusca.

*Phalaena nassata* Wien. Verz. 109. 13.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Alae anticae fuscae, in medio fascia lata alba, et in hac striga parua fusca. Posticae cinereae, subtus albidae margine fusco.

*pusillata.* 224. P. seticornis alis fuscis cinereo subundatis: lunula media atra.

*Phalaena pusillata* Wien. Verz. 110. 26.

Habitat in Austriae Iunipero Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Alae anticae fuscae vndis numerosis cinereis. In medio lunula magna atra. Subtus omnes fuscae.

*Larua viridis pallido lineata.*

*Puppa viridis.*

*nitata.* 225. P. seticornis alis ferrugineo fuluis immaculatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parua tenera tota ferrugineo fulua, immaculata.

*variegata.* 226. P. seticornis alis omnibus purpureis: maculis marginique flavis.

*Phalaena auroralis* Wien. Verz. 124. 39.

*diaphanata.* 227. P. seticornis alis hyalino albis nigro punctatis, apice strigis fuluis abbreviatis.

*cingulata* 228. P. seticornis alis omnibus fuscis: striga niuea.

*Phalaena cingulata* Wien. Verz. 123. 31.

*niueata.* 229. P. seticornis, alis striatis niueis immaculatis.

230. P. seticornis, alis niueis: anticis costa ferruginea. *costata.*  
 231. P. seticornis, alis concoloribus rufis: margine nigro albo punctato. *sticticata.*  
 232. P. seticornis cinea, capite thoracis alarumque mar. *capitata.*  
 gine basi ferrugineis.  
 233. P. seticornis cyaneo nigra albo maculata. *aestuata.*  
 234. P. seticornis alis apice flavis: anticis strigis duabus argenteis, posticis macula quadruplici nigra. *argenteata.*  
 235. P. seticornis, alis atris albo maculatis, ano rufo. *melata.*  
 236. P. seticornis alis flavis: maculis marginaque postico fuscis ferrugineis. *sulphurata.*

Habitat Cajennae.

237. P. seticornis alis flavescentibus: in margine exteriori sinuata. posticoque purpureis sinuatis.  
 238. P. seticornis alis anticis fusco purpurascens: incola magna flava, posticis flavescentibus. *violata.*

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Statura omnino praecedentium. Alae anticae fuscae purpureo colore nitidulae in primis versus marginem posticum. Macula magna marginis tenuioris flava strigis tribus nigricantibus costaque flavescentes. Alae posticae flavescentes strigis duabus fuscis posteriore abbreviata. Subtus subconcolores at multo pallidiores. Caput et thorax fusca. Abdomen flavescentes ano nigro punctis tribus albis apice fulvo. Subtus niuea.

239. P. seticornis alis albis fusco fasciato maculatis, thorace anoque flavis. *vrticata.*

*Phalaena vrticalis* Wien. Verz. 121. 12.

240. P. seticornis alis anticis fusco nitidis: fasciis albo perspicillatis ab domine argenteo: punctis duobus baseos catata. atris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura P. vrticatae. Corpus omnino argenteum punctis duobus atris ad basin abdominalis. Alae concolores. Anticae fusco nitidae basi fasciis tribus, medio fascia obliqua lineaque antice bifida marginis tenuioris apiceque fascia obliqua hyalinis. Posticae albo hyalinae fasciis tribus fuscis.

- funerata*. 241. P. seticornis alis rotundatis atris: anticis maculis duabus, posticis una hyalinis.
- securata*. 242. P. seticornis alis fuscouscentibus: anticis basi cinereis; macula marginis tenuioris atra.  
Habitat in Coromandel Dom. Vahl.
- Statura et magnitudo P. vrticatae. Caput et thorax flava. Abdomen cinereum. Alae anticae basi cinereae macula magna atra ad marginem tenuiorem et poste punctum paruum. Lineolae duae fulvae in medio marginis crassioris, apice fuscae margine postico dilatiori striga punctorum nigrorum. Subtus fuscae. Posticae fuscae, subtus cinereae.
- limbata*. 243. P. seticornis alis rotundatis luteis: puncto ocellari margineque postico fuscis.
- metallata* 244. P. seticornis alis niueis: costa maculaque media aurea.
- repan-data*. 245. P. seticornis alis cinerascentibus, anticis strigis tribus vndatis punctoque medio fuscis.  
*Phalaena repandatis* Wien. Verz. 120. 2.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Statura praecedentium. Corpus cinereum ab domine albidio. Alae anticae cinerascentes striga parua ante medium, tunc puncto in medio, deinde striga valde flexuosa et tandem striga incurua fuscis. Posticae albo hyalinae striga flexuosa fusca.
- verbasca-ta*. 246. P. seticornis alis flavescentibus: anticis strigis tribus punctoque medio fuscis.  
*Phalaena Verbasca* Wien. Verz. 121. 5.  
Habitat in Verbascu thapsus Dom. Schieffermyller.  
Statura P. vrticatae at paullo minor. Alae omnes flavae, anticis strigis tribus punctoque medio fuscis. Margo fuscens ciliis argenteis.
- hyalinata* 247. P. seticornis alis hyalino albis margine nigro cinctis, anno lutescente.
- potamo-gata*. 248. P. seticornis alis cinereis albo maculatis: anticis obsolete reticulatis.
- stratio-lata*. 249. P. seticornis alis pallide subfasciatis anticis punctis tribus nigris.  
*Phalaena stratiotatis* Wien. Verz. 123. 23.

250. P. seticornis alis cinereis omnibus conformiter albo *nymphœata*.  
maculato reticulatis.

*Phalaena nymphœalis* Wien. Verz. 121. 13.

251. P. seticornis alis niueis: posticis fascia terminali nigra; punctis quatuor albis. *limnata*. ~~lemonia~~  
Wien. Verz. 123. 30.

252. P. seticornis alis fuscis: maculis hyalinis sparsis. *sambucata*.  
*Phalaena sambucalis* Wien. 124. 14.

Habitat in Austriae Sambuco Dom. Schieffermyller.

Statura præcedentium. Alae omnes fuscae maculis  
hyalinis. Postice striga flexuosa macularis flauescens.

253. P. seticornis alis niueis: strigis vndatis fuscis punctis. *candidata*.  
*Phalaena niuealis* Wien. Verz. 316. 46.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Caput niueum. Alae niueae. Punctum paruum basos  
atrum. Postice strigae tres vndatae fuscae, in qua-  
rum anteriore punctum geminatum atrum. Posticae  
albae strigis duabus fuscis.

254. P. seticornis alis anticis griseis hyalinis maculatis, posticis hyalinis: margine flavo hyalino maculato. *perspectata*.

255. P. seticornis alis anticis obscuris: macula punctisque *vitrata*,  
duobus hyalinis, posticis hyalinis: margine fusco.  
Habitat Tranquebariae. *Hybrida*.

Statura omnino P. perspectatae. Alae anticae obscurae  
sive sordide flavescentes in medio macula magna an-  
ticeque punctis duobus hyalinis. Posticae hyalinae  
strigis obsoletis margineque postico late fuscis.

256. P. seticornis alis flauissimis fusco punctatis subtus im-  
maculatis. *eleuata*.

257. P. seticornis alis fulvis: anticis fascia, omnibus api-  
ce fuscis.  
Habitat in Insula Rotterdam Mus. Dom. Banks.

Parua. Caput et thorax fusca. Abdomen fuluum apice  
fuscum. Alae anticae fuluae costa exteriori fascia  
media margineque postico fuscis. Fascia cum mar-  
gine fusco interne coit. Posticae fuscae margine po-  
stico tantum fuluo. Subtus concolores.

258. P. seticornis alis flavescentibus: anticis strigis tribus, reuidata,  
posticis duabus fuscis, subtus albidis immaculatis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Statura et summa effinitas P. indicatae at paullo maior et strigae minus vndatae et uti alae subtus immaculatae.

*indicata.* 259. P. seticornis alis flatis: anticis strigis tribus, posticis duabus vndatis fuscis.

*derogata.* 260. P. seticornis, alis albis: strigis plurimis fuscis.

*electata.* 261. P. seticornis alis fusco flavoque variis: maculis hyalinis sparsis.

*fenestrata* 262. P. seticornis alis albo hyalinis: strigis numerosis fluorescentibus.

\*\*\* *Alis forficatis.*

*marginalis.* 263. P. palpis recurvatis, alis atris: posticis margine luteo.

*Phalaena marginalis* Wien. Verz. 69. 13. 917. 48.

Habitat in Europa australiori Mus. Dom. Romani.

Huius generis videtur. Corpus totum atrum nitidum solo margine alae posticae luteo.

*farinalis.* 264. P. palpis recurvatis alis politis lutescentibus: strigis repandis albis basi apiceque glaucis.

Wien. Verz. 123. 33.

*glaucinalis.* 265. P. palpis recurvatis, alis glaucis: strigis duabus fuscis repandis.

Wien. Verz. 120. 10.

*barbalis.* 266. P. palpis antennis pectinatis breuioribus, femoribus anticis barba porrecta.

*Phalaena barbalis* Wien. Verz. 120. 9.

Habitat in Trifolio pratensi.

*ventilabris.* 267. P. palpis antennis pectinatis breuioribus, tibiis anticis apice fasciculato pilosis.

Habitat in Carinthia Dom. Saldotter.

Affinis videtur P. barbalis. Pedes antici porrecti tibiis apice fasciculo magno exanco pilorum erectorum cinereorum. Antennae parum pectinatae. Alae griseae strigis tribus vndulatis fuscis. Posticat cinereae striga unica albo terminata.

*bombycalis.* 268. P. palpis antennis pectinatis breuioribus, alis cinerero rufis: strigis duabus albidis, posticis luteis: margine nigro.

*Phalaena bombycalis* Wien. Verz. 120. 6.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Affinis Bombycibus. Antennae valde pectinatae nigrae.

Corpus cinereum. Alae anticae cinereo rufescentes  
fascia obliqua pone medium albida. Costa albo pun-  
ctata. Posticae flavescentes macula magna apicis nigra.

269. P. palpis porrectis longitudine antennarum pectina- *tentacula-*  
tarum, alis cinerascentibus: strigis tribus fuscis. *ris.*

*Phalaena tentacularis* Wien. Verz. 119. 2.

Habitat in Taraxaco.

270. P. palpis porrectis approximatis thoracē longioribus, *probosci-*  
alis griseis: strigis ferrugineis. *dalis.*

*Phalaena proboscidalis* Wien. Verz. 119. 1.

271. P. palpis porrectis thorace longioribus, alis subgri. *rostralis.*  
feis punctis duobus muricatis lineaque apicis nigris.

*Phalaena rostralis* Wien. Verz. 119. 3.

272. P. palpis recurvatis, alis griseis: strigis tribus fu- *nemoralis*  
scis; intermedia flexuosa.

*Phalaena grisealis* Wien. Verz. 120. 11.

273. P. alis anticis fuscouscentibus apice cinereis: punctis *crassalis.*  
ocellaribus nigris.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Maior. Alae anticae fuscae margine tenuiore albo ma-  
culato. Margo posticus in primis interne cinera-  
scens punctis aliquot obsoletis ocellaribus fuscis. Po-  
sticae fuscae.

274. P. alis nigro coeruleoscentie variis, posticis nigris. *alpestralis*  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Abdomen atrum cingulis albis. Alae anticae nigro coe-  
ruleoscentibus variegatae. Posticae nigrae margine  
tenuiore pallescente. Subtus basi cinereae apice fuscae.

275. P. palpis porrectis thorace longioribus, alis griseis: *pallipalis.*  
posticis margine crassiori albo.

276. P. alis glabris pallidis: strigis obliquis ferrugineis. *forficalis.*  
*Phalaena forficalis* Wien. Verz. 122. 17.

277. P. alis glabris fusco cinereoque variegatis: posticis *sophialis.*  
cinereis margine postico fuscis.

Habitat in Austriae Sisymbrio sophia. Dom. Schieffer-  
müller.

Media. Alae anticae fusco cinereoque variegatae, posticae cinereae marginē postico fuscō et in hoc marginē puncta aliquot alba.

- varie-* 278. P. alis glabris fuscō cinereoque variis: fascia postica fusca distincta.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Alae anticae cinereo fuscoque variegatae indistinctae. Apice fascia distincta fusca. Posticae griseae. Subtus anticae fuscae, posticae albidae.

- motitalis.* 279. P. alis pallide cinereis: punctis duobus strigaque postica fuscis.

Habitat in Insula Rotterdam Mus. Dom. Banks.

Statura omnino P. forficalis at minor. Corpus totum cinereum. Alae anticae pallidae, glabrae, nitidae puncto paruo ante medium lunula sive puncto maiori in medio et striga postica vndata fuscis. Posticae pallidae striga tantum apicis fusca: Subtus omnes albidae.

- vndalis.* 280. P. alis obscure cinereis: strigis tribus obliquis vndatis niueis.

- sagittalis.* 281. P. palpis recurvis, alis cinereis: macula costali atra, posticis flavis: margine fuscō.

- margari-* 282. P. alis glabris: anticis flavescentibus apice ferrugineo fuscis.

*Phalaena margaritalis* Wien. Verz. 123. 29.

*Phalaena extimalis* Scop. carn.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo P. verticalis. Alae anticae flavae atomis maculaque magna apicis fuscō ferruginea. Posticae albae.

- sericealis.* 283. P. alis glabris flavis: macula media fusca.

*Phalaena sericealis* Wien. Verz. 122. 18.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magnitudo et statura fere P. forficalis. Alae anticae ochraceae macula magna media fusca et in hac puncta duo parua atra. Margo posticus albo punctatus. Posticae pallidae.

- trinalis.* 284. P. alis glabris flavis: maculis tribus disci marginaque postico fuscis.

*Phalaena trinalis* Wien. Verz. 317. 47.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Statura praecedentium. Alae anticae flavae margine postico fusco. In medio disci maculae tres fuscae 2. i. posteriori maiori transuerso. Posticae pallidiores margine fusco.

285. P. alis glabris pallidis subfasciatis subtus fusco vnda- *verticalis*.  
tis. Wien. Verz. 120. I.

286. P. alis cinereis: anticis strigis tribus obliquis fuluis, *salicalis*.  
antennis pubescentibus.

287. P. alis anticis obscure cinereis: macula media alba. *alpinalis*.

*Phalaena alpinalis* Wien. Verz. 123. 24.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Statura et magnitudo praecedentium. Alae anticae ci-  
nereae macula media niuea. Posticae fuscescentes  
macula maiori niuea. Subtus anticae fuscae macula  
media alba, posticae niueae margine postico fusco.

288. P. alis cinerascentibus: puncto medio niueo striga- *punctalis*.  
que postica fusca.

*Phalaena punctalis* Wien. Verz. 123. 25.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Praecedente duplo fere minor. Alae anticae cinera-  
scentes, obscurae puncto parvo medio albo et pone  
hoc striga vndata obscurior. Posticae uti omnes sub-  
tus cinereae.

289. P. alis fuscis; strigis duabus flavescentibus.

*nitidalis*.

*Phalaena nitidalis* Wien. Verz. 129. 36.

Habitat in Austria Dom. Schieffernmyller.

Media. Corpus fuscum. Alae anticae fuscae, nitidu-  
lae strigis duabus flavescentibus, quae ad marginem ex-  
teriorum crassiores. Costa inter strigas purpurascens  
flavo punctatus. Posticae fuscae strigis duabus pal-  
lidis. Subtus fuscae anticis macula marginali flava,  
posticis striga incurua pallida.

290. P. palpis recurvatis, alis cinereis: linea dorsali fa- *dorsalis*.  
sciaque postica fuscis.

291. P. palpis recurvatis, alis fuscis nitidis: anticis pun- *fascialis*.  
cto subocellari niueo.

- pingui-* 292. P. palpis recuruatis, alis cinereis: margine crassiori  
*nalis.* nigro subfasciato.
- Phalaena pingualis* Wien. Verz. 120. 13.
- ramalis.* 293. P. palpis subrecuruatis, alis oliuaceis: fascia postica  
dentata pallida.
- Phalaena dentalis* Wien. Verz. 120. 14.
- Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Magna. Alae anticae olivaceae, in medio fascia obli-  
qua ad marginem exteriorem repanda dentes nume-  
rosos, acutos emittens pallida. Margo posticus fu-  
scō striatus. Posticae pallidae margine parum flaue-  
scente. Subtus anticae fuscae, posticae pallidae.
- aenealis.* 294. P. alis fuscis nitidulis immaculatis, capite ferru-  
gineo.
- Phalaena aenecalis* Wien. Verz. 123. 26.
- Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Media inter congeneres. Corpus fuscum capite ferru-  
gineo. Alae anticae fuscae cupro nitidulae, immacu-  
latae, posticae fuscae.
- palealis.* 295. P. alis anticis virescentibus immaculatis.
- Phalaena palealis* Wien. Verz. 123. 27.
- Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Praecedentibus maior. Alae anticae virides, immacu-  
latae, posticae exalbidae.
- ochrealis.* 296. P. alis flavescentibus immaclatis.
- Phalaena ochrealis* Wien. Verz. 123. 28.
- Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Minor praecedente. Alae anticae ochraceae, posticae  
fuscæ, immaclatae.
- ferrugalis* 297. P. alis flavis, strigis tribus vndatis ferrugineis.
- secalis.* 298. P. alis striatis griseo fuscis: macula veniformi A la-  
tino inscripta.
- Phalaena secalis* Wien. 78. 17.
- Larua* viridis: lineis tribus longitudinalibus fuscis, ca-  
pite brunneo.
- An potius *Noctua*?
- niuealis.* 299. P. alis griseo fuscis: maculis duabus costalibus albis,  
corpore niueo.
- elatalis.* 300. P. alis anticis albis: costa interrupta fasciaque sub-  
marginali fuscis.

*Phalaena elatalis* Wien. Verz. 121. 9.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus album. Alae anticae albae costa vsque ad medium fusca, in medio alba punctis duobus fuscis apice fusca. Versus marginem posticum fascia lata fusca. Margo ipse nigro punctatus. Posticae fuscae costa pallida apice fusco punctata, posticae albidiae lunula media strigaque postica fusca.

301. P. alis anticis albis: vitta rosea.

*pudoralis*

*Phalaena pudoralis* Wien. Verz. 124. 40.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua at distincta. Alae anticae albae vitta rosea, quae tamen basin haud attingit. Posticae obscure cinereae.

303. P. alis anticis sulphureis: strigis duabus maculaque *flaualis*.  
media veniformi fuscis.

*Phalaena flaualis* Wien. Verz. 121. 7.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Caput et thorax flava. Abdomen cinereum. Alae anticae sulphureae striga antica obsoleta, flexuosa, fusca. In medio macula veniformis et pone hanc striga altera. Posticae pallidiores striga vnuca fusca. Subtus omnes cinereo fuscoque variae.

303. P. alis anticis cinereis: margine postico inaurato. *polygona-*  
*lis*.

*Phalaena polygonalis* Wien. Verz. 121. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae cinereae costa anticarum vsque ad medium obscuriore. Margo posticus fusco aureus. Posticae apice tantum inauratae.

304. P. alis flavis: fasciis duabus sanguineis; priore ex-*sanguina-*  
*ternis* dilatata, perforata.

*Phalaena sanguinalis* Wien. Verz. 124. 41.

305. P. alis griseis: striga marginali flava margineque nigro ciliari. *sticticalis*.

306. P. palpis recurvatis, alis fuscis: fasciis duabus flavis. *fascialis*.

307. P. alis flavescentibus: strigis punto margineque postico fuscis. *fimbrialis*.

Habitat in Insula Amsterdam Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentium at parua. Corpus flavescentia.

Alae anticae flavae basi fuscæ, tunc striga parua punto distincto, tunc strigæ duæ repandæ margoque

po-

posticus late fuscus. Posticae flavae puncto striga  
marginaque postico fuscis.

*politalis.* 308. P. alis fuscis: fascia media maculaque marginali  
flavis.

*Phalaena politalis* Wien. Verz. 121. 4.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua. Alae anticae basi fuscae litura parua flava, in  
medio fascia lata flava et in hac annuli duo con-  
nati fusi. Apice fuscae macula vna alteraue flava.

*angustalis.* 309. P. alis nigricantibus: fascia media anticarum abbre-  
uiata maculaque costali transuersi albis.

Habitat Tranquebariae. Dom. Hybner.

Corpus nigrum abdominis segmentis margine albis.

*strigalis.* 310. P. alis griseis: strigis duabus flavis costaque purpu-  
rascente.

*recurualis* 311. P. palpis recuruatis, alis fuscis, anticis fasciis duabus  
albis; posteriore abbreuiata.

*punctalis.* 312. P. alis ferrugineis: striga flava, margine crassiori  
albo punctato.

*Phalaena angustalis* Wien. Verz. 120. 7.

*curtalis.* 313. P. flavo cinerascentibus: striga postica ferruginea.

*Phalaena curtalis* Wien. Verz. 120. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua. Corpus cinereum. Alae onines flavo cinereae  
striga fere obsoleta, ferruginea versus marginem  
posticum.

*cespitalis.* 314. P. alis anticis obscuris variegatis: posticis nigris;  
strigis duabus flavis.

*Phalaena cespitalis* Wien. Verz. 123. 32.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Magnitudo P. purpuralis. Alae anticae colore variant.

*flavinalis.* 315. P. alis fuscis: anticis puncto strigisque duabus re-  
pandis albis.

Habitat in Insula Rotterdam. Mus. Dom. Banks.

Statura omnino praecedentium. Corpus fuscum. Alae  
anticae fuscae basi pallidiores puncto paruo in me-  
dio strigisque duabus vndatis anteriore interrupta  
albis, posticae fuscae strigis duabus vndatis albis.

Subtus concolores at pallidiores.

316. P. alis purpurascenibus: omnibus fasciis duabus lu- *purpura-*  
teis. Wien. Verz. 124. 42. *lis.*  
Schaeff. Icon. 209. fig. 5. 6. ?
317. P. alis fuscenscentibus: macula costali fulua, posticis *porphy-*  
atris: striga albida. *ralis.*  
*P. porphyralis* Wien. Verz. 317. 50.  
Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.  
Statura et summa affinitas P. purpuralis. Alae anticae  
basi obscure fuscae maculis duabus indistinctis obscur-  
rioribus, apice obscure purpurascentes. Macula ma-  
gna costalis fulua colores hos distinguit. Posticae  
atrae striga alba. Subtus basi albidae striga nigra,  
apice fuscae strigis albidis.
318. P. alis purpureis: lineola baseos punctisque duobus *punicalis.*  
mediis flauis.  
*Phalaena punicalis* Wien. Verz. 317. 49.  
Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.  
Nimis affinis P. purpuralis. Alae anticae obscure pur-  
pureae, lineola baseos et in medio punctis duobus  
flauis.
319. P. alis flauissimis: striga fusca, apice obscure pur- *apicalis.*  
purpurascentibus; macula flava punctisque duobus mar-  
ginalibus albis.  
Habitat Surinami Mus. Dr. Pflug.  
Statura et magnitudo P. purpuralis. Caput et thorax  
flava antennis obscenis. Alae anticae basi flauissimae  
margin'e atro strigaque media fusca, apice obscure  
purpurascentes macula magna flava punctisque duo-  
bus marginis albis. Posticae flavae punto medio  
apice fuscis.
320. P. alis fuscis: anticis maculis duabus fuluis. *4 puncta-*  
*Phalaena 4 punctalis* Wien. Verz. 124. 43. *lis.*  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Statura P. purpuralis. Alae omnes fuscae. Maculae  
duae fere oppositae fuluae in alis anticis, posticae  
immaculatae.
321. P. alis cinereo fuscis: strigis anticarum tribus, po- *argen-*  
sticarum duabus vndatlis argenteis. *talis.*  
*Phalaena argentalis* Wien. Verz. 122. 15.

*costalis.* 322. P. alis purpurascenibus: maculis duabus costalibus marginaque postico flauis.

*Phalaena fimbrialis* Wien. Verz. 124. 38.

*atralis.* 323. P. alis atris: maculis duabus niveis.

*Phalaena guttalalis* Wien. Verz. 124. 45.

Schaeff. Icon. tab. 275. fig. 5, 6. at maior.

Thorax linea laterali flava.

*pollinalis.* 324. P. alis puluerulentis atris: lineola baseos punctisque duobus a'bis.

*Phalaena pollinalis* Wien. Verz. 124. 44.

Habitat in Austria Muf. Dom. Schieffernmyller.

Nimis affinis P. atrali at alae magis magis puluerulentae, maculae magis approximatae et lineola bascos distincta. Thorax niger, immaculatus.

*Aentalis.* 325. P. alis flauis: fascia purpurea.

155. PYRALIS. *Palpi* nudiusculi basi cylindrici, medio dilatato ouati, apice subulati.

*Antennae* filiformes.

*Bankiana* 1. P. alis fuscis: fasciis duabus niveis; posteriore vndentata.

*Tortrix oliuana* Wien. Verz. 120. 1.

*Lecana.* 2. P. alis pallidis: macula centrali fusca.

*mundana.* 3. P. alis denudatis albidis: strigis duabus punctoque medio obsolete fuscis.

*prasinana* 4. P. alis anticis viridibus: strigis duabus obliquis flauicantibus, posticis albis.

*Phalaena queranca* Wien. Verz. 125. 1.

*fagana.* 5. P. alis viridibus: strigis tribus obliquis albis, anten-nis pedibusque fuluis.

*Phalaena fagana* Wien. Verz. 125. 2.

*viridana* 6. P. alis rhombeis: anticis viridibus immaculatis, Wien. Verz. 125. 3.

*storana.* 7. P. alis rhombeis: anticis viridibus: margine albo, Wien. Verz. 125. 4.

8. P. alis rhombis pallide virescentibus, posticis albis: *vernana*.  
margine virescente.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Nimis affinis P. viridanae, differt tamen corpore albo,  
alarum colore teneriori, posticis albis margine tan-  
tum virescente.

9. P. alis rhombis virescentibus: lineola alba, posticis *Vahliana*  
atris: macula media margineque albis.

Habitat in Holfsatia.

Statura fere Bombycis. Antennae crassae, nigrae. Cor-  
pus nigrum. Alae anticae virescentes lineola a basi  
ultra medium ducta alba. Posticae atrae margine  
antico et postico maculaque media albis. Subtus  
omnes atrae margine omni maculaque media albis.

10. P. alis fusca: margine exteriori albido: medio ra- *vuncana*.  
muni recurvum album exscente.

*Phalaena vunca* Wien. Verz. 91. 4.

11. P. alis plumbis: lineolis tribus maculaque magna api- *plumbana*  
cis ferrugineis.

12. P. alis griseis: atomis rufescensibus.

*Phalaena sponsana* Wien. Verz. 129. 1.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Magna. Alae griseae atomis plurimis, vix conspicuis  
rufescensibus, quae fere strigas obliquas formant.

13. P. alis fusca: strigis cinereis sesquitertiis.

*Hattor-*

*fiana.*

14. P. alis ferrugineis fusco irroratis.

*Phalaena Hermanniana* Wien. Verz. 315. 30.

Habitat in Austriae Rubo fruticoso Dom. Schieffer-  
myller.

Maior P. rosanae. Alae anticae ferrugineae atomis  
culisque numerosis fusca. Posticae fuscae.

15. P. alis anticis griseo fuscoque vndatis: punto medio *inundana*  
niueo.

*Phalaena inundana* Wien. Verz. 132. 6.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Corpus fuscum. Alae anticae fusco griseoque  
tenuissime variegatae et in medio punto niueo di-  
stincto. Posticae fuscae.

- rosana.* 16. P. alis anticis testaceis: fascia obliqua grisea.  
Wien. Verz. 128. 10.
- Burman-* 17. P. alis pallidis: anticis maculis quatuor costalibus  
*niana.* atris.  
*Phalaena Burmanniana* Cram. pap. 31. tab. 372. fig. H.  
Habitat Surinami.
- Magna.* Caput ferrugineum. Alae omnes pallidae mar-  
gine postico atro. Maculae quatuor atrae costae  
connexae.
- Pasqua-* 18. P. P. alis ferrugineis immaculatis.  
*gana.* *Phalaena Pasquagana* Wien. Verz. 318. 21.  
Habitat in Crataego terminali Dom. Schieffermyller.  
Statura magna P. rosanae. Caput et thorax ferruginea.  
Alae anticae ferrugineae, immaculatae. Posticae ci-  
nereae.
- pallidana* 19. P. alis pallide flavis: strigis duabus obliquis ferru-  
gineis.
- Smeath-* 20. P. alis exalbidis: fasciis duabus obliquis fuscis; ante-  
*manniana* riore abbreviata, posteriore interrupta.
- ceretana.* 21. P. alis albis: fasciis tribus fuscis; tertia abbreviata.  
*Phalaena ceretana* Wien. Verz. 129. 3.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
*Magna.* Corpus fuscum. Alae anticae albae fascia ba-  
leos fusca, secunda in medio obliqua, tertia ad mar-  
ginem crassiorem abbreviata. Posticae obscurae.
- decussana* 22. P. alis cinereo nigro argenteoque tenuissime fasciatis:  
apice macula subocellari cinerea.
- ameriana* 23. P. alis anticis testaceis: litura communis ferruginea.  
Wien. Verz. 123. II.
- maculana* 24. P. alis anticis fuscis: maculis quatuor dorsalibus atro  
ferrugineis.
- fuscania.* 25. P. alis anticis fuscis immaculatis.  
*Phalaena ferrugana* Wien. Verz. 128. I.
- Hart-* 26. P. alis anticis griseis: lineola media atra albae adna-  
*manniana* tb. Linn. Syst. Nat. 2. 878. 306. In Sv. 1322.  
*Tortrix Linneana* Wien. Verz. 131. 31.  
Habitat in Europa Mus. Dom. Schieffermyller.  
Media distincta lineola in medio disco atra, cui interne  
adiacet lineola alba; externe macula fusca.

27. P. alis anticis obscure cinereis: maculis duabus marginalibus fuscis. *Forsterana.*
28. P. alis anticis aureis: fasciis duabus obliquis fuscis, *Pilleriana.*  
*Phalaena Pilleriana* Wien. Verz. 125. 2.  
 Habitat in Stachys Germaniae Dom. Schieffermyller.  
 Magna. Alae anticae aureae fasciis duabus fuscis. *Potisticae fuscæ.*  
 Variat alis fere totis aureis absque fasciis,  
*Piller* Iesuita olim Professor Theresiani, nunc Praepositus in Hungaria.
29. P. alis pallide testaceis: maculis duabus costalibus *costana.*  
 fuscis.  
*Phalaena costana* Wien. Verz. 127. 5.  
 Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.  
 Statura et magnitudo omnino P. Forsteranae at alae magis planæ. Caput et thorax pallide testacea immaculata. Alae antitae pallide testaceæ margine exteriori maculis duabus costalibus puncto que indistinctis nigris.
30. P. alis anticis testaceis: fascia obliqua fusca. *Xylostea.*  
 Wien. Verz. 128. 4.  
 Habitat in Lonicera Xylosteo.
31. P. alis anticis testaceis; margine postico rufo, medio ministrilitera ferruginea; lineola alba. *ministra.*  
 Wien. Verz. 128. 5.
32. P. alis anticis fuscescentibus; macula centrali fulua *seruana.*  
 basi flavis.
33. P. alis anticis fusco testaceis: macula media ferruginea. *laeuigana.*  
*Phalaena laeuigana* Wien. Verz. 129. 12.  
 Habitat in Austriae Carpino Dom. Schieffermyller.  
 Media. Alae anticae obscure testaceæ strigis vi spicuis maculaque magna media ferrugineis. Posticæ fuscae macula apicis ferruginea.
34. P. alis fuscis: arcu communi dorsali anguloque ani *Pflugiana.*  
 niueis.  
 Habitat Hafniae Dr. Pflug.  
 Statura et magnitudo P. Vdmannianæ. Caput et thorax fusca. Alæ fuscae arcu magno interne crassiori, communi anguloque ani niueis. Postica ad marginem

nem crassiorem strigae aliquot obliquae abbreviatae,  
fere obsoletae, argenteae. Posticae nigricantes.  
Subtus cinerea.

*Vdmanniana.* 35. P. alis cinereis: macula brunnea communis transversa.  
Wien. Verz. 130. 8.  
Habitat in Rubo Idaeo.

*variegana.* 36. P. alis albis: macula communis dorsali marginis posticis fuscis.  
*Phalaena variegana* Wien. Verz. 130. 6.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Media. Caput et thorax alba abdomine flavescente.  
Alae anticae macula communis in medio dorsi fuscata  
atomis nigris. Margo posticus fuscus maculis obscurioribus.

*Solan-drana.* 37. P. alis pallidis albo subfasciatis: macula communis dorsali ferruginea.

*trapeza.* 38. P. alis testaceis: macula communis dorsali cinerea; striga testaceis.  
Habitat Hafniae Dr. Pflug.  
Statura praecedentium. Caput cinerascens. Thorax testaceus. Alae testaceae fere unicolor macula magna dorsali cinerea et in hac strigae abbreviatae testaceae. Subtus cinerea.

*ocellana.* 39. P. alis pallidis; fascia baseos maculaque communis dorsali lituraque apicis fuscis. Wien. Verz. 330. 7.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Parua. Corpus fuscum. Alae anticae pallide cinereae fascia lata baseos, macula communis versus posteriora lituraque in medio marginis postici fuscis. Costa punctis fuscis. Alae posticae fuscae.

*Strocmia-na.* 40. P. alis fuscis: maculis duabus dorsalibus cinereis.

*Zoiyan.* 41. P. alis flavis: puncto medio lituraque postica ferruginea. Wien. Verz. 127. 4.  
Schaeff. Icon. tab. 250. fig. 1. 2.

*cruciana.* 42. P. alis exalbido cinereis: postice macula arcuata ferruginea.

*Phalaena humana* Wien. Verz. 122. 6.

43. P. alis flauescens: puncto vnico ferrugineo. *Kakkri-*  
*Linn.* Syst. Nat. 2. 876. 291. Wien. Verz. 127. 1. *tziana.*  
 Habitat in Europae nemoribus.  
 Magna alis anticis pallide flavis puncto minuto medio  
 ferrugineo. Posticae fuscae.
44. P. alis fusco griseis nitidis immaculatis: posticis fu- *Viburnia-*  
*scis;* margine albicante. *na.*  
*Phalaena viburnana* Wien. Verz. 128. 15.  
 Habitat in Viburno Lantana Dom. Schieffermüller.  
 Magna statura praecedentium. Caput et thorax fusca.  
 Alae fusco griseae, nitidulae, immaculatae, posticae  
 nigricantes: margine albicante.
45. P. alis exalbido cinereis immaculatis, capite fulvo, *cinerana.*
46. P. alis cinereis: fasciis obliquis fuluis albo marginatis. *obliquana*
47. P. alis anticis fuscouscentibus; margine exteriori ba- *lactana.*  
 seos niveo nigro punctato.
48. P. alis cinereo fuscoque variegatis: macula communi profun-  
 dorsali alba. *dorsalis.*  
*Phalaena profundana* Wien. Verz. 132. 1.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
 Magna. Affinis P. Brynichanae at alae anticae supra  
 cinereo fuscoque variegatae. Costa nigro punctata.  
 Posticae fuscae.
49. P. alis fusca: macula communi dorsali rhombata alba. *Bruni-*  
*chana.* Wien. Verz. 132. 2.
50. P. alis anticis aureis: macula dorsali communi pun- *Iaquini-*  
*etisque costalibus albis.* *niana.*  
*Phalaena Iaquiniiana* Wien. Verz. 132. 4.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
 Parua. Alae anticae aureae inacula magna communi  
 albida. Costa albo punctata.
51. P. alis anticis nigricantibus: macula communi dorsali *Traunia-*  
 flava. *na.*  
*Phalaena Trauniana* Wien. Verz. 132. 3.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
 Parua. Alae anticae nigricantes in medio macula magna communi flava, postice striga fere obsoleta aurea  
 et in hac puncta quatuor costalia flava.

*Woebera*- 52. P. alis fusco aureoqué variis: costa strigis argenteis numerosis.

*Phalaena Woeberana* Wien. Verz. 126. 9.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Statura omnino P. arcuanae. Alae anticae strigis fuscis aureisque indistinctis contortuplicatis, apice macula obsoleta fusca linealis aureis. Costa strigis numerosis argenteis, nitidis. Posticae fuscae margine interiori baseos albido.

Baro de Woeber Iesuita olim Professor Theresianus, nunc Pastor Viennensis.

*arcuana*. 53. P. alis luteis: fasciis tribus arcuatis maculaque discolorata: punctis tribus argenteis. Wien. Verz. 126. 11.

*Lecheana* 54. P. alis anticis testaceis characteribus J L thoraceisque argenteis. Wien. Verz. 120. 3.

*Christier-* 55. P. alis anticis flaviissimis: venis sanguineis reticulatis. *nana*. Wien. Verz. 128. 9.

*Buoliania*. 56. P. alis anticis fuluis: strigis albis subreticulatis.

*Phalaena Buoliania* Wien. Verz. 128. 16.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Alae anticae fuluae strigis plurimis albidis basi inprimis fere reticulatis, ultima distincta. Posticae fuscae. Baro Buol Viennensis.

*auellana*. 57. P. alis anticis testaceis: fasciis fuscis sesquitertiis. Wien. Verz. 127. 8.

*fascianā*. 58. P. alis anticis obscure cinereis: fascia media lituraque apicis fuscis.

*Phalaena Heperana* Wien. Verz. 128. 3.

*Hafiana*. 59. P. alis anticis fuscis: striga antrorsum obliqua alba. Wien. Verz. 20. 4.

*decimana* 60. P. alis anticis fuluis argento strigosis: fascia punctisque tribus flavis.

*Phalaena decimana* Wien. Verz. App. 300.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Malor. Caput et thorax fulua. Alae anticae fuluae strigis quinque argenteis secunda interrupta. Fascia lata flava ad basin. Maculae duae oppositae flavae in medio et quarta magna transuersa ante apicem. Posticae nigrae.

61. P. alis anticis flavis: fasciis duabus ferrugineis argenteis marginatis subanastomosantibus: posteriore niana. Bauman: interrupta. Wien. Verz. 126. 6.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Statura praecedentium. Caput et thorax ferruginea. Alae anticae flavae fasciis duabus in medio fere anastomosantibus ferrugineis argento utrinque marginatis. Posticae fuscae. Baumann senator Lipsiensis.
62. P. alis flavis: strigis argenteis; punctis fuluis. Heiseana: Tinea alulla alis flavis: maculis ferrugineis striga argentea cinctis Sp. Inf. App. Phalaena tiserana Wien. Verz. 126. 7.  
 Habitat in Saxoniae nemoribus Dr. Heise. Corpus medium totum cinereum capite solo fulvo. Alae anticae flavae strigis quatuor obliquis argenteis ad margines coeuntibus et utrinque punctis duobus fulvis inter strigas coeuntes. Posticae uti omnes subtus cinereae.
63. P. alis anticis ferrugineo fuscoque variis, posticis Variana: fuscis apice fulvis.  
 Habitat Kiliae Dom. Daldorf. Media. Alae anticae fusco ferrugineoque variae, posticae fuscae apice fuluae. Subtus omnes fuscae apice fuluae.
64. P. alis fulcis: fasciis duabus rubro argenteis, posteriore puncto intruso. Ledianana: Wien. Verz. 127. 13.
65. P. alis canis: macula marginali ferruginea. Schallerriana,  
 66. P. alis griseo rufescens: macula marginali fusca rufana. punctoque medio albo.  
 Phalaena rufana Wien. Verz. 129. 8.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller. Magna in hoc genere. Caput et thorax fusca. Alae anticae griseo rufescentes macula magna oblonga marginali fusca. In medio alae punctum album, quod maculum fuscum attingit. Posticae cinereae.
67. P. alis cinereis: maculis duabus marginalibus testaceis: bascos minore. Roboriana: Habi-

- Habitat in Hafniae Quercu Dom. de Sehestedt.  
*Maiuseula*. Caput cinereum antennis nigricantibus.  
 Thorax cinereus maculis tribus magnis ferrugineo  
 testaceis. Alae anticae obscure cinereae maculis dua-  
 bus altera baseos minore, altera media, triangulari  
 testaceis. Alae subtus dilutiores.
- Modee-riana*. 68. P. alis anticis flavescentibus: macula marginali poste-  
 rius fusca.
- Schreberiana*. 69. P. alis anticis griseis: macula marginali trigona  
 alba.
- Holmia-na*. 70. P. alis anticis luteo ferrugineis: macula marginali tri-  
 gona alba. Wien. Verz. 127. 16.
- Saldona-na*. 71. P. alis anticis virescentibus: vitta abbreviata flava,  
 posticis atris: macula baseos albida.  
 Habitat in Austria Dom. Saldoner.  
 Media. Corpus fuscum abdomine apice cinereo. Alae  
 anticae virescentes vitta a basi ultra medium flave-  
 scente. Posticæ atrae macula magna margineque  
 albis. Subtus omnes atrae macula margineque omni  
 albis.
- Rolandriana*. 72. P. alis anticis pallide testaceis: strigis obliquis ferru-  
 gineis: posticis duabus coeuntibus.  
*Phalaena Rolandriana* Linn. Syst. Nat. 2. 878. 309. In  
 Sv. 1326. Wien. Verz. 128. 13.  
 Habitat in Verastro albo.  
 Inter strigas ultimas ad marginem tenuiorem coeunti-  
 bus macula ferruginea costae.
- gnomana*. 73. P. alis anticis flavis: fascia obliqua testacea macu-  
 laque postica marginali ferruginea.  
*Phalaena gnomana* Wien. Verz. 127. 7.
- oporana*. 74. alis anticis ferrugineis fusco maculatis reticulatisque.  
 Wien. Verz. 128. 2.
- Gernin-gana*. 75. P. alis rufescensibus: fasciis duabus obliquis fuscis;  
 posteriore terminali.  
*Phalaena Gerningana* Wien. Verz. 318. 23.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Nimis affinis P. oporanae. Antennae pectinatae. Alae  
 anticae rufescentes fasciis duabus latis fuscis, ante-  
 riore in medio, -posteriore marginali.

76. P. alis anticis fuscō cinereis: punctis fuscis; centrali *ilicana*.  
solitario atro.
77. P. alis anticis griseis: strigis duabus mediis cinereis *riuagana*  
punctoque fulvo.  
*Phalaena riuagana* Wien. Verz. 130. 17.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
Magna. Alae griseae, mox obscuriores mox punctis  
aliquot fuscis adspersae, in medio strigae duae vnda-  
tae cinereae et inter has punctum paruum fuluum.  
Posticae fuscae.
78. P. alis anticis niueis: maculis atomisque nigris spar- *conspersa*.  
sis. Wien. Verz. 130. 14.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
Magna. Alae anticae niueae maculis paruis atomisque  
innumeris nigris. Posticae cinereae. Corpus ni-  
ueum.
79. P. alis anticis cinereis: atomis numerosissimis fuscis. *strigula-*  
Wien. Verz. 130. 15. *-na*.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
Statura et magnitudo omnino praecedentis, at corpus  
fuscum et alae cinereae atomis fuscis.
80. P. alis anticis cinereis: linea flexuosa atra disci. Wien. *Steinkel-*  
Verz. 130. 16. *-nerana*.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
Magna. Alae anticae cinereae, in medio disci linea  
magna flexuosa atra.  
*Steinkelner* Iesuita olim Professor Theresianus.
81. P. alis anticis canis: atomis nigris sparsis, posticis *Logiana*.  
exalbidis. Wien. Verz. 130. 4.
82. P. alis anticis niueis subtus fuscis. *Gouana*.
83. P. alis anticis argenteis: strigis duabus obliquis eleua- *niueana*.  
tis: margine postico nigro punctato.  
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
Magna. Corpus album. Alae anticae argenteae strigis  
duabus obliquis e squamis eleutatis. Margo alae po-  
sticus striga punctorum nigrorum. Posticae supra  
fuscae.
84. P. alis anticis fuscis: margine interiori albo puncto- *cristana*.  
que medio fasciculato eleuato.  
*Phalaena cristana* Wien. Verz. 129. 10.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

**Magna.** Alae anticae fuscae margine tenuiori late albo:  
In medio punctum album e fasciculo pilorum eleuato-  
torum fuscorum. Posticae cinereae. Caput et tho-  
rax albida.

**Tunber-** 85. P. alis anticis cinereis: punctis quatuor eleuato fasci-  
culatis atris.

*Tinea Lobella* Wien. Verz. 138. 9.

**punctula-** 86. P. alis anticis scabris fusca: vitta media interrupta  
na.

*Phalaena punctulana* Wien. Verz. 130. 13.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

**Magna.** Caput et thorax fusca. Alae anticae punctis  
numerofis eleuatis, sparsis, nigris, fuscescentes vitta  
lata obscure cinerea in medio interrupta. Posti-  
cae obscurae.

**asperana.** 87. P. alis anticis basi albis apice fusca scabris.

**eleuana.** 88. P. alis anticis cinereis scabris: macula baseos fusca.

*Phalaena scabra* Wien. Verz. 130. 12.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

**Magna.** Caput et thorax cinerea. Alae anticae cine-  
reæ punctis eleuatis sparsis scabrae. Macula magna  
baseos fusca. Posticae albidae immaculatae.

**duplicata.** 89. P. alis anticis pallidis: punctis duobus approximatis  
baseos nigris.

**squamana** 90. P. alis virescentibus scabris.

*Phalaena scabra* Wien. Verz. 130. 9.

**Romana-** 91. P. alis virescentibus albo scabris: lunula media atra.  
na.

Habitat in Germania australiori Dom. Romanus.

Affinis praecedenti. Alae anticae virescentes punctis  
plurimis eleuatis albis. In medio lunula magna atra.  
Alae posticae fusco cinereae. Abdomen cinereum  
linea laterali fusca.

**borana.** 92. P. alis cinereo fuscoque variis: punctis eleuatis ni-  
gris sparsis.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

**Magna.** Caput cinereum. Thorax fuscus lobo antico  
cinereo. Alae anticae basi cinereae striga e punctis  
fasciculatis eleuatis nigris, apice fuscae macula ma-  
gna

gna ad angulum ani liturisque costalibus cinereis.  
Puncta plurima parua sparsa eleuata atra. Subtus  
albidae.

93. P. alis rhombeis: anticis viridibus; characteribus *iiterana*. atris.
94. P. alis subcaudatis flavis fusco reticulatis fasciaque latente emarginata fusca: margine crassiori late emarginato. *gana*.
95. P. alis subcaudatis griseis: margine interiori fulvo *caudana*; exteriori emarginato.
96. P. alis anticis cinereis fusco subfasciatis scabris: an *scabrana*: margine exteriori postice exciso.
97. P. alis anticis flavis: maculis duabus costalibus sulphureis. *queriana*.
98. P. alis flavescentibus fulvo adspersis: fascia lata fusca *Grotiana* extrorsum bifida. Sp. Ins. App. 508.
99. P. alis albidis: macula triangulari communi baseos *Paykulliana*. atra.  
Habitat in Succia Dom. de Paykull.
- Media. Corpus album. Alae anticae albidae macula magna baseos triangulari communis atra. Margo posterior fuscescit.
100. P. alis cinereis litura media sanguinea: puncto albido. *ocellana*.
101. P. alis anticis luteis ferrugineo reticulatis: medio litura fuscescente. Wien. Verz. 127. 6. *Forskaliiana*.
102. P. alis anticis flavis luteo reticulatis duplii xx notatus. *Loeflingiana*.
103. P. alis anticis luteis flavo punctatis: fasciis quatuor argenteis; tertia bifida. *Phalaena Bergmanniana* Wien. Verz. 120. 5. *Bergmanniana*.
104. P. alis anticis fuscis apice aureis.  
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.  
Parua. Corpus fuscum, immaculatum. Alae anticae fuscae apice fuluae siue aureae; nitidae. Posticae vti omnes subtus fuscae, immaculatae.
105. P. alis anticis griseis: macula punctisque duobus centralibus nigris. *Teatiana*

- Schumacherana.* 106. P. alis anticis nigris: fascia media atomisque posticis albis.  
Habitat in Hafniae nemoribus Dom. de Sehestedt.  
Statura omnino P. Fabriciana at paullo maior. Caput et thorax nigra. Alae anticae nigrae fascia media parua sanguinata atomisque plurimis posticis albis. Subtus fuscae punctis quatuor costalibus albis.
- Penkleriana.* 107. P. alis anticis cinereo fuscoque reticulatis: macula apicis fusco grisea; strigis duabus argenteis.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Media. Corpus cinereum. Alae anticae fusco cinereoque subtilissime reticulatae. In medio macula obscura annulis duobus fuscis. In apice macula magna grisea fusca strigis duabus argenteis, quae tamen marginem exteriorem variegatum haud attingunt.  
Penkler Baro Viennensis in Theresiano studia et entomologium colens.
- Alstroemiana.* 108. P. alis albidis: anticis macula media laterali fusco ferruginea.  
*Tinea monilella* Wien, Verz. 138. II.
- Fabriciana.* 109. P. alis anticis nigricantibus: anticis pari punctorum albidorum.  
*Phalaena urticana* Wien, Verz. 132. 7.
- pariana.* 110. P. alis fuscis strigis duabus atris margineque brunneo.  
*Phalaena pariana* alis brunneis fascia glauca strigaque antica posticaque atris. Linn. Nat. 2. 880. 323. In Sv. 1341. Clerk. Icon. tab. 10, fig. 9.  
*Phalaena puriana* Wien, Verz. 132. 8.  
Habitat in Europae hortis.  
Magnitudo et statura omnino P. Fabriciana at puncta alba desunt, vix unum alterumue ad costam.
- Conwagana.* 111. P. alis ferrugineo fuscis argento punctatis, maculaque dorsali flauicanthe.  
*Phalaena montana* Wien, Verz. 127. 14.
- Bierkan-drana.* 112. P. alis fusco aureoque variis: strigis cinereis basi argento linearis apice punctatis.  
*Tinea Bierkandrella* alis fuscis nigro undulatis: punctis sparsis argenteis. Thunb. Ins. Svec. 24. tab.  
Habitat in Inula Salicina Sueciae Dom. de Paykull.

Statura et summa affinitas P. Conwaganae. Antennae albo nigroque annulatae. Thorax aureus linea laterali argentea. Alae basi aureae lineolis duabus argenteis, tunc striga cinerea interne bifida, denique fusco cinereo fuluoque variae punctis argenteis numerosis. Caput et pedes alba punctis fusco argenteis. Abdomen fuscum.

*Larua* viridis lateribus flauescentibus rete fabricat et metamorphosin sалиens sub terra se condit.

113. P. alis atris: macula magna communis strigis atomisque coerulescenti argenteis. *Sehestediana.*
114. P. alis fuluis apice nigris fuluo maculatis. *Koenigana.*
115. P. alis fuscis: maculis duabus aureis. *aurana.*
116. P. alis nebulosis postice macula rubra aurea. *pomana.*  
Wien. Verz. 126. 10.
117. P. alis testaceis: fasciis punctisque argenteis: medio litura atra. *Schulzia-na.*
118. P. alis griseo fuscis: punto medio albo: pupilla *Lipsiana.* atra.  
*Phalaena Lipsiana* Wien. Verz. 129. 9.  
Habitat Liptiae Mus. Dom. Schieffermyller.  
Media. Alae anticae griseo fuscae atomis paucis nigris. In medio alae punctum orbiculatum album pupilla atra. Posticae cinereae.
119. P. alis fuscis: fasciis tribus cinereis; secunda introrsum bifida. *riuellana.*  
*Phalaena undulana* Wien. Verz. 131. 22.
120. P. alis fusco alboque variis: margine exteriori albo punctata. *abietana.*  
Habitat in Sueciae Abiete Dom. de Paykul.  
Media. Caput et thorax fusca, Alae anticae fusco alboque variegatae costa sola punctis distinctis albis.
121. P. alis fuscis: fasciis tribus cinereis; secunda extorsum bifida. *undana.*  
*Phalaena riulata* Wien. Verz. 131. 21.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

*Affinis* P. riuellanae at duplo minor et fascia secunda extrorsum bifida.

*vnguica*. 122. P. alis cinereis subfasciatis apice acuminato recurvatis: margine exteriore postico transuerso albo striatis.

*Scopolia-* 123. P. alis fuscis: arcubus duobus dorsalibus albis.  
*na.* *Phalaena Scopoliana* Wien. Verz. 129. 11.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

*Magna.* Caput et thorax fusca. Alae anticae ferrugineae fuscae. In medio arcus magnus dorsal is albus, et versus apicem alias magis cinereus minusque arcuatus. Liturae aliquot paruae albidae ad costam.

*dorsana*. 124. P. alis fuscis: arcu dorsali albo apiceque strigis argenteis.

*Phalaena lunulana* Wien. Verz. 127. 14.

*strigana*. 125. P. alis flavescentibus apice strigis ferrugineis argenteisque: puncto triplici atro.

*Phalaena politana* Wien. Verz. 129. 16.

*Phalaena Hohenwartiana* Wien. Verz. 129. 15.

Habitat in Hyperico quadrangulo Dom. de Paykull.

Variat alis fuscis et flavescentibus semper tamen strigis punctisque apicis.

*Lundana*. 126. P. alis basi fuscis: linea semicirculari pallida apice auratis: margine crassiori argenteo flavoque strigato.

*Phalaena Badiana* Wien. Verz. 126. 8. ?

*Cynosba-* 127. P. alis anticis fuscis apice albis.

*Phalaena roborana* Wien. Verz. 131. 34.

*Mygin-* 128. P. alis anticis griseis: strigis posticis fuluis.

*Phalaena Mygindana* Wien. Verz. 131. 28.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

*Media.* Corpus cinereum. Alae anticae cinereae ponere medium strigis aliquot distinctis fuluis. Posticae obscure cinereae.

*tripun-* 129. P. alis anticis fuscis apice albis: margine punctisque tribus distinctis fuscis.

*Phalaena tripunctana* Wien. Verz. 131. 35.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

*Statura omnino* P. Cynosbanae. Alae anticae basi fuscis apice albæ margine tamen postico fusco. Ante marginem interne maculae duas fuscae et inter has et marginem punctata tria fusca.

130. P. alis fuscō rufoque variis: striga dorsali abbreviata alba. *Mitterbachiana.*  
*Phalaena Mitterbachiana* Wien. Verz. 129. 17.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
 Parua. Alae anticae fuscō rufae. In medio striga communis dorsalis abbreviata alba. Margo exterior et posticus albo litorati.
131. P. alis fuscis argenteo subfasciatis. *refinana.*  
 Wien. Verz. 128. 14.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
 Parua. Corpus fuscum. Alae anticae fuscæ macula magna oblonga baseos ad marginem interiorem et alia versus apicem orbiculata flavis. Posticae nigricantes.
132. P. alis fuscis; maculis duabus flavis. *mediana.*  
 Wien. Verz. 128. 14.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
 Parua. Corpus fuscum. Alae anticae fuscæ macula magna oblonga baseos ad marginem interiorem et alia versus apicem orbiculata flavis. Posticae nigricantes.
133. P. alis anticis fuseis apice cinereis: maculis duabus ferrugineis. *achatana*  
*Phalaena achatana* Wien. Verz. 131. 27.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
 Media. Caput et thorax fuscæ. Alae anticae basi fuscæ immaculatae apice cinereæ maculis duabus magnis ferrugineis, altera ad marginem tenuiorem ante apicem, altera in ipso apice marginis crassioris. Costa albo punctata. Posticae cinereæ.
134. P. alis depressis fuscis: punctis tribus centralibus *applanata.*  
*Phalaena punctata* Clerk. Icon. tab. 2. fig. 15.
135. P. cinerea, alis depressis: disco communi baseos atro. *Boebera-*  
*Phalaena nisella* alis superioribus cinereo nebulosis: *na.*  
 macula communi ouata nigra. Linn. Syst. Nat. 2. 288.  
 374. In Sv. 1377.  
 Habitat in Daniae Quercu Dom. Lund.  
 Statura et magnitudo P. applanae. Antennæ albo nigroque annulatae. Caput et thorax cinerea, immaculata. Alae anticae a basi ultra medium interne nigrae margine exteriori cinereo, apice cinereæ margine obscuriore. Corpus cinereum, pedibus nigricantibus.
136. P. alis depressis griseis: anticis subtus fuscis. *Heracleana.*  
 Schaeff. Ins. 1758. tab. 2. fig. 3. 4. monogr.
137. P. alis depressis fuscis, capite thoraceque niueis. *depressana.*  
 156. TI.

156. TINEA. *Palpi quatuor inaequales.*  
*Antennae setaceae.*

*cerella.* 1. T. alis griseis postice emarginatis: dorso canaliculato fuscō.

*gigan-*  
*tella.* 2. T. alis anticis cinereo flauescens: posticis albis im-  
maculatis.

*Tinea gigantella* Wien. Verz. 135. 27.

Habitat in Austria Dom. Schieffermüller.

Magna in hoc genere. Palpi porrecti. Caput et tho-  
rax flauescens. Abdomen cinereum. Alae anti-  
cae cinereo flauescentes, immaculatae. Posticae albae.

*colonella.* 3. T. alis oblongis cinereis: punctis duobus atris ante  
strigam curvam undulatam obsoletam.

*Tinea colonella* Wien. Verz. 133. 1.

*fociella.* 4. T. alis oblongis cinereis antice albidis: striga undata  
nigra, postice obscuris striga undata nigra.

*Tinea tribunella* Wien. Verz. 319. 62.

*centu-*  
*riella.* 5. T. alis oblongis cinereis fuscō subfasciatis: macula fla-  
uescens.

*Tinea centuriella* Wien. Verz. 319. 63.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Statura praecedentis at paullo minor. Alae cinereae  
litura marginali in medio fusca, postice fascia una  
altera fusca et in hac macula magna flauescens.  
Posticae cinereae marginē fuscō.

*spissicella.* 6. T. alis oblongis griseis antennarum articulis duobus  
inferioribus incrassatis.

*gelatella.* 7. T. alis fuscō cinereis: anticis vitta alba.

*Tinea ligatella* Wien. Verz. 319. 60.

*euony-*  
*mella.* 8. T. alis anticis nivis: punctis 50 nigris. Wien. Verz.  
138. 18.

*padella.* 9. T. alis anticis plumbeis punctis 20 nigris. Wien. Verz.  
139. 19.

*plumbella* 10. T. alis anticis plumbeis: macula media punctis nu-  
merosis apiceque fuscis.

*Tinea plumbella* Wien. Verz. 139. 34.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Nimis affinis T. padellae. Differt tamen alis puncto medio maiori distincto et apice fuscis.

11. T. alis anticis albis: linea communis sinuato repanda *sequella*. maculisque lateralibus nigris.
12. T. alis anticis argenteis: lineola baseos arcuque communi dorsali fuscis. *nitidella*.

*Tinea nitidella* Wien. Verz. 137. 58.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua statura T. cornellae. Alae anticae argenteae nitidae lineola baseos lunulaque communi fuscis.

13. T. alis niveis; fascia punctisque numerosis fusco *cornella* aureis.

*Tinea sparsella* Wien. Verz. 141. 66.

14. T. alis luteis; anticis punctis nigris trifariis, thora irrorella. ee antice posticeque fuluo.

*Noctua irrorea* Wien. Verz. 68. 6.

Habitat in Lichene parietino aliisque.

*Larua hirta nigra* maculis dorsalibus rhomboidalibus lateralibusque oblongis flavis.

15. T. alis luteis: anticis nigro punctatis, posticis maculatis thorace atro. *roscida*.

*Noctua roscida* Wien. Verz. 68. 7.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Affinis T. irrorella at duplo minor. Corpus totum atrum ano solo fuluo. Alae anticae trifariam nigro punctatae, posticae maculis marginalibus fuscis.

16. T. alis anticis atris: punctis ferrugineis flavisque *pastulella*. numerosis.

*Phalaena punctella* Cram. Ins. 31. tab. 372. fig. L.

Habitat, — — — — —

Alae posticae pallescentes limbo nigro.

17. T. alis cinereis: punto medio strigaque punctorum *perlella*. abbreviata nigris.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Statura et magnitudo T. lutarella. Alae omnes supra pallide cinereae punto nigro in medio versus marginem interiorem: et pone hoc striga obliqua e punctis quatuor nigris, quae tamen marginem tenuorem haud attingit.

- linetella*. 18. T. alis albidis fusco lineatis apice strigis duabus fuscis.
- lutarella*. 19. T. alis supra luteis iminaculatis: anticis subtus limbo fuso.
- Noctua lutarella* Wien. Verz. 68. 3.  
Habitat in Europae Pino.
- Larua pilosa coerulescens nigro punctata: fasciisque abbreuiatis flavis albisque.*
- Variat interdum margine alae posticae aut supra aut vtrinque fuso. *Noctua unita* Wien. Verz. 68. 2. at vix distincta videtur.
- mesomella* 20. T. alis anticis pallidis: margine flavo punctisque duobus fuscis.
- Noctua eborina* Wien. Verz. 68. 5.
- guttella*. 21. T. alis atris: anticis punctis albis numerosis. Sp. Inf. App. 509.
- Tinea anthracinella* Wien. Verz. 319. 60.  
Habitat in Europae Sedo acri.  
Antennae pectinatae.
- Oxyacan-* 22. T. alis fusco nebulosis: striga albida marginaque postico albo.
- thella*.
- vinetella*. 23. T. alis anticis fuscis: lineolis tribus argenteis; intermedia longiori interrupta.
- Habitat Dresdae Mus. Dom. Romani.  
Statura omnino T. pinetellae. Palpi valde porrecti longitudine thoracis. Alae fuscae lineis tribus aut quatuor argenteis. Posticae tenuissimae, nigrae, valde fimbriatae.
- argyrella* 24. T. alis striatis argenteis fusco nitidulis.
- Tinea argyrella* Wien. Verz. 135. 28.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Magna. Caput et thorax argento nitida. Abdomen cinereum. Alae argenteae, fusco nitidae. Posticae cinereae.
- Pinetella*. 25. T. alis anticis flavis: maculis duabus albissimis; anteriore oblonga, posteriore ouata.
- \* Knoch. Beytr. 4. fig. 7.  
Wien. Verz. 134. 7.
- pratella*. 26. T. alis anticis cinereis: linea albissima postice ramosa apice striis obliquis.
- Tinea pratella* Wien. Verz. 135. 29.

27. T.

\* 1. Tab. 4 fig. 7.

27. *T. alis cinereis*: linea albissima margine postico nigro punctato. Wien. Verz. 134. 4. *pascuella*,  
*Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.*  
*Statura omnino praecedentis. Differt tamen alis anticis*  
*linea unica, siue vitta laete alba posicē latiore. Posticæ cinereæ.*
28. *T. alis cinereis*: linea unica albissima abbreviata. *cultella*,  
*Wien. Verz. 134. 9.*
29. *T. alis fuscis*: linea unica albissima. Wien. Verz. 134. 5. *margariella*,  
*Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.*  
*Statura omnino praecedentis. Differt tamen alis anticis*  
*linea unica, siue vitta laete alba posicē latiore. Posticæ cinereæ.*
30. *T. alis anticis fuscis*: linea unica interrupta albissima. *conchella*,  
*Tinea conchella* Wien. Verz. 134. 8. *falsella*,  
*Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.*  
*Affinis omnino praecedenti at linea albissima in medio*  
*interrupta maculas duas format fere ut in *T. pinctella*.*  
*Alae posticæ cinereæ.*
31. *T. alis anticis fuscō alboque variegatis*: posticis cinereis. Wien. Verz. 134. 16. *falsella*,  
*Habitat in Saxoniam Dom. Schieffermüller.*  
*Caput et thorax cinerea. Abdomen fuscum, nitidulum.*  
*Alae anticae striis fuscis albisque indistinctis,*  
*abbreviatis. Posticæ cinnereæ, immaculatae.*
32. *T. argentea*, antennis fuscō annulatis. *argenteella*,  
*Tinea perlella* Wien. Verz. 134. 11.
33. *T. alis anticis griseo fuscis immaculatis*. *tristella*,  
*Tinea tristella* Wien. Verz. 134. 17.  
*Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.*  
*Statura praecedentium. Corpus ut alae anticae griseo*  
*fuscæ, immaculatae. Posticæ cinereæ.*
34. *T. alis anticis flavis*: lateribus sanguineis. Wien. *carnella*,  
*Verz. 138. 13.*  
*Schaeff. Icon. tab. 247. fig. 2. 3.*
35. *T. alis anticis cinereis*: costa inaequali purpurascens- *Daphnella*,  
*te punctisque mediis atris.*  
*Tinea Daphnella* Wien. Verz. 136. 37.  
*Habitat in Austriae Daphne. Dom. Schieffermüller.*  
*Magna. Caput et thorax albida. Alae anticae cincereæ costa inaequaliter purpurascens. In medio liture fusa punctis duobus subocellaribus atris exte-*

riore minuto. Margo posticus atro punctatus. Posticae cinereae.

- strigella.* 36. T. alis anticis cinereo flavescentibus: striga marginali argentea.

*Tinea chrysonuchella* Wien. Verz. 134. 8.

Puncta aliquot atra ante marginem alae anticae.

- margi-*  
*nella.* 37. T. alis anticis griseis: margine crassiori albo, palpis porrectis incrassatis. Wien. Verz. 319. 65.

- mucro-*  
*nella.* 38. T. alis lanceolatis cinereis: vitta fusca.

*Tinea mucronella* Wien. Verz. 136. 45.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Magna. Palpi porrecti. Corpus cinereum. Alae anticae lanceolatae, acuminatae, cinereae vitta lata fusca ante marginem exteriorem. Posticae exalbidae.

- nigrella.* 39. T. nigra, alis fuscis, abdome rufo.

- maurella.* 40. T. nigra, alis anticis atris nitidulis.

*Tinea maurella* Wien. Verz. 142. 11.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Magna. Corpus nigrum. Alae anticae atrae, nitidulae, immaculatae.

- anella.* 41. T. alis anticis griseis: vitta obsoleta ferruginea punctisque duobus centralibus subocellatis.

*Tinea anella* Wien. Verz. 135. 30.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Magna. Caput et thorax cinerea, immaculata. Abdomen ferrugineum. Alae anticae griseae costa obscuriore. Vitta obsoleta ferruginea ante costam et in medio puncta duo albida annulo fusco cincta. Posticae cinereae.

- Fagella.* 42. T. alis anticis griseis: strigis atomisque fuscis.

*Tinea Fagella* Wien. Verz. 134. 34.

Habitat in Austriae Fago sylvatica Dom. Schieffernmyller.

Maior. Mas alis griseis striga antica posticaque punctisque mediis fuscis.

Femina alis anticis lanceolatis obscurioribus fusco irroratis.

- tryptella.* 43. T. alis griseis: linea dimidiata albissima strigaque posteriora undata argentea.

44. T. alis cinereis: strigis duabus angulatis fuscis argenteaque marginali.

45. T. alis coerulecentibus latere dorsali albis, thorace *salicelia*, cristato,

*Phalaena salicana* Wien. Verz. 131. 37.

46. T. alis niueis: latere dorsali fusco. *dorsella*.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Magna statura omnino T. *salicellae*. Corpus niueum,

Alae anticae niueae margine tenuiori in primis versus apicem late fusco.

47. T. alis coerulecenti cinereis; punctis vitta media *pusiella*. maculisque rhombeis contiguis atris.

*Phalaena pusiella* alis superioribus albis: punctis linearum communi longitudinali dentata atra, inferioribus nigris. Linn. Syst. Nat. 2. 884. 347.

*Phalaena pascella* Sp. Inf. 291. 8.

*Phalaena scalacella* Sp. Inf. 294. 28.

Wien. Verz. 140. 55.

48. T. alis fuscis; maculis albissimis; anteriore falcata *foenella*, posteriori veniformi.

49. T. alis anticis albidis; fasciis duabus tertiaque termini nigricantibus. Linn. Syst. Nat. 2. 885. 353. la.

Wien. Verz. 142. 7.

Habitat in Europae Crataego,

Magnitudo T. tapezellae,

50. T. alis anticis cinereis; fasciis duabus ferrugincis nigro marginatis. *palumbella*.

*Tinea palumbella* Wien. Verz. 138. 15.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller,

Magna. Corpus griseum. Alae anticae cinereae fasciis duabus cinereis, quarum anterior punctis duabus in medio strigaque postica notata, posterior antice striga vndata marginata. Posticae cinereae,

51. T. alis anticis fuscescentibus: strigis duabus lunulaque *abietella*, media pallida.

*Tinea abietella* Wien. Verz. 138. 16.

Habitat in Austriae Abiete Dom. Schieffermyller,

Statura magna praecedentis. Corpus griseum. Alae anticae fuscescentes strigis duabus vndaatis pallidis, quarum posterior antice nigro marginata. In medio

*lunula pallida. Margo posticus nigro punctatus. Posticæ cinereæ.*

*tetricella.* 52. *T. alis griseo fuscis nitidulis immaculatis.*

*Tinea tetricella Wien. Verz. 138. 22.*

*Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.*

*Magna. Alae omnes fusco nitidulae, immaculatae.*

*tapezella.* 53. *T. alis nigris postice albis, capite niveo.* Wien. Verz. 142. 13.

*pellionella* 54. *T. alis canis medio puncto nigro, capite griseo.*

*vestia-* 55. *T. alis cinereis: costa alba, apicibus adscendentibus plumosis.* Wien. Verz. 139. 40.

*sarcitella.* 56. *T. alis cinereis, thorace vtrinque puncto albo.* Wien. Verz. 139. 41.

*stigma-* 57. *T. alis sublinearibus ferrugineis: macula costali alba.*  
*tella.*

*limbella.* 58. *T. alis ciliatis exalbidis: limbo maculisque fuscis.*

*flauifron-* 59. *T. alis anticis fusco cinereis immaculatis, capite flavo.*

*Tinea flauifrontella Wien. Verz. 143. 22.*

*Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.*

*Magna. Caput flavum. Thorax et alae anticae cinereæ, immaculatae. Posticæ albidae.*

*mellonella* 60. *T. alis canis postice purpurascens: striga alba, scutello nigro apice candido.* Wien. Verz. 134. 2.

*cuculla-* 61. *T. alis argenteis: arcu dorsali fuso.*  
*tella.*

*arcella.* 62. *T. alis niveis: arcu eomuni maculisque duabus marginalibus fuscis.*

*a. butella.* 63. *T. alis russi: strigis argenteis; intermediis bifidis.*

*teffilla.* 64. *T. alis nigris: fasciis duabus remotissimis tessellatis.*

*clementella* 65. *T. alis anticis niveis: lineola baseos fascia media punctoque apicis nigris.*

66. T. alis cinereis: vitta fusca, palpis porrectis, anten- bicostellata.  
nis pilosis.  
*Tinea pyropella* Wien. Verz. 137. 53.
67. T. alis anticis testaceis: linea longitudinali alba. paranthe-  
*Tinea genistella* Wien. Verz. 137. 52.?  
sella.
68. T. alis linearibus testaceis, antennis mediocribus. elongella.  
*Tinea ciliella* Wien. Verz. 136. 51.
69. T. alis linearibus pallide testaceis rufo irroratis, hemedo-  
*Tinea hemedactyrella* Wien. Verz. 144. 41.  
ctyrella.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Parua. Statura praecedentium. Alae lineares, anti-  
cae testaceae apice rufescentes, posticae fuscae.
70. T. alis anticis linearibus fuscis: maculis tribus fiauis. cylindrel-  
la.
71. T. alis anticis linearibus testaceis: punctis quatuor punctella,  
fuscis.  
*Tinea alucitella* Wien. Verz. 144. 40.
72. T. alis fusco cinereis: lineola media fasciaque posti- undella,  
ca vndatis albis.
73. T. alis nigris: anticis striga argentea. cinctella.  
*Tinea ligulella* Wien. Verz. 319. 79.
74. T. alis nigris: margine tenuiori basi albis; punctis funcrella,  
duobus nigris.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Media. Alae anticae nigrae margine interiori ultra  
medium albo punctis duobus nigris distinctis. Ma-  
culta alba in medio marginis exterioris. Posticae ni-  
grae basi albae. Caput album puncto verticis nigro.  
Thorax albus punctis tribus anticis nigris.
75. T. alis nigricantibus: fasciis duabus; posteriore ob- leucatella.  
soletiore capite albis. Wien. Verz. 139. 42.
76. T. alis fusco argenteoque vndatis, posticis fuscis: strobilella  
margini albo. Wien. Verz. 135. 24.
77. T. alis griseo fuscis: anticis albo lineatis, posticis striatella.  
ciliatis immaculatis.

*Tinea striatella* Wien. Verz. 135. 26.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Caput et thorax nivea. Alae obscure griseae linea longitudinali alba a basi fere ad apicem ducta, alia obliqua breuis ad basin aliaque ad apicem. Posticæ pilis longioribus ciliatae, fuscae, immaculatae.

*pechinella.* 78. T. alis cinerascentibus: arcu puncto que dorsalibus albidiорibus.

Habitat in Suecia Dom. de Paykul.

Alae cinerascentes, nitidulae lunula media puncto que postico communibus albidis.

*Faemina* magis obscura.

*2 punctella.* 79. T. alis fusco cinereis: puncto marginali albo.

*4 punctella.* 80. T. alis fuscis: punctis duobus albidis.

*Tinea atrella* Wien. Verz. 140. 60.

*dodecella.* 81. T. grisea nigro punctata, alis pallido fasciatis: punctis trium parium fuscis.

*combrella* 82. T. alis fuscis: atomis albidis numerosis irroratis.

*Phalaena combrella* alis fuscis: atomis albis irroratis. Linn. Syst. Nat. 2. 902. 404. In Sv. 1422. Wien. Verz. 136. 39.

Habitat in Europæ Pino sylvestri.

*obscurella* 83. T. alis obscure fuscis nitidulis immaculatis.

Habitat in Sueciae Dom. de Paykul.

Parua tota obscure fusca, parum nitens, immaculata. Differt omnino a T. tetricella.

*fuscella.* 84. T. alis fusco cinereis: punctis duobus dorsalibus nigris.

*tripunctella.* 85. T. alis cinereis: punctis disci tribus fuscis.

*Tinea tripunctella* Wien. Verz. App.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media alae anticae cinereac, nitidulae punctis disci tribus fuscis 2. 1. Margo posticus nigro punctatus. Posticæ pallidiores. Caput, thorax anusque ferruginea.

86. T. alis fusco cinereis nitidulis immaculatis. Wien. *cinerella*.  
Verz. 138. 25.
87. T. alis nigris: basi maculaque marginali sulphureis. *brasseella*  
Wien. Verz. 138. 24.  
Habitat in ligno Carpini Betulae.  
*Larua* subpilosa 14 poda, cinerea, capite caudaque  
fuscis sub reticulo intra corticem Carpini.
88. T. alis anticis atris: lunulis duabus punctoque fla- *cuspidella*.  
uescentibus.  
*Tinea cuspidella* Wien. Verz. 140. 58.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Media. Corpus atrum thoracis margine antico flau-  
scente. Alae anticae atrae lunula baseos et apicis fla-  
uis et in posteriori hac punctum flauum. Posticae  
valde ciliatae nigrae.
89. T. alis anticis fuscis: disco flavo: punto subocella- *dimi-*  
*ri atro*. Wien. Verz. 141. 73. *diella*.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Parua. Caput et thorax flava. Abdomen fuscum. Alae  
anticae fuscae disco flexuoso flavo postice marginem  
exteriorem attirgente. Punctum paruum subocellatum  
atrum in medio alae.
90. T. alis fuscis: macula communi dorsali duplice alba. *trigonella*
91. T. alis fuscis: maculis duabus dorsalibus albis, capi- *musca-*  
te fuluo antennis pectinatis.. *rella*.  
*Tinea muscarella* Wien. Verz. 143. 28.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
Media. Caput fuluum antennis pectinatis fuscis. Alae  
fuscae maculis duabus communibus albis, anteriore  
maiore. Punctum paruum ad marginem exteriorem.
92. T. alis fuscis: macula rhombica nigra. *rhombovi-*  
*della*.
93. T. alis nigro albo argenteoque nebulosis, capite albo. *gemmaella*
94. T. alis fusco nitidulis: fasciis duabus albis; poste- *bifasciella*  
riore interrupta, capite rufo.  
Habitat in Dania Dom. de Sehestedt.

*Media.* Caput rufum. Alae anticae fuscae, nitidae fasciis duabus albis, anteriore ad marginem crassiore dilatata, posteriore e maculis duabus oppositis composita. Posticae cinereae, immaculatae.

*capitella.* 95. T. alis fuscis: maculis tribus flavescentibus, capite ferrugineo.

*rupella.* 96. T. alis fuso aureis: maculis quatuor marginalibus albis, capite rufo.

*Tinea rupella* Wien. Verz. 320. 45.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

*Media.* Caput rufum. Alae fuso aureae maculis quatuor magnis albis, duabus ad marginem exteriorem, duabus ad interiorem.

*praelatella.* 97. T. alis violaceis: striga punctisque duobus oppositis albis.

*Tinea praelatella* Wien. Verz. 320. 46.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Statura praecedentis. Alae violaceae, nitidulae striga media maculisque duabus versus apicem oppositis albis. Caput ferrugineum.

*sulphurella.* 98. T. fusca, capite, thorace alarum basi maculaque costali sulphureis.

*compositella.* 99. T. alis fuscis: macula dorsali communi argentea et strigis quatuor composita.

*minutella* 100. T. alis atris: maculis duabus ferrugineis suboppositis. Wien. Verz. 140. 50.

*Petirella.* 101. T. alis subgriseis: litura dorsali flava apiceque punctis tribus nigris. Wien. Verz. 136. 31.

*Listerella.* 102. T. antennis mediocribus albo annulatis, alis griseo fuscis: punctis apicis nigris. Linn. Syst. Nat. 2. 896. 432. In Sv. 1395. Wien. Verz. 139. 30.

Habitat in Europa.

Alae anticae griseo fuscae. Puncta aliquot nigra ad marginem posticum.

*Fuesrella.* 103. T. alis auratis argenteo subfasciatis: angulo ani macula atra; punctis tribus argenteis.

*Geoffroyella.* 104. T. alis flavescentibus argenteo striatis: maculis duabus sulphureis marginalibus, antennis mediocribus.

105. T. alis suscescentibus lineolis fasciaque albis. *Denisella:*  
*Tinea Denisella* Wien. Verz. 138. 23.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Statura omnino praecedentis. Palpi magni recurvi, albi margine fuscō. Alae anticae pallide fuscae lineolis duabus baseos, in medio fascia lata ad marginem crassiorē late bifida et versus apicem striga obliqua abbreviata albī. Posticae nigrantes, immaculatae.
106. T. antennis brevibus albo annulatis, alis lividis: *Mouffe-*  
*atomis oblongis fuscis.* Wien. Verz. 140. 57. *tella.*
107. T. alis fuscis: linea vñica aurea antrosum arcuata. *Albinella.*
108. T. alis auratis: strigis duabus argenteis. *Seppella.*
109. T. alis cinereis: strigis tribus abbreviatis lineolis- *Esperella.*  
 que duabus apicis argenteis fuso marginatis.
110. T. alis auratis: fasciis duabus punctisque tribus ar- *Goedar-*  
 genteis. Wien. Verz. 143. 29. *tella.*
111. T. alis nigris: fasciis tribus argenteis transuerse di- *Meria-*  
 uaricatis. Wien. Verz. 143. 31. *nella.*
112. T. alis nigris: fasciis quatuor argenteis arcuatis; se- *Wilkella.*  
 cunda recta,
113. T. alis auratis: strigis tribus nigro argenteis: tertia *Schieffer-*  
 externe bifida. *myllerella*
114. T. alis planis auratis: limbo atro punctisque argen- *Berg-*  
 teis numerosis. *straessella*
115. T. alis flaviis: fasciis quatuor argenteis; tertia super- *Lyone-*  
 ne bifida. *tella.*
116. T. alis albis: lineolis duabus argenteis posticeque *Bonne-*  
 vndatis. *tella.*
117. T. alis nigris: disco aureo; striga lineis duabus po- *Schaeffe-*  
 sticis punctisque tribus argenteis. Wien. Verz. 138. 21. *rella.*  
 Caput argento nitidum.
118. T. alis nigris: punctis albis sparsis, antennis albo *Scopolella*  
 annulatis. Linn. Syst. Nat. 2. 896. 434. Wien. Verz.  
 138. 12.
- Habitat in Europae hortis.  
 Alae nigrae punctis albis.
119. T.

- Stroe-* 119. *T.* alis atris: punctis quatuor argenteis maculisque  
*mella.* quatuor marginalibus flauis.
- Gleiche-* 120. *T.* alis planis atris: fascia media maculisque duabus  
*nella.* apicis oppositis argenteis.  
*Tinea metallella* Wien. Verz. 144. 34.
- cydoniella* 121. *T.* alis aureis: lineola baseos punctisque quatuor  
parium albissimis.  
*Tinea Cydoniella* Wien. Verz. 144. 35.  
Habitat in Pyro Cydonia Austriae Dom. Schieffermyller.  
Minuta. Alae anticae auratae lineola baseos punctis-  
que octo marginalibus per paria dispositis.
- Rhediella* 122. *T.* alis nigris apice fuluis: strigis interruptis ar-  
genteis.
- Herman-* 123. *T.* alis auratis: lineolis argenteis apice fuscis Spec.  
*nella.* Inf. App. 509.
- Roesella.* 124. *T.* alis nigro auratis: punctis nouum argenteis con-  
nexis submarginalibus. Wien. Verz. 143. 30.
- Leuwen-* 125. *T.* alis auratis: striga baseos punctisque quatuor op-  
*hockella.* positis argenteis.  
*Tinea Leuwenhockella* Wien. Verz. 141. 7.  
*Tinea Leuwenhockella* alis superioribus fuscis: fasciis  
duabus macula lineaque argenteis. Linn. Syst. Nat. 2,  
897. 457. In Sv. 1400.  
Habitat in Europae hortis Dom. Schieffermyller.  
Parua. Antennae nigrae ante apicem albae. Alae an-  
ticae aureae striga baseos paribusque duobus puncto-  
rum argenteorum. Apex alae nigricat.
- Linneella.* 126. *T.* alis fusco auratis; punctis quatuor argenteis ele-  
natis.
- Rajella.* 127. *T.* alis auratis: maculis septem argenteis; secunda  
tertiaque connatis. Wien. Verz. 143. 32.
- Forsté-* 128. *T.* alis fusco auratis: arcu dorsali lineolisque mar-  
*rella.* ginalibus argenteis, apice macula atra: pupilla ar-  
gentea. Sp. Inf. App. 509.
- Schrebe-* 129. alis auratis basi fasciis duabus maculisque duabus api-  
*rella.* cis argenteis nitidissimis.
- Kleman-* 130. *T.* alis auratis: strigis quatuor argenteis; posticis  
*nella.* duabus interruptis punctoque terminali atro. Sp. Inf.  
App. 509.

131. *T. alis auratis:* maculis fasciaque media purpureis. *Tunber-*  
*Habitat Kiliae Dom. Daldorf.* *gella.*
- Parua.* Corpus nigrum. Antennae breues nigrae. Alae  
 anticae aureae, nitidae. Maculae duae purpureae  
 ante medium ad marginem crassiorem. In medio fa-  
 scia lata purpurea ad marginem crassiorem bifida, ver-  
 sus apicem denique adhuc macula purpurea. Alae  
 posticae auratae, immaculatae.
132. *T. alis aureo argenteis:* apice obtuso vstulato sub- *Harri-*  
*ocellato.* *sella.*
133. *T. alis fusco argenteis:* fascia postica aurea. *[Drurella.]*
134. *T. alis pallide argenteis:* puncto terminali atro. *Crame-*  
*rella.*
135. *T. alis auratis:* lineola apicis maculisque septem mar- *Blancar-*  
*ginalibus argenteis.* *della.*
136. *T. alis rubro aureis:* macula communi flava. *fibulella.*  
*Tinea fibulella* Wien. Verz. 143. 33.  
*Habitat in Austria Mus. Dom. Schiefermyller.*  
*Minuta. Caput cum antennis brevibus nigrum. Alae*  
*anticae rubro aureae, nitidae macula magna com-*  
*muni flava.*
137. *T. alis anticis fusco cinereoque griseis:* striga alba. *exiguella.*  
*Tinea exiguella* Wien. Verz. 143. 21.  
*Habitat in Austria Mus. Dom. Schiefermyller.*  
*Minuta.*
138. *T. alis auratis postice atris:* fascia argentea. *aurella.*  
*Wien. Verz. 142. 9.*
139. *T. alis argenteis postice subcaudatis fusco striatis pun-* *Clerkella.)*  
*ctoque atro.*
140. *T. aptera laevis nigra.* *Liche-*  
*nella.*

**157. ALVCITA.** *Palpi* duo ad medium bifidi: lacinia interiori acu. issima.

*Antennae* Setaceae.

- Xylostella** 1. A. alis cinereo fuscis: vitta dorsali communi sinuata alba. Wien. Verz. 137. 54.  
*Tinea sisymbrella* Wien. Verz. 140. 46. vix differt.
- ephippella** 2. A. alis pallide auratis: vitta dorsali niuea; fascia aurea.  
*Tinea pruniella* Wien. Verz. 141. 75.
- dentella.** 3. A. alis fuscis apice falcatis: vitta dorsali communi unidentata alba.  
*Tinea harpella* Wien. Verz. 136. 50.
- syluella.** 4. A. alis flavo auratis; fasciis duabus fuscis obliquis.
- lucella.** 5. A. alis flavis immaculatis, capite thoraceque niueis.  
*Tinea antennella* Wien. Verz. 135. 19.
- alpella.** 6. alis flavis: maculis oliaceis.  
*Tinea alpella* Wien. Verz. 135. 21.  
 Habitat in Austriae mentosis Dom. Schieffermyller.  
 Statura omnino A. lucellae. Caput et thorax flava immaculata. Alae anticae flavae maculis aliquot oliaceis. Costa punctata. Posticae cinereae.
- flauella.** 7. A. alis fusco aureis: vitta abbreviata maculaque flavis.  
*Tinea majorella* Wien. Verz. 140. 1.  
 Habitat in ligno antiquo Querci.  
 Vitta alae anticae ad marginem interiorem.  
*Laruae* tres annos ante metamorphosin attingunt.
- vittella.** 8. A. alis cinereis: vitta dorsali margineque postico nigris. Wien. Verz. 136. 42.
- nyctemera-** 9. A. alis anticis niueis: vitta communi dorsali dentata  
**ella.** maculique costalibus atris.  
*Tinea nyctimerella* Wien. Verz. 130. 38.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Caput et thorax alba. Alae anticae niueae vitta dorsali dentata atrâ costaque atro maculata, ad basin litura, in medio macula magna punto albo, tunc macula transversa fere geminata et tandem lineola apicis. Posticae fuscac.

10. A. alis fusco nitidis: marginibus niueis. margi-  
nella.
11. A. alis fuscis: vitta communi dentata alba, thorace niueo: punctis duobus atris. 2 pun-  
cta. *tella.*  
*Tinea Echielia* Wien. Verz. 140. 54.
12. A. alis albo nigroque variis, capite niueo. Wien. *granella.*  
 Verz. 141. 77.
13. A. alis albidis apice fusco variis. Betuli-  
nella.  
 Habitat in Bolito betulino Sueciae Dom. de Paykull.  
 Statura omnino A. granellae at duplo maior. Caput et thorax albida. Alae postice adscendententes basi albidae apice variegatae.
14. A. alis niueis: maculis duabus marginalibus fasciaque niueella: nigris, capite albo.
15. A. alis pallidis: puncto nigro apice adscendentibus. *tappella.*  
 Wien. Verz. 142. 12.
16. A. alis anticis emarginatis sulphureis: strigis abbreviatis obscurioribus. *Perficella*  
*Tinea Perficella* Wien. Verz. 319. 67.  
 Habitat in Austriae Porsica Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Statura et magnitudo T. asperellae. Caput et thorax flava. Abdomen cinereum. Alae anticae apice emarginatae sulphureae strigis duabus abbreviatis marginis tenuioris obscurioribus. Posticae cinereae ciliis albis.
17. A. alis anticis albidis: maculis duabus communibus *asperella.* nigricantibus apice emarginatis.  
*Phalaena asperella* alis albidis: macula communi fusca, apicibus nigro punctatis retusis. Linn. Syst. Nat. 2. 891. 397. In Sv. 1447. Wien. Verz. 136. 46.  
 Habitat in Europa.  
 Media. Alae anticae albidae apice late emarginatae emarginatura fusca. In medio dorsi maculae duas communes fuscae. Posticae cinereae.
18. A. ninea, alis rufo auratis: macula costali baseos alba fusco punctata. *costella.*

*scabrella*. 19. A. alis fusco cinereis: punctis nigris eleuatis scabris.  
*Tinea bifissella* Wien. Verz. 319. 68.  
 Alae anticæ apice emarginatae.

*aristella*. 20. A. albida, alis linea argentea.

*caudella*. 21. A. alis subcaudatis testaceis: linea postica fusca.

*Enzen-bergella*. 22. A. alis emarginatis fuscis: vitta media argentea.  
 Habitat in Austria Dom. Saldoner.  
 Media. Palpi porrecti. Alae angustæ, fuscae vitta  
 media argentea, quæ tamen marginem posticum  
 haud attingit. In vitta hac lineolæ aliquot fuscae.  
 Margo posticus alae emarginatus. Posticae cinereæ,  
 inmaculatae.

*Swam-merdam-mella*. 23. A. alis pallidis immaculatis, antennis longissimis.  
 Wien. Verz. 141. 2.

*pilella*. 24. A. alis fuscescentibus immaculatis, antennis longissimis.  
*Tinea pilella* Wien. Verz. 142. 6.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.  
 Statura et magnitudo praecedentis. Antennæ albidae  
 bâsi flauescentes.

*Rober-tella*. 25. A. antennis longissimis albis, alis fuscis: angulo ani  
 albo.

*Frischella* 26. A. antennis mediocribus apice albis, alis fusco auratis.  
*Tinea aeneella* Wien. Verz. 319. 82.

*Erxle-bella*. 27. A. antennis mediocribus vnicoloribus, alis anticis fu-  
 sco aureis, posticis nigris, capite fuluo.  
 Habitat Goettingae Dr. Schulz.  
 Nimis affinis videtur A. Calthellæ. Antennæ medio-  
 cres, pallescentes. Caput fuluum. Thorax et alae  
 anticae fusco aureæ margine postico obscuro. Pe-  
 des postici longiores, fului.

*Calthella*. 28. A. atra, alis anticis totis aureis, capite ferrugineo.  
*Tinea rufimetella* Wien. Verz. 142. 16.

*promu-lella*. 29. A. antennis mediocribus, alis anticis fusco aureis,  
 posticis flauis: margine nigro.

*Tinea*

*Tinea promulella* Wien. Verz. 142. 17.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura et magnitudo A. calthellae distincta alis posticis  
flavis margine nigro.

30. A. alis atro aureis: fascia flava, antennis longis. Wien. Degee-  
Verz. 143. 21.

31. A. antennis mediocribus, alis nigris: fascia alba. Podaella.

32. A. antennis longioribus nigro aureis: fascia aurea. Sulzella.  
Linn. Syst. Nat. 2. 896. 427. Wien. Verz. 143. 24.

Habitat in Europa.

Nimis A. Degeerellae affinis. Antennae maris usque ad  
basin incrassatae, mediocres, feminae longissimae.

33. A. alis viridi aureis, corpore atro, antennis longis vindella.  
albis.

*Tinea vindella* Wien. Verz. 142. 4.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Vix satis ab A. Reaumurella distincta.

34. A. alis nigris extrorsum deauratis, antennis longissi- Reaumu-  
mis. Wien. Verz. 143. 22. mella.

35. A. alis cupro aureis nitidis, antennis longissimis. cuprella.

*Tinea cuprella* Wien. Verz. 320. 44.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Vix satis distincta ab A. Reaumurella. Differt tantum  
alarum colore rubro cupreo.

36. A. alis auratis: fascia fusca, antennis apice albis. fasciella.

*Tinea Schieffermyllerella* Wien. Verz. 142. 20.

37. A. alis auratis flavo striatis: fascia media flava cupro striatella.  
marginata.

38. A. alis anticis auratis: maculis duabus sulphureis op- sulphu-  
positis, posticis flavis. rrella.

39. A. aliis anticis ferrugineo flavis: strigis duabus ab- formo-  
breuiatis obliquis albis; posteriore maiore. sella.

*Tinea formosella* Wien. Verz. 140. 47.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Alae anticae flavo ferrugineoque variae. Stri-  
gae duae ad marginem crassiorem abbreviatae, obli-  
quae posteriore maiore. Posticae fuscae. Antennae  
albo annulatae.

- festiculla.* 40. A. alis anticis albis: maculis duabus fuscis apice flauis.  
*Tinea festiculla* Wien. Verz. 319. 80.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
 Parua. Palpi albi basi fusti. Caput niveum. Alae anticae fere lineares basi albae apice flavae in medio maculae duae fuscae annulo albo cinctae una pone alteram. Posticae fuscae.
- oppositella.* 41. A. alis fuscis: maculis duabus oppositis flauis, posticis fuscis.

158. PTEROPHORVS. *Palpi duo lineares.*

*Lingua exserta membranacea.*

*Antennae setaceae.*

- monodactylus.* 1. P. alis patentibus linearibus indiuisis!
- ochrodactylus.* 2. P. alis patentibus linearibus indiuisis: anticis griseis, posticis nigris.  
*Alucita ochrodactyla* Wien. Verz. 145. 1.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
 Parua. Abdomen basi rufescens. Alae immaculatae.
- didactylus.* 3. P. alis fissis fuscis: strigis albis, anticis bifidis, posticis tripartitis Wien. Verz. 145. 2.
- calodactylus.* 4. P. alis fissis fuscis: anticis subfalcatis fissis fuluo maculatis, posticis tripartitis.  
*Alucita calodactyla* Wien. Verz. 146. 4.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.  
 Statura praecedentium. Alae anticae cinereo fuscae apice obscuriores macula magna fulua. Margo interior dentatus, posticus fissus. Posticae tripartitae nigrae. Pedes albo annulati.
- tridactylus.* 5. P. alis fissis pallidis: lineis albidis, anticis bifidis, posticis tripartitis.
- rhododactylus.* 6. P. alis fissis flavescentibus: strigis albis, anticis bifidis, posticis tripartitis.  
*Alucita rhododactyla* Wien. Verz. 146. 5.

Habi-

Habitat in Saxoniae Rosis Dom. Zschuck.

Alae anticae flavae basi obscuriores strigis duabus albis anteriore obliqua usque ad strigam posteriorem fissae. Posticae tripartitae lobis duobus anterioribus flavescentibus, tertio albo macula magna ante apicem ferruginea. Corpus ferrugineum thoracis lateribus flavescentibus.

7. P. alis patentibus fissis cinereo nebulosis, posticis fuscis nebulosis. tefferadatylus.

*Alucita leucodactyla* Wien. Verz. 146. 7. ?

8. P. alis patentibus fissis testaceis: puncto fuscō. Wien. pterodatylus. Verz. 146. 6.

9. P. alis fissis albido fuscō maculatis: anticis fissis, posticis tripartitis. migadatylus.

*Alucita migadatyla* Wien. Verz. 146. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

- Statura praecedentium. Corpus album. Alae anticae albidae fuscō maculatae, posticae fuscæ. Pedes albi fuscō maculati.

10. P. alis niueis: anticis bifidis, posticis tripartitis. Wien. pentadatylus. Verz. 146. 9.

Schaeff. Icon. tab. 214. fig. 4.

11. P. alis fissis cinereis: singulis sexpartitis. Wien. Verz. hexadatylus. 146. 10.

## CLASSIS VII.

## R Y N G O T A.

159. FVLGORA. *Os rostro elongato: vagina quinque articulata.*

*Antennae breues, capitatae.*

- laterna- 1. F. fronte rostrata recta, aliis liuidis: posticis ocellatis. Stoll. Cicad. tab. 1. fig. 1.
- serrata. 2. F. fronte rostrata adscendente quadrifararie ferrata.
- diadema. 3. F. fronte rostrata muricata, apice trifido, aliis nigris rubro marginatis.
- Fulgora armata Drury Ins. 3. tab. 50. fig. 4.  
Stoll. Cicad. 1. tab. 5. fig. 22.
- candela- 4. F. fronte rostrata adscendente, elytris viridibus luteo maculatis, aliis flauis apice nigris.
- phospho- 5. F. fronte subulata rostrata adscendente, corpore griseo glauco.
- noctuina. 6. F. fronte rostrata acuminata adscendente, corpore vi-  
ridi, aliis hyalinis.
- lucerna- 7. F. fronte rostrata prominente, corpore supra viride-  
scente subitus flauo.
- flammea. 8. F. fronte rostrata adscendente tereti truncata. Stoll.  
Cicad. tab. 2. fig. 7.
- tenebrosa 9. F. fronte rostrata recta truncata, elytris griseis scabris.
- obscurata 10. F. fronte rostrata recta truncata, elytris cinereis ni-  
gro maculatis. Stoll. Cicad. 1. tab. 6. fig. 28.
- adscen- 11. F. fronte rostrata subulata adscendente, elytris ferru-  
dens. gineo fuscis albo punctatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parua. Rostrum porrectum subulatum supra nigrum,  
subitus flauum. Caput subitus flauum strigis duabus  
obliquis nigris, supra linea dorsali nigra. Thorax

ob-

obscurus. Elytra ferrugineo fusca punctis paruis numerosis albis. Alae hyalinae. Corpus flauum abdominis limbo supra nigro.

12. F. fronte rostrata adscendente, elytris ferrugineo fuscis: fasciis duabus punctoque postico viridibus.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino praecedentis et forte mera eius varietas. Caput conicum, sulcatum apice rostratum, flauum dorso fuso. Thorax obscurus. Elytra ferrugineo fusca fasciis duabus punctoque marginali versus apicem viridibus. Corpus flauum abdomine supra rufo.

13. F. fronte obtusiuscula, alis truncatis viridibus. *truncata.*

14. F. fronte porrecta plana flavescentia, thorace elytris planaque ferrugineis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parua. Caput porrectum, supra planum, flavescentia margine parum ferrugineo, subtus vniuersitatum. Thorax ferrugineus margine antico flauo. Elytra ferruginea apice hyalina. Alae hyalinae, nitidae. Corpus flauum abdomine supra ferrugineo.

15. F. fronte porrecta plana, elytris viribus apice hyalinis. *pallipes.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino praecedentis. Caput porrectum planum, nigrum margine omni albido. Thorax virescens litura antica nigra. Elytra laevia, viridia basi parum flavescentia apice hyalina et ante apicem striga macularum nigrarum. Abdomen supra fuluum anno nigro, subtus flauum. Alae hyalinae. Pedes pallidi.

16. F. fronte conica inaequali, elytris hyalinis: striga *hyalinata* atra.

17. F. fronte conica, elytris fuscis: margine exteriori *festiva*. virescente, punctis nigris fulvisque, alis basi rubris.

18. F. fronte conica bisulcata, elytris hyalinis; macula *fenestrata* marginali fusca.

19. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticulatis. Stoll. Cicad. I. tab. II. fig. 51.

*minuta*. 20. F. fronte conica, capite thoraceque flavescentibus: linea dorsali, elytris albidis.

Habitat Halaë Saxonum Dom. Hybner.

Parua statura. Cicadae at omnino huius generis. Antennae breues, crassae, extrorsum crassiores. Corpus totum flavescentia linea capitis thoracisque dorsali alba. Elytra pallida.

160. MEMBRACIS. *Labium* corneum elongatum apice membranaceum, subulatum.

Antennae subulatae fronti insertae.

*inflata*. 1. M. thoracis folio inflato testaceo reticulato.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Magnitudo et statura M. foliatae. Thoracis folium magnum, inflatum, inane, pellucidum, testaceum nervis obscurioribus reticulatum punctisque septemnigris utrinque notatum. Corpus flavescentia. Elytra hyalina margine tenuiori obscuriori.

*rhombea*. 2. M. foliacea, folio rhombeo postice latiore.

*fronditia*. 3. M. thorace foliaceo: dorso repando sinuato apice porrecto obtusissimo. Stoll. Cicad. I. tab. 6. fig. 3. A. B. C.

*foliata*. 4. M. thorace foliato rotundato flavo: fascia maculaque atris. Stoll. Cicad. tab. I. fig. 2.

*lunata*. 5. M. thorace foliaceo rotundato atro: lunulis tribus albis. Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino M. foliatae at minor et alia. Corpus totum atrum. Thoracis folium magnum, compressum, rotundatum, atrum lunulis tribus albis, quarum posteriores interdum connatae.

*fasciata*. 6. M. thorace foliaceo rotundato atro: fasciis duabus: anteriore fulva, posteriore alba.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Thoracis folium elevatum, compressum, rotundatum, postice acutum, atrum antice

ticē fascia latissima fulua, postice fascia minori alba. Corpus atrum, immaculatum. Tibiae posticæ ferratae.

7. M. thorace foliaceo viridi immaculato. *bracteata*.  
Habitat Cajennaē Dom. v. Rohr.  
Parua. Thoracis folium eleuatum, compressum, antice obtusum, postice acutum, viride, immaculatum. Corpus flauescens, Elytra alaeque albo hyalina, immaculata.
8. M. thorace foliaceo antice posticeque acuto griseo. *squamigerā*.  
9. M. thoracis cornu supra caput porrecto compresso carinato, corpore griseo. *haftata*.  
Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.  
Corpus parnum omnino griseum. Thorax antice valde porrectus, compressus, carinatus apice truncatus, postice longitudine abdominis.
10. M. thoracis cornu supra caput porrecto incuruo, corpore atro: maculis duabus dorsalibus albis. *lanceolata*.  
Habitat Cajennaē Dom. v. Rohr.  
Parua. Thorax supra caput valde porrectus, compressus, incuruuus, postice productus, acutus, ater maculis duabus dorsalibus albis. Corpus atrum, immaculatum. Tibiae anticae valde compressæ.
11. M. thorace tricorni postice producto longitudine *spinosa*.  
alarum.
12. M. thorace tricorni: cornu intermedio longiori compresso. *acuminata*.
13. M. thorace biaurito, capitis clypeo antrorsum dilatato rotundato. *aurita*.
14. M. thorace bicorni postice producto abdōmine longiori atro: margine flauescente. *marginalis*.  
Stoll. Cicad. I. tab. II. fig. 53. B.  
Habitat in China.  
Magna in hoc genere. Thorax porrectus antice cornubus duobus porrectis, arcuatis postice productus abdōmine longior subnatus, niger margine exteriori flauescente. Alae fuscae.

- horrida.* 15. *M. thorace bicorni postice producto bicalvato apice trispinoso.*  
*Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*  
*Media.* Caput nigrum lineis tribus flavidantibus. Thorax antice gibbus spinis duabus elongatis acutis, ater margine albo, postice valde productus, niger bicalvatus vel in medio et apice tuberculo magno elevato, globoso, apicis spinis tribus elongatis acutis ante apicem albis. Elytra obscure hyalina. Pedes picei.
- trifida.* 16. *M. pilosa, thorace quadricorni postice producto trifido: laciniis subulatis.*  
*Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*  
*Magnitudo M. Tauri.* Caput atrum linea media alba. Thorax pilosus, antice gibbus, ater linea media lateralique interrupta albis. Cornua duo elongata, arcuata, acuta in margine antico et pone haec duo alia breviora erecta basi connata, postice valde productus, fornicatus, trifidus laciniis distantibus subulatis acutis, intermedia longiore. Elytra albo hyalina fascia media fusca et in hac punctum hyalinum. Abdomen coccineum ano nigro.  
*Larva* testacea spinis plurimis dorsalibus nigris.
- clavata.* 17. *M. thorace quadricorni postice producto trifido: laciniis lateralibus ante apicem clavatis.*  
*Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*  
*Parua.* Caput nigrum ore flauescente. Thorax niger antice cornibus duobus porrectis arcuatis acutis et pone haec duo breviora basi connata, postice productus, fornicatus, trifidus laciniis distantibus intermedia longiori, subulata, lateralibus ante apicem clava valida, ouata. Elytra albo hyalina. Abdomen pallidum ano obscuriore. Pedes flauescentes.
- punctata.* 18. *M. thorace bicorni albo punctato postice producto abdome longiori.*
- cornuta.* 19. *M. thorace bicorni nigro postice subulato longitudine abdominis, alis fuscis.*
- Taurus.* 20. *M. thorace bicorni fusco postice producto filiformi longitudine abdominis, cornibus arcuatis.*

21. M. thorace bicorni viridi: arcu lineolaque albis, postice subulato longitudine abdominis, alis albis. *Vitulus.*
22. M. thorace subinermi postice producto, abdomine 2 puncta- breuiore testaceo, elytris macula baseos nigra. *ta.*
23. M. thorace bicorni postice producto, margine albo, *Bonasia.* alis puncto baseos flauo.
24. M. thorace inermi laeui virescente: margine flauo, *conuoluta* postice producto abdomine longiori.
25. M. thorace inermi ferrugineo postice producto ca- *mutica.* rinato longitudine abdominis,
26. M. thorace inermi virescente postice subulato longi- *inermis.* tudine abdominis.
27. M. thorace inermi fusco postice producto abdomine *Genistae.* dimidio breuiore.

161. *TETTIGONIA.* Os rostro vagina biarticulata gulae inserita.

*Antennae fataceae.*

1. T. thorace viridi nigro sublineato, alis albis posticis *grosso.* macula baseos flaua.
2. T. capite thoraceque nigris rufo maculatis, elytris ni- *fasciata.* gris: fascia abbreviata alba.  
Stoll. Cicad. I. tab. 4. fig. 17.  
Habitat in Iava.
- Magna. Caput nigrum lunulis duabus rubris. Thorax niger maculis duabus marginis anterioris rufis. Elytra nigra fascia lata alba, quae tamen marginem exteriorem haud attingit. Alae atrae, immaculatae. Abdomen brunneum.
3. T. grisea elytris aqueis: margine postico nigro pun- *grisea.* etato, costa antice alba.
4. T. thoracis margine dilatato acuto, alis atris: margi- *limbata.* ne albo.  
Stoll. Cicad. I. tab. 12. fig. 57.

- O dilatata.* 5. T. thoracis margine dilatato atra, alis albidis.
- O spinosa.* 6. T. thorace vtrinque vni spinoso fuscā, elytris obscuris: striga maculari nigra.  
Habitat in Sumatra Mus. Dom. Banks.
- Magna. Corpus fuscum vix maculatum. Thorax margine parum dilatato spinaque parua acuta armato. Squamae abdominales elongatae longitudine fere abdominis oblongo ovatae, testaceae basi spina valida incubente acuta armatae. Alae obscurae neruis nigris et ante marginem maculae quatuor, quarum tres exteriōres concatenatae fere strigam constituant.
- O vaginata.* 7. T. testacea, elytris albidis: costa nigra.  
Habitat in Sumatra Mus. Dom. Banks.
- Corpus magnum, testaceum, immaculatum. Elytra obscure albida, immaculata at costa atra. Squamae abdominales elongatae fere longitudine corporis ovatae, fornicatae, testaceae basi spina valida acuta incubente armatae.
- O Tibicen.* 8. T. scutello emarginato, alarum costa virescente.
- O septende-*  
*cim.* 9. T. nigra, elytris albis; costa flava.
- O catena.* 10. T. thorace variegato, elytris hyalinis antice neruis punctatis, postice strigis duabus vndatis fuscis.
- O pustulata.* 11. T. atra, capite thoraceque rubro maculatis, elytris fuscis basi obscurioribus: venis testaceis.  
Habitat in America meridionali Dom. Vahl.
- Magna. Caput atrum maculis tribus frontalibus rubris. Thorax ater margine antico lateralibusque rubro maculatis. Abdomen atrum segmentorum marginibus maculis duabus testaceis. Anus testaceus. Pedes atri femoribus macula testacea. Alae omnes obscurae basi obscuriores venis testaceis.
- O maculata.* 12. T. atra, thorace elytris aliquo flavo maculatis.
- O stridula.* 13. T. villosa elytris griseis, alis flavis omnibus margine hyalino.
- O cingulata.* 14. T. thorace maculato, elytris hyalinis: costa maculaque fuscis, abdome atro; fasciis flavis.

15. T. thorace fusco viridique variegato, pectore albo *villoso*: villoso.
16. T. thorace variegato, elytris hyalinis: costa flave- *cruentata* ○  
scente, abdomine atro: fasciis sanguineis.
17. T. atra, elytris basi flavo maculatis, ano flauo. *confusa* ○
18. T. nigra immaculata, abdominis incisuris sanguineis, *haemato-* ○  
Stoll. Cicad. tab. 2. fig. II. *des*.
19. T. elytris intra marginem punctis sex concatenatis *Orni*. ○  
anastomosis interioribus fuscis.

*Larua edulis.*

20. T. elytris linea flexuosa, alis margine hyalino. *repanda*. ○
  21. T. grisea, thoracis linea alba, elytris albo reticulatis. *reticulata* ○
  22. T. atra, alis albis basi nigris: venis testaceis. *atrata*. ○
  23. T. nigra abdomine sanguineo, elytris alisque testa- *testacea*. ○  
ceis: venis nigris.
- Stoll. Cicad. I. tab. 8. fig. 41. C.

Habitat Tranquebariae.

Media. Caput et thorax nigra immaculata. Abdomen  
omnino sanguineum. Alae omnes testaceae venis  
nigris.

24. T. nigra ore thoracis maculis duabus abdomineque *sanguino-* ○  
*lenta*. fuscis.
25. T. elytris fusco aureis, tibiis anticis incrassato denta- *splendi-* ○  
*dula*. rufis.
26. T. elytris hyalinis: costa sanguinea, abdomine linea *muta*. ○  
dorsali sanguinea.
27. T. violacea, alis apice fuscis. *violacea*. ○

○ 162. CICADA. *Os labio rotundato apice se-*  
*taceo.*

*Antennae filiformes sub ocu-*  
*lis insertae.*

perspicil- 1. *C. atra*, alis macula ocellari albo hyalina, abdomen  
*lata.* apice flauo.

Stoll. Cicad. I. tab. I. fig. 5.

ocellata. 2. *C. elytris compressis adscendentibus viridibus: punctis*  
*ocellaribus ferrugineis.*

limbata. 3. *C. elytris deflexis viridibus: margine rubro; interiori*  
*basi nigro punctato.*

margi- 4. *C. flava, elytris deflexis nigris: linea laterali alba.*  
*nata.*

phalaenoides. 5. *C. exalbida, alis deflexis patulis, elytris antice nigro*  
*punctatis.* Stoll. Cicad. tab. 2. fig. 9.

bipunctata. 6. *C. exalbida, elytris deflexis, thoracis margine antico*  
*punctis duobus impressis.*

retusa. 7. *C. exalbida immaculata, capite antice retuso.*  
*Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*

*Statura et magnitudo praecedentium. Corpus totum*  
*exalbidum, immaculatum. Caput antice obtusum,*  
*truncatum margine eleuato.*

grisea. 8. *C. grisea, elytris deflexis, capite apice punto nigro.*

3 punctata. 9. *C. elytris deflexis viridibus, punctis tribus albidis.*

viuida. 10. *C. viridis, elytris deflexis, alis albis, fronte conica.*

minuta. 11. *C. elytris deflexis viridibus: dorso scabro, capitis*  
*margine postico thoraceque linea dorsali sanguinea.*

eunicula- 12. *C. alis deflexis hyalinis: striga fascia punctisque fu-*  
*rcis, ano lunato.*

*Omnis praecedentes forte proprii generis.*

lanata. 13. *C. elytris apice nigris: punctis coeruleis, frontis la-*  
*teribus rubris, ano lunato.*

Stoll. Cicad. I. tab. 10. fig. D. 49.

14. *C. elytris deflexis viridibus fulvo subfasciatis, alis ali- tomentosa* o  
bis: fasciis duabus atris.
15. *C. fusca, abdomine virescente, ano lanato niueo. barbata.*
16. *C. atra, thorace maculis quatuor griseis, abdominis atrata.* o  
margine flavo: punctis niueis.
- Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Statura et magnitudo *C. lanatae*. Caput nigrum anten-  
nis sub oculis insertis testaceis. Thorax niger ma-  
culis quatuor dorsalibus griseis. Elytra atra, imma-  
culata. Alae nigrae macula magna ante apicem albo  
hyalina. Abdomen nigrum margine flavo punctis  
niueis. Segmentorum margines etiam flavi. Pedes  
nigri genubus flavis.
17. *C. capite thorace scutelloque nigro punctatis, elytris ferrugi- O*  
neis, alis atris.
- Habitat in Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.
- Media. Caput glaucum fascia ad basin rostri puncto  
frontis et verticis atris. Thorax subcinereus puncto  
antico duobusque posticis cum scutello communibus  
atris. Scutellum concolor punctis duobus baseos  
communibus solitarioque versus apicem atris. Alae  
ferrugineae apice parum dilutiqres. Corpus vti et  
alae nigrum.
18. *C. nigra, elytris apice cinereo hyalinis. obtusa.* o
- Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Statura omnino *C. ferruginea*. Caput obtusissimum.  
thoraxque nigra, immaculata. Elytra nigra apice  
cinereo hyalina. Alae hyalinae. Corpus nigrum  
abdomine subtus pallido auro nigro.
19. *C. capite thoraceque rufis, elytris fuscis apice ci- aurulenta* o  
nereis.
- Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Statura et magnitudo praecedentium. Caput rufum  
puncto verticali nigro. Thorax rufus fascia lata  
fuscata. Elytra complicata fusca apparent at expansa  
rufo griseoque variegata, apice cinerea. Alae ob-  
scureae. Abdomen rufum. Pedes fusi.
20. *C. capite thorace fusco aureis nigro variis, elytris lyncea.* o  
hyalinis apice obscurioribus: macula aurea.
- Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statu-

Statura praecedentium. Caput obscure aureum lineola media punctoque lateralí nigris. Thorax aureus lineola antica fascia media margineque postico nigris. Elytra hyalina nigro neruosa apice obscuriores macula magna aurea annulo atro cincta. Corpus fuscum femoribus posticis flauis.

*villosa.* 21. C. viridis, elytris deflexis exalbidis, ano lanato.

*elongata.* 22. C. thorace rubro flauo lineato, elytris longissimis nigro punctatis.

*vittata.* 23. C. flava vitta ferruginea longitudinali duplice repando dentata.

*lateralis.* 24. C. nigra, elytris latere albis.

*variegata* 25. C. supra nigra, scutello elytrorum maculis duabus dorsalibus margineque exteriori flavescentibus.

*fenestrata* 26. C. supra nigra, capite scutelloque flavis, elytrorum margine hyalino.

*flavipes.* 27. C. nigra, capite pedibusque flavis, elytris apice hyalinis nigro striatis.

Habitat in Insula Rotterdam Mus. Dom. Banks.

Statura, magnitudo et summa affinitas C. fenestratae. Caput obtusum, siccum, postice nigrum. Thorax et scutellum atra, immundicula. Elytra atra macula baseos ad marginem exteriorem hyalina apiceque hyalina nigro striata. Corpus nigrum pedibus omnibus flavis.

*leuco-* 28. C. nigra oculis albis.

*phtalmia.* 29. C. capite thoracisque basi flavescentibus.

*leucoce-* 30. C. elytris flavis: linea nigra duplice longitudinali in-  
*phala.* terrupta.

*inter-* 31. C. pallida capite thoraceque nigro punctatis, elytris  
*rupta.* lineatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino C. interruptae. Caput et thorax pallida punctis plurimis sparsis nigris. Elytra pallida lineis

lineis varie anastomosantibus nigris. Pedes pallidi femoribus fascia nigra.

32. C. flauescens, elytris cinereis: vitta abbreviata atra. *abbreuiata.*  
Habitat Hafniae Dom. Lund.

Statura praecedentium. Caput et thorax flauescens, immaculata. Elytra cinerea vitta fere marginali a basi ultra medium ducta, margineque anguli ani atris. Abdomen pectusque disco atro. Pedes flauescentes.

33. C. nigra capitis margine postico thoraceque flavis. *flavicollis.*

34. C. elytris viridibus capite flavo: punctis nigris. *viridis.*  
Variat rarius elytris coerulecentibus.

35. C. supra nigra nitida: punctis coerulecentibus. *laeta.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Minor C. viridi. Caput et thorax subtus flauescens, supra nigra macula magna vtrinque bifida, coerulecente. Elytra nigra nitida punctis tribus coerulecentibus et postico marginali antice coccineo postice flauescente. Abdomen et pedes flauescens anno coccineo.

36. C. elytris rufescens: maculis duabus viridibus apice hyalinis. *guttata.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Media. Caput rufum punctis quatuor paruis nigris. Thorax virescens margine antico rufo. Elytra laetitia nitida rufescens maculis quatuer magnis quadratis viridibus apice hyalinis. Abdomen supra rufum. Subtus vti et pedes flauescens.

37. C. nigra, capitis thoracis elytrorumque margine coccineis. *marginalis.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parua. Caput nigrum margine coccineo. Thorax niger margine coccineo. Elytra nigra nitidula margine exteriori laete coccineo. Corpus nigrum tibiis pallescentibus.

38. C. viridis, capite thoraceque carneis. *Lanio.*

39. C. nigra capite fasciis duabus flavis, elytris albo striatis. *striata.*  
Habitat in Kiliae plantis.

Statura C. viridis. Caput subtus flavum supra nigrum fasciis duabus flavis, altera ante apicem, altera basos

seos. Elytra nigra striis plurimis albis. Corpus nigrum. Pedes flavescentes.

*ignita.* 40. C. virescenti nitidula, capite scutello abdomineque fuluis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parua. Caput fuluum punctis quatuor nigris. Thorax viridi nitidulus utrinque parum flavescentis puncto nigro. Scutellum fuluum. Elytra viridi nitidula, immaculata. Corpus virescentis abdomine fulvo.

*turca.* 41. C. atra, abdomine flavo, alis apice fuscis: lunula hyalina.

*maura.* 42. C. nigra, pectore abdomineque sanguineis.

*nebulosa.* 43. C. nigra, elytris hyalinis basi fuscis.

*hyalina.* 44. C. fusca, elytris fascia abbreviata margineque postico hyalinis.

*pellucida.* 45. C. grisea, elytris fascia media hyalina.

*Cynosba-* 46. C. fusca, alis albo hyalinis: margine fusco punctato.

*Serratu-* 47. C. flava, elytris albis: puncto fasciisque duabus nigris.

*lae-* 48. C. alis fuscis: neruis albo nigroque punctatis.

*variegata* 49. C. atra viridi variegata, alis hyalinis: punctis tribus costalibus nigris.

*lyncea.* 50. C. fronte thoraceque glaucis: punctis quatuor ocellaribus nigris, elytris hyalinis: margine flavescente.

*fulgida.* 51. C. flava, elytris fusco auratis.

*punctata.* 52. C. elytris flavescentibus fusco punctatis.

*Rosae.* 53. C. flava alis albis apice fusco striatis.

*maculata.* 54. C. grisea, elytris punctis apiceque fuscis, alis albis apice fuscis.

Habitat in Europa.

Statura et magnitudo C. Rosae. Caput et thorax grisea immaculata. Elytra grisea fusco maculata apiceque

que fusca neruis albo nigroque punctatis. Alae albae immaculatae apice fuscescentes. Abdomen atrum corniculo paruo inflexo, caudaque bisida sub ano inserta. Pedes flavi.

55. C. flava; elytris fulvo pictis: maculis quatuor nigris aurata. Type? *lutea*

posticeque auratis.

56. C. alis viridi luteis, apicibus nigricantibus inauratis. *Viridis* *lutea*

57. C. elytris pallide auratis albo nigroque punctatis. *nitidula*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Parua. Rostrum nigrum lineola media flavescens. Caput flavum punctis quatuor atris in medio. Thorax antice flavescentia; postice fuscescens. Scutellum flavum. Elytra pallide aurea punctis aliquot albis nigrisque inoptimis ad margines.

58. C. grisea; capite depresso plano apice fuso. *grisea* *fuspidata*

59. C. flavescentia elytris sanguineo apice fuso maculatis. *Quercus* *Typus*

163. CERCOPIS: Os labio abbreviatum, truncatum, emarginato:

Antennae filiformes suboculis insertae.

1. C. elytris fusco griseis: macula marginali fulva cinereaque.

*grossa*

2. C. atra; elytris vtrinque vitta marginali sanguinea. *marginalis*

Habitat in America meridionali Mus. Doct. Hunter.

Magna: Caput atrum macula frontali sanguinea: Thorax ater linea media margineque sanguineis. Scutellum triangulum; acutum; atrum linea media sanguinea.

Elytra laevia atra vitta ad marginem exteriorem et interiorem sanguineis; quae antice coetint. Abdome atrum ano sanguineo: Pedes rubri geniculis

nigris.

3. C. thorace atro: fascia fulva; elytris fulvis: maculis

apiceque nigris. *maculata*

Fabr. Insect. T. II

- sanguino-* 4. *C. atra*, elytris maculis duabus fasciaque sanguineis.  
*lenta.*
- Schach.* 5. *C. nigra*, elytris fuscis: fascia interrupta sanguinea.  
Habitat in America septentrionali Mus. Dr. Hunter.  
Statura praecedentis. Caput et thorax nigra, immaculata. Scutellum nigrum margine sanguineo. Elytra fusca puncto baseos fasciaque postica in medio interrupta sanguineis. Alae hyalinae. Corpus nigrum abdominis basi sanguineo. Pedes nigri.
- ciuentata* 6. *C. rufa*, elytris nigris: fasciis duabus flauis.  
Stoll. Cicad. tab. 2. fig. 10. C.
- carnifex*. 7. *C. sanguinea*, thorace macula, elytris fasciis duabus nigris.
- varia.* 8. *C. capite thoraceque virecentibus*, elytris fuscis: maculis duabus baseos strigaque postica flauis.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Caput et thorax obscure viridia, immaculata. Elytra fusca maculis duabus oblongis baseos strigaque postica flauis. Corpus atrum abdomine rufo margine atro.
- quadrifasciata* 9. *C. flava* fasciis quatuor fuscis.
- spumaria.* 10. *C. fusca*, elytris maculis binis lateribus albis.
- aurata.* 11. *C. cinereo aurea nitida* immaculata.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Corpus medium totum pallide aureum, nitidum.
- margi-  
nata.* 12. *C. nigra*, capite thorace elytrorumque margine albis.  
Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.  
Statura praecedentium. Caput et thorax albida punctis duobus thoracis paruis ferrugineis. Elytra nigra margine late albido. Abdomen nigrum margine albo. Pedes nigri albo maculati.
- lineata.* 13. *C. flavescentis*: coleoptris striis tribus nigris.
- coleoptrata.* 14. *C. elytris totis coriaceis alas obtegentibus griseis fuscis irroratis.*

15. C. grisea immaculata, alis albis. *rufica.* ○  
 16. C. nigra elytris albo maculatis. *gibba.* ○  
 17. C. nigra siccata maculata, elytris fuscis: puncto marginali albo. *biguttata.* ○  
*Cicada biguttata* Sp. Inf. 325. 22.  
 18. C. flavescentia, elytris obscuris: fascia maculisque duabus oppositis albidis. *fasciata.* ○  
*Habitat Kiliae Dom. Daldorf.*  
*Statura et magnitudo praecedentis. Caput, thorax, scutellum, pedes flavescentia. Abdomen atrum. Elytra obscura fascia media maculisque duabus pone fasciam marginalibus oppositis flavis. Alae hyalinae.*  
 19. C. cinerea, elytris fascia obliqua fusca. *unifasciata.* ○  
 20. C. flavescentia: elytris fuscis: fasciis duabus albis. *bifasciata.* ○  
 21. C. nebulosa, vertice punctis duobus ab domineque *Populi.*  
*basi atris.* 378

## 164. NOTONECTA. Os rostro arcuato.

*Labium conicum, elongatum; subulatum.*  
*Antennae sub oculis inseratae.*

1. N. elytris griseis: margine fusco punctato apice bifidis. *glauca.*  
*Stoll. Cimic. 2. tab. 12. fig. IX. X.*
2. N. grisea postice nigra, scutello atro: vtrinque punctato baseos atro. *americana.*
3. N. elytris albis immaculatis apice rotundatis. *nivea.*
4. N. grisea, capite fusco, elytris truncatis. *minutissima.*

165. SIGARA. *Os rostro breuissimo.*

*Vagina conica transuersim  
striata lateribus spinosa.*

*Antennae breuissimae.*

*lineatā.* 1. *S. elytris fuscis: lineis duabus abbreviatis flavis.*

*Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*

*Statura S. striatae at paullo maior. Caput flavum oculis nigris. Thorax fuscus margine antico, lateribus lineaque dorsali flavis. In margine antico maculae dueae et inter has puncta duo fusca. Scutellum fuscum apice flavum. Elytra nitida; fusca lineis duabus flavis, altera a marginie exteriori baseos ad medium marginis interioris ducta; altera marginalis a basi ad medium. Apex elytrorum albō hyalinus. Corpus flavum tibiis anticis geniculisque reliquorum pedum nigris.*

*striata.* 2. *S. elytris pallidis: lineolis transuersis undulatis numerosissimis fuscis.* Stoll. Cimic. 2. tab. 15. fig. XIII. B.

*coleoptrā.* 3. *S. elytris totis coriaceis fuscis: margine exteriori flavo.* ta.

166. NEPA. *Os rostro arcuato.*

*Labium nullum.*

*Antennae palmato diuisae sub oculis insertae.*

*grandis.* 1. *N. fusca flavo maculata.*

Stoll Cimic. 2. tab. 7. fig. IV.

*Inuenitur etiam caudata setis duabus pilosis, compressis, brevibus.*

*annulata.* 2. *N. ecavata subrotunda pallide fusca, tibiis anticis pallidis fusco annulatis.*

*fusca.* 3. *N. ecaudata fusca, thoracis elytroru inque margine antico albido.*

*Nepa plana Sulz. Hist. Inf. tab. 10. fig. 2.*

Stoll. Cimic. 2. tab. 7. fig. VI.

4. N. cauda biseta, scutello rugoso, alis nuncis. *fusca,*  
Stoll. Cimic. 2. tab. 1. fig. 1.  
Habitat in Indiae orientalis aquis.  
Cauda longitudine corporis.
5. N. cauda biseta corpore ouato, cauda longitudine cor- *grossa,*  
poris.  
Habitat in China Dom. Lund.  
Differt a sequentibus maior. Corpus totum cinereum  
abdomine solo supra rubro in medio nigro ano ci-  
nereo. Cauda biseta villosa longitudine corporis.
6. N. cauda biseta, corpore ouato, cauda corpore longiore. *rubra.*  
*Nepa rubra fusca* abdomine supra alarumque nervis  
rubris. Linn. Syst. Nat. 2. 713. 2. Mus. Lud. Vlr. 163.  
*Scorpio aquaticus* Stoll. Cimic. 2. tab. 7. fig. V.  
Habitat Tranquebariae Dom. Lund.  
Statura omnino N. cinereae at duplo maior. Corpus  
depressum, planum, cinere fuscum, thorace in-  
aequali. Abdomen supra rufum linea dorsali nigra.  
Cauda corpore longiore.
7. N. cauda biseta corpore dimidio breuiore, corpore *cinerea.*  
ouato. Stoll. Cimic. tab. I. fig. II. a.
8. N. cauda biseta nigra, thorace scutelloque ferrugineo *maculata.*  
inaculatis.
9. N. cauda biseta, corpore linearis. *linearis.*  
Habitat et in Indiae orientalis aquis.

167. NAVCORIS. *Os rostro subinflexo.*  
*Setae tres inaequales,*  
*Labium porrectum, rotun-  
datum.*  
*Antennae breuissimae sub  
oculis insertae.*

1. N. abdominalis marginē serrato. Stoll. Cimic. 2. tab. 12. *cimicoides.*  
fig. VIII. C. B.
2. N. abdominalis marginē integro. *nepaefor-  
mis.*

168. ACANTHIA. *Rastrum* sub capitis apice  
infertum.  
*Labium* nullum.  
*Antennae* ante oculos in-  
fertae.

*tectularia* 1. A. aptera. Stoll. Cimic. 2. tab. 19. fig. 131.

*Zosteræ*, 2. A. nigra, elytris coriaceis ab domine longioribus apice  
hyalino striatis.

*atra*, 3. A. atra nitida elytris apice pallentibus.  
Habitat Kiliae.

Duplo minor A. Zosteræ. Corpus totum atrum nitidulum oculis valde prominulis. Elytra coriacea apice pallida.

*coriacea*, 4. A. aptera, elytris coriaceis nigro griseis.

*clavipes*, 5. A. aptera nigra, pedibus piccis; femoribus anticis in-  
crassatis dentatis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Magnitudo A. Zosteræ tota nigra, obscura, minime  
nitens. Pedes omnes picci femoribus anticis incrass-  
atis dentatis.

*pedestris*. 6. A. aptera, elytris coriaceis connatis abbreviatis cine-  
reis, apno setoso.

*clavicornis*, 7. A. elytis reticulato punctatis, antennis clavatis.

*Lavata*, 8. A. nigra elytris ab domineque basi rufis.

Habitat in Barbariae Lavatetis Dom. Vahl.

Parua in hoc genere. Caput, thorax, scutellum, au-  
tennae, pedes nigra, obscura, immaculata. Elytra  
rufa apice litura nigra. Alae albae, immaculatae.  
Abdomen nigrum primo segmento subtus refo.

*Serrata*, 9. A. nigra, elytris pallentibus, alis apice fuscis,

*fasciata*, 10. A. atra, elytris pallentibus; fasciis duabus abbre-  
uiatis nigris.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Parua.

Parua. Corpus totum atrum, nitidum. Antennarum articuli duo priores ferruginei apice nigri ultimo nigro toto. Thorax sulco transuerso impressus. Elytra palescentia fasciis duabus altera in medio, altera ad apicem nigris futuram tamen haud attingentibus. Pedes flavescentes femoribus posticis annulo nigro.

11. A. fusca, thorace albo trimaculato, abdomine subtus *maculata* albo: margine nigro punctato.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Parua. Caput rotundatum, fuscum. Thorax fusus maculis tribus magnis albis lateralibus marginalibus. Scutellum et elytra fuscum, immaculata. Alae albidae. Abdomen subtus album, margine nigro variegata. Pedes albidi.

12. A. elytris sordidis albo punctatis, corpore nigro. *littoralis*.

13. A. elytris pallidis, corpore oblongo, femoribus anti rugosa, cis crassissimis.

14. A. thorace lunato: margine prominente, abdome *lunata*. ferrato. Stoll. Cimic. 2. tab. 13. fig. 84.

15. A. membranacea, abdominis margine imbricatim se *corticalis*, eto, corpore nigro.

16. A. membranacea thorace abdome que lobatis ciliato *paradoxa*. spinosis. Sp. Ins. App. 510.

17. A. nigra, abdome laeui brunneo, alis pallidis. *laevis*.

18. A. membranacea, thorace denticulato; capite spino, *Betulae*, so, elytris antice dilatatis.

19. A. abdome marginato fuso apice flavescente, tibiis *crassipes*, anticis incrassatis.

20. A. membranacea, abdome flavo: fascia nigra, tho. *erosa*, racis margine sinuato, tibiis anticis incrassatis.

21. A. ferruginea, thorace marginato: margine antice *umbra*, scutelloque albis. *lata*.

22. A. thoracis margine serrato, corpore griseo, alis *serrata*, albis fuso maculatis.

23. A. atra, elytris albis: arcu apicis nigro. *sylvestris*.

*Cimex sylvestris* oblongus niger alis elytrisque albo fuscoque variis, pedibus rufis. Linn. Syst. Nat. 2. 731. III. Fn. Su. 965.

Habitat in Europae syluis.

*Parua.* Antennae ferrugineae articulorum apicibus nigris. Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Elytra alba apice nigra macula magna flava. Margo interior flavescentia macula nigra. Alae albidae macula apicis nigra. Pedes ferruginei. Corpus atrum.

*Cardui.* 24. A. scutello lineis tribus elevatis, antennis apice nigris.

*Pyri.* 25. A. thorace trialato, scutello foliato; elytris reticulatis basi gibbis.

*rhombea.* 26. A. thorace acutangulo, abdomine dilatato rhombeo postice sexdentato.

### 169. CIMEX. *Labium elongatum, subulatum, annulatum,*

*Antennae filiformes ante oculos insertae.*

\* *Scutellati scutello longitudine abdominalis.*

*Stacherus* 1. *C.* scutellaris quadratus, corpore viridi; maculis nigris, abdomine ferrugineo.

Stoll. Cimic. 2. tab. 3. fig. C.

*nobilis.* 2. *C.* scutellaris oblongus caeruleo auratus nigro maculatus. Stoll. Cimic. 1. tab. 1. fig. 1.

*regalis.* 3. *C.* scutellaris, thorace scutelloque aureis, thorace punctis duobus, scutello maculis duabus caeruleoscentibus.

*imperialis* 4. *C.* scutellaris thorace scutelloque rufis, abdominali cyno; margine sanguineo.

*Nigellae.* 5. *C.* scutellaris niger obscurus thorace antice abdominali margin'e pedibusque albis.

*Cimex rusticus* scutellaris niger obscurus, abdominali margin'e ferrugineo, pedibus albis. Sp. Ins. 2. 339. 5.

Habitat in Barbariae Nigella Dom. Vahl.

Elytra interne sanguinea.

*Cerinthe.* 6. *C.* scutellaris niger obscurus immaculatus. Habitat in Africæ Nigella sativa. Dom. Vahl.

Statuta et magnitudo *C. Nigellæ*, at totus ater obscurus, immaculatus.

7. *C. scutellaris virescens*: maculis annularibus nigris. *annulus*,  
*Cimex Argus* Drury. Ins. 3. tab. 46. fig. 9.
8. *C. scutellaris supra testaceus*, thorace punctis duobus, 6 punctis  
 scutello quatuor cyaneo nigris. *tus*.
9. *C. scutellaris supra rufus*: maculis difformibus nigris. *Druraei*,
10. *C. scutellaris subpurpuascens fuluo punctatus*. *Fabricii*.
11. *C. scutellaris niger punctis ocellaribus fuluis numerosissimis*. *Argus*,  
*Argus Stoll.* Cimic. 2. tab. 7. fig. 50.  
*Habitat Surinamii.*  
*Statura et magnitudo omnino C. Fabricii. Corpus sub-*  
*tus flavum nigro variegatum supra nigrum maculis*  
*plurimis fuluis annulo flavo cinctis.*
12. *C. scutellaris atro aeneus*, scutello vtrinque macula *Schulzii*,  
*baleos coccineo.*
13. *C. scutellaris cyaneus*, scutello abdomineque rufis *paganus*,  
*cyaneo inaculatis.*
14. *C. scutellaris glaucus*, thorace scutelloque punctis *illustris*,  
*duobus fuscois.* Stoll. Cimic. tab. 24. fig. 166.
15. *C. scutellaris supra cyaneus*, capite thoraceque linea *lineola*,  
*dorsali*, scutello punctis duobus rubris.
16. *C. scutellaris niger*: lineis tribus flavescentibus. *trilinea-*  
*tus.*
17. *C. scutellaris ruber*, thorace lineis quinque, scutello *nigroli-*  
*tribus nigris*, abdomine flavo: punctis nigris. Stoll. *neatus*,  
*Cicad. 2. tab. 11. fig. 9.*
18. *C. scutellaris supra rufus*, thorace punctis decem, seu *semipun-*  
*tello lineis quatuor nigris.* Stoll. Cimic. 2. tab. 11. fig. 8. *status*.
19. *C. scutellaris cyaneus*, scutello basi apiceque flave- *anchorati*  
*scientibus*, abdominis marginē flavo nigro punctato, *go-*
20. *C. scutellaris*, corpore flavescente, supra lituris lon- *grammi-*  
*gitudinalibus nigris.* *cus.*
21. *C. scutellaris rufus*: atomis numerosissimis albis. *pedemontanus*

*postatus.* 22. C. scutellaris griseus, alarum costa basi pedibusque rufis.

Habitat in Insula Rotterdam. Mus. Dom. Banks.

Statura et summa affinitas C. maura. Antennae cinereae. Caput griseum margine flavescente. Thorax griseus vel potius flavesens atomis numerosissimis rubris irroratus margine immaculato. Scutellum longitudine corporis, subcarinatum, griseum macula una altera obsoleta fusca. Alae basi flavescentes costa ferruginea, qui color terminatus puncto nigro, apice exalbidae. Pectus canaliculatum ad receptionem rostri. Pedes rufescentes.

*maurus.* 23. C. scutellaris cinereus, scutello basi punctis duobus albis.

*hotten-* 24. C. scutellaris ferrugineus immaculatus.

*totta.*

*aboli-*

*neatus.*

*rufisticus.*

25. C. scutellaris griseus albo striatus.

Habitat Tranquebariae.

Medius. Antennae ferrugineae apice fuscae. Caput ferrugineum linea media fusca. Thorax fuscus margine antico ferrugineo. Scutellum fuscum, immaculatum. Corpus subtus fusco alboque varium. Pedes testacei.

*irroratus* 27. C. scutellaris virescens fuscō irroratus.

*lanatus.* 28. C. scutellaris aenco niger griseo hirtus. Stoll. Cimic. 2. tab. 9. fig. 61.

*scara-* 29. C. scutellaris, corpore toto aeneo.

*baooides.*

*pallipes.* 30. C. scutellaris nigro aeneus, scutelli abdominalisque margine pedibusque pallidis.

Cimex acaroides scutellatus ater, thorace scutello abdominalisque albo marginatis. Thunb. nou. sp. 2. 29.

*flavipes.* 31. C. scutellaris nigro aeneus: margine omni pedibusque flavis.

32. C. scutellaris ater nitidus, capite litoris duabus, thorace scutellique margine pedibusque flavis. *Vahlii.*  
 Habitat in India orientali Dom. Vahl.  
 Medius. Caput atrum litoris duabus magnis flavescentibus. Thorax gibbus, ater, nitidus margine linearaque obliqua ante marginem flavescentibus. Scutellum atrum nitidum margine flavescente. Abdomen atrum, singulo segmento vtrinque lineis duabus apice coeuntibus flavis. Pedes flavi.
33. C. scutellaris, scutello fuliginoso: litoris quinque nigri, postica alba. *fuliginosus.*
34. C. scutellaris niger, scutello lineolis duabus bascos litura punctaque apicis albis.
35. C. scutellaris obscurus, scutello sebro ante apicem tuberculato. *tuberculatus.*
36. C. scutellaris ater, scutello basi pedibusque griseis, inunctus.
37. C. scutellaris, thorace spinoso, corpore ouato livido, ano bidentato. *Arabs.*
38. C. scutellaris, thorace subangulato, corpore supra stolidus, viridi, subtus flavo, ano bidentato.

---

\*\* *Spinosi, thorace utrinque spina armato.*

39. C. thorace spinoso griseus, thoracis spinis porrectis taurus. compressis truncatis.
40. C. thorace spinoso viridis, elytris fuscis; margine crenatus. albo, thoracis spinis obtusis subbifidis.
- Habitat Cajenae Dom. v. Rohr.  
 Magnus. Caput viride antennis ferrugineis articulo vltimo flavo. Thorax viridis spinis duabus elongatis rotundatis-nigris apice obtusis, subbifidis. Scutellum viride. Elytra obscure rufa vel fusca margine exteriori albo. Subtus virescens pedibus ferrugineis.
41. C. thorace acute spinoso griseus, antennis rufis. *bidens.*
42. C. thorace obtuse spinoso fusca, scutello apice albidio, abdominis margine maculato, pedibus rufis. *sanguinipes.*
43. C. thorace obtuse spinoso griseus, pedibus rufis. *rufipes.*
44. C. thorace obtuse spinoso subvirescente, elytris griseis; macula fusca, clypeo emarginata. *turidus.*

- nigricor-* 45. C. thorace obtuse spinoso subferrugineus, spinis annnis. tennisque nigris.
- nigrispi-* 46. C. thorace obtuse spinoso supra griseus, capite spinisque nigris, antennis annulo albo.  
Habitat in China Dr. Pflug.
- Statura et magnitudo praecedentis. Caput nigrum clypeo emarginato. Thorax griseus spina vtrinque obtusa nigra. Scutellum griseum fascia in medio interrupta obsoleta fusca. Elytra grisea. Alae albae macula fusca. Antennae nigrae annulo ante apicem albo. Corpus subtus flauescens pedibus griseis.
- ittericus.* 47. C. thorace spinoso oblongus supra rufescens subtus flavius.
- punctatus* 48. C. thorace subspinoso fuscus, abdominis margine variegato, tibiis annulo albo.
- varius.* 49. C. thorace obtuse spinoso supra rufus subtus flauescens, scutello nigro basi apiceque albo.  
Habitat in Hispania Dom. Vahl.
- Statura et magnitudo C. albipes. Antennae nigrae. Caput nigrum lineis duabus rubris antice coeuntibus. Thorax rufus margine lineolisque duabus abbreviatis anticis nigris. Scutellum nigrum basi album inaculis duabus paruis baseos maiorique apicis nigris. Apex albus. Elytra rufa, immaculata. Abdominis margo nigro rufoque maculatus. Corpus subtus flauescens abdome lineis tribus punctorum fuscorum. Pedes rufi.
- albipes.* 50. C. thorace subspinoso supra nigricans, thoracis margine scutellique apice albis.
- dentatus.* 51. C. thorace acute spinoso serrulato, corpore cinereo nigroque vario.
- florida-* 52. C. thorace spinoso niger rubro varius, scutello maculis tribus rubris.
- armatus.* 53. C. thorace acute spinoso, scutello nigro; punctis duobus apiceque testaceis, antennis pedibusque rubris.
- haemor-* 54. C. thorace spinoso niger, abdome rufo, elytris  
*ghous.* punctis linearibus quinque nigris.
- epustu-* 55. C. thorace spinoso niger, elytris liuidis, capite pun-  
*latu-* quis duobus coccineis.

56. C. thorace spinoso niger, scutello lunula apiceque *punicus*: rubris.
57. C. thorace spinoso liuidus, scutello Y fano inscripto: *Epsilon*.
58. C. thorace spinoso viridis: fascia flavicante, capite *clypeatus*: *clypeato*.
59. C. thorace dentato spinoso supra viridis; capite tho- *albicollis*: racisque antico scutellique basi flavis:
60. C. thorace obtuse spinoso subuirescens; antentis ni- *haemor-* gris, sterno porrecto: *rhoidalis*:
61. C. thoracē acute spinoso fuscus; scutello apicē elytris *spinidens*: margine albis.
- Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
- Magnus fuscus. Spinae thoracis magnae acutae in me-  
dio postico dente paruo auctae. Scutelli apex ut  
margo elytrorum albus. Subtus pallidior. Pedes  
pallidi.
62. C. thorace spinoso griseus; scutello pūctis duobus *oculatus*: flavis, tarsis anticis apice cōpresso membranaceis.
63. C. thorace spinoso griseus, tibialis albo annulatis: *annulatus*
64. C. thorace crenato obtuse spinoso scutelloquē pun- *4 pustula-*  
ctis duobus rufis. *tus*.
65. C. thorace obtuse spinoso virescens; thorace maculis *macula-*  
quatuor; scutello elytrisque apice fuscis. *tus*.
66. C. oblongus, thoracē acute spinoso virescens, anten- *pugnax*.  
nis rufis.
67. C. thorace acute spinoso virescens; abdomine lineis *emeritus*: duabus albis.
68. C. thorace acute spinoso scutelloque flavescentibus ni- *gladiator*  
gro punctatis, elytris punctis albis scabris:  
Stoll. Cimimic. 2. tab. 2. fig. 12.
69. C. thoracē acutē spinoso ferrato fuscus, *clypeo* acu- *furcatus*.  
minato bifido.
70. C. thoracē acute spinoso fuscus: marginē flavo, sub: *pugilla-*  
tus fuluus nigro punctatus: *tor*.
71. C. thoracē acute spinoso fuscus, scutello apice rufo; *victori-*  
pēdibus pallidis nigro punctatis:

- ciliatus.* 72. C. thorace ciliato obtuse spinoso nigro: margine fasciaque postica flavis, femoribus posticis serratis.
- bellator.* 73. C. thorace spinoso supra fusca subtus flavescentia, antennis atris albo annulatis.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Medius.* Antennarum primus articulus albus nigro varius, reliqui atri, albo annulati. Caput, thorax, elytra alae fusca, immaculata. Scutellum fuscum apice atrum. Abdomen supra fuluum marginem fuscum albo maculato. Corpus et pedes flavescentia.
- armiger.* 74. C. thorace acute spinoso griseus, scutello punctis duobus, antennis pedibusque pallidis.
- scorbuti-* 75. C. thorace obtuse spinoso fuscus, pedibus pallidis nigro punctatis.
- delirator.* 76. C. thorace acute spinoso flavescentia nigro punctatus, thorace postice elytrisque fuscis.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Parvus.* Antennae fuscae articulorum apicibus flavis. Caput flavescentia stemmatibus duobus. Thorax ante flavius punctis tribus nigris, in imedio flavis atomis innumeris fuscis, impressis, postice acute spinosus, ferrulatus fuscus. Scutellum, elytra, alaeque fusca, immaculata. Corpus flavescentia lineis quatuor punctorum nigrorum, anno tamen immaculato. Pedes flavi nigro punctati.
- meland-* 77. C. thorace acute spinoso obscure ferrugineus: spinis atris, abdomine atro vittis flavescentibus.
- aggressor* 78. C. thorace acute spinoso, ano quadridentato, corpore flavescente: spinis subconcoloribus.
- vittatus.* 79. C. thorace subspinoso virescens, elytris vitta submarginali flava.
- hamatus.* 80. C. thorace acute spinoso viridis, abdomine ferrato: denticulis nigris.  
Habitat in India orientali Dom. Sianbusch.
- Magnus.* Antennae nigrae. Rostrum longitudine corporis. Corpus virescens capite thoracisque antico magis flavescentibus. Thorax acute spinosus spina retrorsum subarcuata, nigra. Sternum porrectum, compressum, obtusum. Abdomen flavescentia vtrinque

que linea punctorum nigrorum. Margo abdominalis denticulis quinque acutis nigris serratus. Pedes flavescentes.

81. C. thorace acute spinoso, ano quadridentato, cor- *defensor*  
pore viridi: spinis nigris.
82. C. thorace obtuse spinoso, abdomine marginato acu- *margi-*  
*tō*, antennis rufis. Stoll. Cimic. 2. tab. 5. fig. 37. *natus*.
83. C. thorace obtuse spinoso dentatoque, capite quadri- *spiniger*.  
spinoso.
84. C. thorace acute spinoso oblongus supra fuscus subtus *pugnator*.  
flavescentis, antennis rufis apice nigris.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae rufae apice clavatae nigrae. Corpus supra obscurum, subtus flavescentis, immaculatum. Thorax acute spinosus.

85. C. thorace subspinoso cinereus, alis fuscis, pedibus *fascicu-*  
*latus*. fasciculato tuberculatis.
86. C. thorace acute spinoso supra rufus, subtus fla- *insidior*  
uescentis.

Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

Maior C. quadrato. Caput, antennae, thorax, scutellum, elytra rufa, immaculata. Alae albidae. Thorax postice spina acuta, valida. Corpus subtus vittatus et pedes flavescentes.

87. C. thorace obtuse spinoso, supra fuscus, subtus fla- *quadra-*  
uescentis, abdomine quadrato. Stoll. Cimic. 2. tab. 5. *tus*.  
fig. 36.

88. C. thorace acute spinoso dentatoque, elytris obscuris *hastatus*.  
striga postica alba.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Statura C. quadrati at minor. Corpus supra obscurum fascia elytrorum postica alba, subtus magis pallidum. Thorax non solum acute spinosus, sed denticulis plurimis acutis armatus.

89. C. thorace acute spinoso bipunctato, elytris punto *velox*:  
baseos strigaque flavis.

90. C. thorace subspinoso, elytris fuscis albo reticulatis, (Merianae  
abdominis basi spinoso.

- valgus.* 91. C. thorace spinoso serratoque, femoribus posticis incuruis tibiisque posticis vñidentatis.  
Variat abdominis basi internii et quadridentato.  
Plures huius sunt aut species aut varietates.
- iragus.* 92. C. thorace spinis compresso lunatis ferratis; tibiis posticis membranaceo ferratis.  
Habitat in China Dr. Pflug.  
Statura et magnitudo C. valgi. Antennae mihi desunt.  
Caput paruum; carinatum. Thorax pallide fuscus pureris eleuatis obscurioribus, scaber, margine utrinque dilatato, lunato, compresso, obtuso utrinque serrato pallidore. Elytra pallide fuscata puncto paruo medio obscuriore. Alae fuscæ. Pedes fuscæ femoribus posticis incrassatis, deitatis tibialisque incuruis intus membranaceis, dentatis.
- tenebrösus.* 93. C. thorace serrulato, femoribus posticis incuruis clavatis, abdomine basi trispinoso.  
Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.  
Statura et magnitudo C. valgi. Corpus fuscum. Thoracis margo subserratus. Abdomen basi spinis tribus intermedia crassiore, obtusiori, lateralibus acutis. Femora postica magna, incurua, clavata. Tibiae intus serrulatae, vñidentatae.
- fatuicornis.* 94. C. thorace spinoso ferrato fuscus; femoribus bidentatis, posticis multidentatis.  
Habitat in India orientali.  
Magnus. Corpus fuscum obscurum antennis pedibusque ferrugineis. Thorax serratus acuteque spinosus. Femora quatuor antica bidentata; postica multidentata.
- femoratus.* 95. C. thorace serrulato, femoribus posticis incuruis dentatis tibiisque posticis compressis.
- curuipes.* 96. C. thorace acute spinoso, femoribus omnibus apice bidentatis, posticis incuruis.
- clauipes:* 97. C. thorace ferrato obscurus; femoribus multo spinosis; posticis incrassatis.  
Habitat in China Dom. Lund.  
Triplo minor praecedentibus. Caput et thorax fuscata tuberculis aliquot eleuatis; obtusis. Thoracis marginæ acutæ serratus. Elytra scabra; obscurata macula vertebris

sus apicem pallida. Femora multidentata, postica incrassata. Tibiae compressae apice serratae dente primo maiori.

98. C. thoracē acute spinoso nigro: fascia flava, tibiis posticis membranaceis dentatis. *membra-*  
*nacea.*
99. C. thoracē spinoso immaculato nigricans, elytris fascia albicante, tibiis posticis membranaceis dentatis. *phyllopus*  
Stoll. Cimic. 2. tab. 8. fig. 54.
100. C. thorace subspinoso nigro: maculis duabus fuluis; *auctus.* elytris fascia flava, tibiis posticis membranaceis dentatis.
101. C. thorace subspinoso: fascia alba, elytris fuscis: *gonagra.* puncto cinereo.
102. C. thorace subspinoso oblongus rufus: fascia albida *Kermesif-* nigro punctata, femoribus posticis multidentatis. *nus.*
103. C. thorace subspinoso oblongus niger, thorace fascia *australis.* antica rubra, tibiis posticis basi membranaceis.
104. C. thorace acute spinoso oblongus supra niger, tho- *cruciger.* race lineis, elytris cruce ferruginea.
105. C. thorace acute spinoso oblongus rufus, elytris ni- *santus.* gris: cruce ferruginea.
106. C. thorace spinoso viridis, capite fascia elytrocum *laetus.* abdominisque femoribusque flavis, elytris atris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Magnus oblongus. Caput laete flavidum antennis nigris. Thorax spinosus, scaber, obscure viridis, immaculatus. Elytra atra fascia lata flava. Alae atrae. Corpus subtus viride nitens fascia abdominis lata flava. Pedes nigri femoribus flavis.

107. C. thorace spinoso niger, thorace arcu antico, ely- *lunatus.* tris fascia corpore maculis albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentis. Caput fuscum linea vtrinque sub oculis alba. Thorax spinosus, fuscus arcu magno antico albo. Elytra nigra fascia media alba. Scutellum et alae nigra, immaculata. Corpus fuscum maculis plurimis albis. Pedes fusi.

*elatus.*

108. *C. thoracē acute spinoso viridi: margine ferrugineo, elytris striatis viridibus corpore ferrugineo.*

*Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*

*Praecedentibus minor. Antennae nigrae annulo magno albo. Caput ferrugineum supra nigro varium basi viride. Thorax acute spinosus, viridis margine antico et laterali ferrugineis. Elytra sericea, striata, viridia. Alae fuscae. Corpus ferrugineum pectore utrinque viridi maculato. Pedes ferruginei femoribus posticis annulo genubusque nigris.*

*balteatus.* 109. *C. thorace subspinoso oblongus ferrugineus, elytris linea transuersa flava, femoribus posticis multidentatis.*

*sinuatus.* 110. *C. thoracē acute spinoso liuidus, tibiis posticis compressis sinuatis nigris.*

*Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*

*Statura omnino C. ferripes at maior. Antennae fuscae articulo ultimo palecente. Caput liuidum. Thorax acutissime spinosus, liuidus. Elytra liuida. Corpus liuidum abdominis margine spinis elongatis arcuatis ciliato. Pedes liudi femoribus posticis elongatis spinis duabus atris. Tibiae compressae in medio sinuatae nigrae. Tarsi liudi.*

*ferripes.* III. *C. thorace acute spinoso oblongus rufus, femoribus posticis dentatis.*

*dentipes.* 112. *C. thorace spinoso elongatus, femoribus posticis elongatis ferratis, corpore fusco subtus lateribus albis.*

*Habitat in Sierra Leon. Africæ Dr. Pflug.*

*Statura omnino et summa affinitas C. linearis. Differt tamen lateribus pectoris et abdominis late albis.*

*linearis.* 113. *C. thorace acute spinoso elongatus fuscus, femoribus posticis elongatis denticulatis.*

*crenula-tus.* 114. *C. thorace dentato rufo: macula nigra, femoribus posticis dentatis, corpore atro.*

*4 spinofus* 115. *C. elongatus ruber, thorace quadrispinoso.*

\*\*\* *Ouati, thorace mutico.*

*aurantius* 116. *C. ouatus aurantius, capite thoracis margine antico abdominis maculis marginalibus pedibusque atris.*

*Cimex aurantius Sulz. Hist. Ins. tab. 10, fig. 10.*

Stoll. Cimic. 2. tab. 6. fig. 39.

Habitat in Iaua.

Magnus. Caput cum antennis atrum. Thorax aurantius margine antico atro. Scutellum aurantium, immaculatum. Elytra aurantia macula media fusca. Alae fuscae. Abdominis margo aurantio nigroque variis. Pedes atri.

117. C. ouatus supra nigricans, thorace postice aurantio, punctum elytris albis: puncto nigro.

*Cimex nigripes* Sulz. Hist. Inf. tab. 10. fig. 9.

Stoll. Cimic. 2. tab. 6. fig. 40.

Habitat in Iaua.

Magnus. Thorax aurantius margine antico nigro. Scutellum apice rufescens. Elytra albida puncto medio magno nigro.

118. C. ouatus supra sanguineus, scutello maculis duabus, *nigripes*, elytris vnlca nigris.

Stoll. Cimic. 2. tab. 2. fig. 10.

119. C. ouatus viridis, capite thoraceque antice flave. *torquatus* scutibus.

120. C. viridi aeneus, thorace fascia antica sanguinea, *rutilans*, scutello elytrisque antice flavescentibus.

Stoll. Cimic. 2. tab. 18. fig. 122. A.

121. C. ouatus viridi aeneus albido punctatus, tibiis annulis dilatato membranaceis.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Magnus. Caput oblongum, viride linea dorsali marginaque albidis. Thorax punctatus, vix spinosus, viridis, punctis albis sparsis numerosis. Scutellum et elytra thoraci concolora. Alae nigrae. Abdominis margo viridi alboque varius. Corpus subtus flavescentis strigis punctisque viridibus. Femora antica supra viridia subtus flavescentia. Tibiae membranaceae, nigrae annulo albo. Pedes secundi paris defunt, tertii paris femoribus flavis, tibiis nigris annulo flavo.

122. C. ouatus supra flavius: punctis viridibus, subtus vi- *viridulus*, ridis.

- prasinus.* 123. *C. ouatus viridis immaculatus*, antennis apice albo fuscoque annulatis.  
Stoll. Cimic. 2. tab. 19. fig. 127.
- dissimilis.* 124. *C. ouatus supra viridis subtus ferrugineus.*
- iuniperinus.* 125. *C. subrotundus viridis margine vndique scutelloque apice flavo.*
- sma-ragdulus.* 126. *C. ouatus viridis*, scutello punctis tribus baseos flavis.
- Beryllus.* 127. *C. ouatus pallidus thoracis margine aurantio, elytris inacula ferruginea lineolisque marginalibus nigris.*  
Habitat in India orientali Dom. de Slanbusch.
- Medius.* Antennarum articulus primus secundusque pallidi tertius basi pallidus apice niger, 4. 5. basi pallidi, apice ferruginei. Caput pallidum margine tenuissimo striisque duabus dorsalibus flexuosis nigris. Thorax antice pallidus nigro punctatus, postice obscurior margine aurantio. Elytra pallida inacula magna postica ferruginea. Margo lateralis lineolis transuersis nigris. Abdomen et pedes nigra, abdominis margine supra lineolis per paria approximatis rufis.
- calidus.* 128. *C. ouatus supra fuscus subtus testaceus*, antennis nigris.  
Habitat in Sierra Leon. Africæ Dr. Pflug.
- Medius.* Antennæ nigrae. Caput testaceum. Thorax obscurus, viridi fuscus antice parum testaceus margineque exteriori tenuissime nigro. Scutellum, elytraque viridi fuscæ, obscura. Alae striatae nigrae. Abdomen supra cyaneum, nitidum, subtus testaceum. Pedes testacei.
- covlebs.* 129. *C. ouatus fusco griseus*, scutello punctis tribus apiceque flavescentibus.
- iratus.* 130. *C. ouatus viridi fuscus*, thorace fascia flava.  
Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.
- Parvus.* Antennæ nigrae articulis basi apiceque albis. Caput obscure viride, immaculatum. Thorax obscure viridis fascia in medio lata flava. Scutellum et elytra obscure viridia. Subtus flavescentes pectore punctis tribus nigris. Pedes flavi.

131. C. subrotundus griseus: margine vndique sanguineo. *dumosus.*

132. C. rotundatus flavescentis, capite lineis scutello punctatis tribus nigris. *tripunctatus.*

133. C. ouatus griseo fuscoque varius, alis albis fusco atomarius. *punctatus.*

134. C. ouatus griseo nigroque varius, alis albis nigro *nubilus.* *striatis.*

135. C. ouatus flavescentis, elytris apice puncto ocellari *tristriatus.* atro, abdomine lineis tribus albis.

Habitat agro Paedmontano, Dom. Allioni.

Statura parua C. nubili. Caput et thorax flavescentia, immaculata. Elytra basi flavescentia apice rufescens puncto subocellari atro, et hic color rufescens in medio extenditur. Subtus flavescentis abdomine lineis tribus albis. Pedes flavescentes.

136. C. rotundatus luteo nigroque varius, thorace luteo: 6 punctatus. punctis sex nigris.

137. C. ouatus griseus, scutello vitta nigra. *signatus.*

138. C. ouatus fuscus, scutello punctis duobus flavis, elytris puncto nigro. *grauis.*

139. C. ouatus viridis, thoracis abdominalisque margine cinctus. sanguineo.

140. C. ouatus virescens, thorace fascia sanguinea. *rubrofasciatus.* Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Statura et magnitudo omnino C. cincti totus supra virescens, subtus flavescentis. Thorax postice obscurior fascia sanguinea.

141. C. ouatus viridis, thoracis abdominalisque margini- *cruentus.* bus, antennis pedibusque sanguineis.

142. C. ouatus obscurus thoracis abdominalisque margine *geniculatus.* flavescente, ano pedumque geniculis ferrugineis.

Habitat Cajennae Dom. Daldorf.

Magnus. Caput obtusum, nigrum. Thorax antice punctis aliquot impressis niger margine laterali flavescente. Elytra nigra marginē baseos flavescente. Scutellum nigrum apice paullo rufescens. Corpus nigrum maculis obsoletis rufis ad basin abdominalis. Anus et pedum geniculi ferruginei.

- mixtus.* 143. *C. ouatus punctatus griseus nigro maculatus, abdominis margine nigro: punctis flavis.*  
*Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*  
*Magnus.* Antennae fuscae articulis basi apiceque ultimo toto pallidis. Corpus totum supra cinereum punctis impressis nigris irroratum et praeterea macula magna marginalis utrinque in thorace, alia fere fasciam constitutens in scutello et tertia in medio elytrorum. Alae fuscae. Subtus flavescens margine late nigro punctis flavis. Pedes variegati.
- ripterus.* 144. *C. ouatus flavo rufoque varius, antennis nigris ultimo articulo apice albo.*  
*Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*  
*Statura praecedentis at paullo minor. Antennae nigrae apice albæ. Corpus supra flavidum ferrugineo densissime variegatum, subtus flavidum maculis marginalibus fuscis. Pedes variegati.*
- griseus.* 145. *C. ouatus griseus, abdominalis lateribus albo nigroque variis, ventre antice spinoso.*
- interflavus.* 146. *C. ouatus griseus, abdominalis margine nigro maculato.*
- papillojus* 147. *C. ouatus fuscus, antennis nigris, sterno gibbo compresso.*  
*Stoll. Cimic. 2. tab. 1. fig. 2.*  
*Thorax postice elongatus scutelli basin tegens. Abdominis margo spinosus.*
- funebris.* 148. *C. ouatus ater, antennis pedibus aliquæ concoloribus.*
- ruficornis* 149. *C. rotundatus ater, antennis rufis.*
- buccarum* 150. *C. ouatus subfulvus abdominalis margine fusco maculato.*
- cribrum.* 151. *C. ouatus fuscus, thorace scutelloque punctatis, abdominalis punctis genibusque flavis.*
- bresicornis.* 152. *C. ouatus obscure cupreus, antennis breuibus compressis femoribus anticis dentatis.*  
*Habitat in China Dom. de Sehestedt.*  
*Statura omnino praecedentium. Antennæ triarticulatae, compressæ, nigrae. Caput nigrum, valde canaliculatum. Thorax antice tuberculo eleuato obtuso,*  
*scu-*

scutellum et elytra obscure cuprea, immaculata. Alae  
sordide albae. Abdomen supra nigrum, subtus cu-  
preum. Pedes nigricantes, femoribus anticis intus  
dentatis.

153. C. ouatus glaucus, elytris apice puncto nigro. *glaucus.*  
154. C. rotundatus supra sanguineus, capite scutelli basi *Ianus.*  
alisque atris.

*Cimex afer* Drury. Ins. 3. tab. 46. fig. 7.

*Cimex Janus* Stoll. Cimic. 2. tab. 6. fig. 41.

155. C. ouatus nigro rubroque rarius, capite alisque ni- *ornatus.*  
gris. Stoll. Cimic. 2. tab. 2. fig. 11.

156. C. ouatus nigro rubroque varius, thorace punctis sex *festivus.*  
nigris, alis fuscis: margine albido.

157. C. ouatus, thorace abdomeque rufis, thorace ma- *rutilus.*  
culis quatuor, abdome fasciis nigris.

158. C. ouatus nigro pallidoque varius, scutello nigro: *cruciatus.*  
cruce alba.

159. C. ouatus flavescentes, capite disco communi pedibus- *discoideus*  
que nigris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo C. ornati. Caput cum antennis  
nigrum, immaculatum. Corpus flavescentes disco com-  
muni supra atro margine omni flavo. Pedes nigri  
femoribus basi flavis.

160. C. rotundatus supra niger, thorace rufo: punctis *biocula-*  
duobus nigris, scutello margine rufo. *tus.*

161. C. rotundatus viridis immaculatus.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Parvus. Corpus totum viride immaculatum. Supra  
paullo obscurius, subtus paullo pallidius.

162. C. rotundatus viridis, elytris griseis: macula fusca *fimbria-*  
inargineque viridi. *tus.*

Habitat in China Dr. Pflug.

Parvus. Antennae pallidae articulorum apicibus ni-  
gris. Caput, thorax, scutellum viridia, punctata, im-  
maculata. Elytra grisea macula media fusca, quae  
fere fasciam constituit margineque exteriori viridi.  
Alae cinereae macula baseos fusca. Subtus viridis li-  
nea media flava. Anus porrectus apice emarginatus.

- xpuncta-* 163. C. ouatus obscure rufus, scutello punctis duobus apicemque albis, abdominis margine nigro punctato.
- bicolor.* 164. C. ouatus niger, elytris nigro alboque variis, alis albis. Stoll. Cimic. tab. 32. fig. 224.
- oleraceus.* 165. C. ouatus coeruleo aeneus, thorace lineola, scutello apice elytrisque puncto albo rubroue.  
Stoll. Cimic. 2. tab. 5. fig. 32. 33.
- pictus.* 166. C. subrotundus supra ater, thorace lineis tribus, scutello linea punctisque quatuor, elytris margine ferrugineis.
- histrio.* 167. C. ouatus varius, capite abdomineque atris albo lineatis.  
Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.  
Statura et magnitudo C. picti. Antennae ferrugineae.  
Caput atrum orbita oculorum lineis quinque duabus intermediis abbreviatis albis. Thorax rufus punctis plurimis impressis fuscis, antice maculis duabus, magnis fuscis rufo punctatis. Scutellum flavo rufoque variegatum maculis tribus fuscis, posticis marginalibus. Elytra fusca postice litura rufa. Alae albidae. Subtus ater lineis duabus macularum albidarum, quae tamen anum haud attingunt. Margo abdominis praeterea albidus.
- bigutta-* 168. C. ouatus niger margine vndeque albo, elytris puncto albo.
- coeruleus.* 169. C. ouatus coeruleus immaculatus. Stoll. Cimic. tab. 31. fig. 221.
- moria.* 170. C. ouatus ater, plantis rufis. Stoll. Cimic. tab. 32. fig. 223.
- trifinis.* 171. C. ouatus ater, clypeo orbiculato, thorace retuso.
- spinipes.* 172. C. ouatus ater, pedibus piceis, tibiis spinosissimis.
- acthiops.* 173. C. ouatus ater, thorace striga media impressa, tibiis spinosissimis nigris.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Statura et magnitudo omnino C. oleracei et omnino distinctus a C. spinipes. Corpus supra atrum antennae piceis. Striga medio thoracis impressa. Alae albidae. Pedes nigri femoribus compressis testaceis tibiisque spinosissimis.

174. C. onatus fuscus, thoracis lineola, scutello abdomi- *lugens.*  
nisque margine assis.
175. C. subrotundus griseus, capite scutellique basi nigro *melanoce-*  
*aeneis.* *phalus.*
176. C. ovalis antice attenuatus exalbidus fusco striatus *acumina-*  
antennis apice rufis. *tus.*

\*\*\*\* *Oblongi.*

177. C. oblongus fuscus, femoribus posticis arcuatis *Phasia-*  
vndentatis, abdominis basi subtus gibbis. *nus.*
178. C. oblongus fuscus, femoribus posticis arcuatis den- *bellicosus.*  
tatis, abdomine quadrispino.

179. C. oblongus fuscus, antennarum vltimo articulo *Melea-*  
tibiisque anticis flavis, femoribus omnibus serratis. *gris.*

Habitat in China Dr. Pflug.

Magnus. Antennae nigrae articulo vltimo flavo. Cor-  
pus totum fuscum, immaculatum solo antennarum  
primo articulo tibiisque quatuor anticis flavis. Fe-  
mora omnia denticulis plurimis paruis serrata, po-  
stica praeterea denticulis duobus longioribus acutis  
dentata.

180. C. oblongus, elytris fuscis flavo striatis, abdominis *Gallus.*  
disco rubro, femoribus posticis ferratis.

181. C. oblongus niger, abdomine fusco: margine flavo, *faber.*  
femoribus anticis apice bidentatis.

Habitat in Poulicandor Mus. Dom. Banks.

Magnus. Antennae quadriarticulatae, filiformes, ni-  
grae. Caput, thorax, elytra, alae atra, immaculata.  
Corpus subtus fuscum abdominis margine flavo et  
ante marginem puncta tria aut quatuor atra. Pedes  
atri femoribus anticis apice spinis duabus, vltima  
maiori.

182. C. oblongus niger subtus rubro punctatus, femori- *harpa-*  
bus dentatis. *gon.*

183. C. oblongus, abdomine rubro bidentato, elytris fu- *indus.*  
scis pallido striatis.

Habitat Cajennae.

184. C. oblongus rufus nigro maculatus, alis exalbidis: *militaris.*  
striga baseos atra.

- equestris.* 185. C. oblongus rubro nigroque maculatus, thorace ante posticeque atro, alis atris albo maculatis.  
Pectus atrum, immaculatum. Margo alarum albicit.
- cjinilis.* 186. C. oblongus rubro nigroque varius, thorace lunulis duabus nigris, alis fuscis albo maculatis.  
Habitat Tranquebariae Dom. Romanus.  
Affinis videtur C. equestri, attamen distinctus. Differt thorace haud antice posticeque nigro sed lunulis duabus longitudinalibus nigris. Color minus viividus. Alae fuscae lineolis duabus transuerbis baseos puncto que fere medio albis in margine concolore. Pectus fuscum rubro maculatum. Abdomen fusco rubroque maculatum vtrinque linea punctorum nigrorum. Pedes fusi.
- crudelis.* 187. C. rubro nigroque varius, alis exalbidis, antennis pedibusque nigris.
- saxatilis.* 188. C. oblongus niger thoracis margine laterali lineaque media rubris, elytris maculis tribus rubris, alis immaculatis Linn. Syst. Nat. 2. 727. 81.  
*Cimex saxatilis* Scop. carn. 371.  
Habitat in Europa australiori Dom. de Slanbusch.  
Corpus subtus rubro nigroque varium. Pedes nigri.
- Hyoscyami.* 189. C. oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis immaculatis.
- familiaris* 190. C. oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis: puncto baseos albo.  
Habitat et in India orientali Dom. Lund.
- rostratus.* 191. C. oblongus rufus, scutello vita marginali flava.
- malabaricus.* 192. C. oblongus fuscescens, thorace scutelloque punctis duobus nigris.
- aulicus.* 193. C. oblongus rubro nigroque varius, elytris fascia atra, alis atris: lineola baseos alba.
- varicornis.* 194. C. oblongus variegatus, capite pedibusque rufis, thoracis marginibus pallidis.  
Habitat in India orientali Dom. Vahl.  
Corpus magnum. Caput cum rostro rufum. Antennarum primus articulus rufus, secundus niger, tertius albus apice fuscus. Thorax planus pallide fuscus margine pallido. Elytra nigra margine exteriori palli-

pallido. Alae atrae. Abdomen ferrugineum segmentorum marginibus nigris. Pedes rufi.

195. C. oblongus pallescens, thorace clytrisque fuscis: pallens. margine pallido.

196. C. oblongus thorace testaceo antice nigro: marginē cingulatus. albo, elytris puncto nigro.

197. C. oblongus rufus, antennis, thoracis basi fascia elytrorum aliquis nigra. superstitionis.

198. C. oblongus rufus, elytris nigris: fascia alba. albofasciatus.

199. C. oblongus glaucus, capite atro, thorace antice ruficollis. rufo.

200. C. oblongus niger thoracis margine elytrorumque scabrosus. fasciis duabus rufescientibus.

201. C. oblongus thorace nigro: basi marginē punctisque leprosus. duobus rubris, elytris atris immaculatis.

202. C. oblongus niger, capite elytrisque rubris, alis leucurus. atris basi apiceque albis.

Habitat in Insula Amsterdam Mus. Dom. Banks.

Magnitudo C. Koenigii. Caput rubrum, antennis rostroque nigris. Thorax niger margine a basi ad medium rubro. Scutellum nigrum. Elytra rufa. Alae atrae puncto baseos inter elytra marginaque postico albis. Corpus nigrum abdominis lateribus sanguineis. Pedes nigri.

203. C. oblongus testaceus, elytris puncto nigro, alijs atris. Koenigii. Stoll. Cimic. 2. tab. I. fig. 5.

204. C. oblongus sanguineus, thorace fascia abbreviata, Slanbuschii. scutello, elytris puncto aliquis atris.

Habitat in China Dom. de Slanbusch.

Statura et magnitudo C. Koenigii. Antennae atrae ultimo articulo cinereo. Caput sanguineum, immaculatum. Thorax sanguineus fascia lata margines haud attingens atra. Scutellum atrum. Elytra laevia, sanguinea puncto medio atro. Alae atrae, immacula-

culatae. Subtus sanguineus fasciis lateralibus abbreviatis atris. Pedes fuscii femoribus sanguineis.

*Variat interdum fascia thoracis in medio interrupta.*

*aegyptius* 205. C. oblongus rubro nigroque varius, elytris rubris: puncto nigro.

*mendicus*. 206. C. oblongus rubro fuscoque varius, alis atris; apice lineolaque baseos albis.

*seruus*. 207. C. oblongus rubro nigroque varius, elytris apice albis, alis nigris apice albidis.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Parua statuta C. mendici. Antennae nigrae. Caput rufum linea longitudinali nigra. Thorax rufus fasciis duabus nigris subabbreviatis punctis duobus dorsalibus vinctis. Elytra rufa linea magna postice dilatata nigra. Margo posticus totus albus. Alae nigræ margine postico albido. Pectus rufum nigro maculatum. Abdomen fuscum margine rubro. Pedes nigri.

*famelicus* 208. C. oblongus supra ater, thorace elytrisque punctis duobus fluorescentibus, alis lineola baseos alba. Stoll. Ciuit. 2. tab. 8. fig. 56. ?

*4gutta-tus*. 209. C. oblongus elytris rufis: fascia nigra, alis punctis duobus albis.

*punctato-guttatus*. 210. C. oblongus niger, elytris rufis: puncta medio atro, alis atris: punctis duobus albis.

*2 gutta-tus*. 211. C. oblongus, elytris rufis: striga vndata nigra, alis nigris: puncto medio albo.

*sanguineo-lentus*. 212. C. oblongus sanguineus, antennis elytris pedibusque fuscis.

*6punctata-tus*. 213. C. oblongus, thorace elytris rufis: maculis duabus nigris.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Magnitudo et statura praecedentium. Caput atrum. Thorax laevis, rufus punctis duobus nigris. Scutellum nigrum. Elytra rufa maculis duabus nigris, altera versus futuram, altera versus apicem. Alae fuscae. Corpus fuscum linea laterali rubra. Pedes fuscii femoribus rubris.

214. C. oblongus rufus, thoracis maculis duabus, anten- *cruentus.*  
nis alis pedibusque fuscis.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Statura et summa affinitas C. sanguinolenti, à quo ta-  
men manifeste differt colore minus laeto, maculis  
duabus thoracis fuscis scutelloque rubro.

215. C. oblongus rufus antennis alisque nigris: saturis *naturalis.*  
omnibus albis,

216. C. oblongus supra rufus, alis albidis: macula magna *rubigino-*  
*fusca.*

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Praecedentibus maior. Caput rufum. Rostrum nigrum  
basi rufum. Antennae desunt. Thorax rufus mar-  
gine postico flavo. Alae albidae macula magna ni-  
gra in medio. Pectus atrum striis vtrinque tribus  
flavis. Abdomen rubrum basi nigrum lateribus ta-  
men rubris. Pedes atri.

217. C. oblongus rufus, antennis pectore ano pedibus- *excavatus*  
que atris, scutello canaliculato.

218. C. oblongus sanguineus, thoracis lineis scutello alis *furcatus.*  
ano pedibusque atris.

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Magnys. Caput sanguineum margine baseos rostro an-  
tenisque atris. Thorax rufus lineis duabus ante  
marginem anticum coequitibus atris. Scutellum ni-  
grum in quibusdam punctis duobus rubris. Elytra  
sanguinea, immaculata. Alae atrae immaculatae.  
Corpus sanguineum pectore nigro maculato. Pedes  
atri. Anus ater puncto vtrinque paruo sanguineo.

219. C. oblongus rufus, antennis tibiisque fuscis. *carnifex.*

220. C. oblongus rufus antennis alis pedibusque nigris. *augur.*  
Stoll. Cimic. 2. tab. 18. fig. 124.

221. C. oblongus supra rufus, thorace scutelloque punctis *mattans.*  
duobus nigris.

222. C. oblongus rubro nigroque varius elytrisque ru- *apterus.*  
bris: punctis duobus nigris, alis nullis.

Stoll. Cimic. 2. tab. 15. fig. 103.

223. C. oblongus flavescentes, scutello elytris alisque fu- *friatulus*  
scis, elytris apice cinereis.

- nugax.* 224. C. oblongus fuscus, abdominis marginis maculato, tibiis anticis femoribusque posticis basi pallidis.
- calcarius.* 225. C. oblongus fuscus, abdome supra sanguineo, femoribus posticis sexdentatis.
- tineola.* 226. C. oblongus supra obscure griseus, scutello linea dorsali albida.
- Habitat in Insula St. Crucis Americae.
- Parvus.* Antennae fuscescentes articulo medio flavo. Caput, thorax, elytra obscure grisea, immaculata. Scutellum griseum linea media albida. Alae obscuriores. Subtus flavescentes. Pedes flavescentes apice nigri.
- Pini.* 227. C. oblongus ater, elytris fuscis: macula rhombaea atra.
- syluaticus* 228. C. oblongus ater, elytris fuscis.
- Rolandri* 229. C. oblongus ater, alis macula rhombaea flava.
- Forsteri.* 230. C. oblongus ater, scutelli apice, thoracis elytrorumque margine sanguineis.
- sordidus.* 231. C. oblongus niger, thorace postice, elytris pedibusque griseis.
- Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
- Medius.* Antennarum articuli basi cinerei apice nigri. Rostrum cinereum basi apiceque nigrum. Caput thorax, corpus nigra. Thorax postice griseus. Elytra obscure grisea. Alae obscurae vndis aliquot albidis. Pedes grisei.
- clauimanus.* 232. C. oblongus ater, thoracis elytrorumque margine sanguineo, femoribus anticis incrassatis dentatis.
- pustulatus.* 233. C. oblongus niger, thorace elytrisque maculis duabus rufis.
- Vrticae.* 234. C. oblongus niger, elytris griseis, alis albis: puncto nigro.
- lynceus.* 235. C. oblongus niger, elytris griseis, apice macula nigra: puncto albo.
- sylvestris.* 236. C. oblongus niger, elytris fuscis apice nigro punctatis alis nigris: puncto baseos apicisque albo.
- lunatus.* 237. C. oblongus niger, thorace maculato, elytris lunula marginali flava.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Antennae nigrae articulo ultimo ferrugineo. Caput pubescens, nigrum oculis prominulis cylindricis. Thorax punctatus, niger maculis tribus baseos flavis. Scutellum nigrum. Elytra nigra junula magna flava, cuius crura marginem exteriorem attingunt, et in medio puncto atro coarctata. Corpus fuscum abdominis medio flavo maculato. Pedes flavo ferrugineoque varii.

238. *C. oblongus*, elytris fuscis; basi punctisque duobus podagri-albis, femoribus anticis crassissimis bidentatis. *cus.*
239. *C. oblongus* griseus nigro punctatus, antennis clavatis. *crassicornis.*
240. *C. oblongus* niger, elytris cinereis, alis albis. *arenarius*
241. *C. oblongis* thoracis elytrorumque margine femororumque basi rufis. *succinctus*
242. *C. oblongus* supra ferrugineo fuscus, corpore elytrorumque margine flavis. *tunicatus*
243. *C. oblongus* rufus, antennis pectore elytris tibiisque nigris. *pubicornis.*
244. *C. oblongus* niger, pedibus antennisque flavis. *Coryli.*
245. *C. oblongus* niger, thorace elytrisque flavescentibus, scutello macula disci nigra. *nemoralis.*

Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

Statura et magnitudo omnino *C. campestris* at aliis.

Caput, pectus nigra. Abdomen nigrum lateribus flavescentibus. Thorax et elytra flavescentia aut rufescencia, immaculata. Scutellum flavescens macula magna disci triangulari nigra. Alae nigrae. Pedes nigri femoribus flavescentibus.

246. *C. oblongus* flavescens, elytris macula ferruginea. *campestris.*
247. *C. oblongus* flavescens, elytris viridibus. *pratenis.*
248. *C. oblongus* supra obscure griseus, elytris apice puncto rubro, femoribus posticis elongatis nigris. *floralis.*

Habitat in Hafniae floribus. Dr. Pflug.

Statura omnino praecedentium. Caput et thorax obscure grisea antennis pallidis. Elytra concolora puncto

cto apicis rufso. Corpus fuscum ano rufescente. Pedes pallidi femoribus posticis elongatis nigris.

*2 puncta-* 249. C. oblongus viridis, thorace bipunctato, elytris tuis.

*inquina-* 250. C. oblongus flavescentis, elytris nigris albo variis. Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Medius. Caput flavescentis antecennis nigris. Thorax flavescentis lateribus margineque postico nigris. Elytra nigra, basi apiceque albo nigroque variis. Corpus flavescentis margine nigro. Pedes nigri.

*nassatus.* 251. C. oblongus viridis, antennis pedibusque flavescentibus.

Habitat Hafniae in Tilia Dom. Lund.

Parvus totus viridis, immaculatus, antennis pedibusque solis flavescentibus.

*Tiliae.* 252. C. oblongus virescens: fasciis tribus fuscis; media angulata.

*Populi.* 253. C. oblongus albo fuscoque nebulosus.

*6 gutta-* 254. C. oblongus niger, scutello maculisque tribus elytrorum flavis.

Thorax flavo maculatus.

*leucoce-* 255. C. oblongus niger, capite pedibusque fulvis.

*phalus.*

*transuer-* 256. C. oblongus viridis, thorace lineola interrupta, elytris macula fuscis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Statura praecedentium at duplo minor. Corpus viride. Antennarum ultimus articulus fuscus. Thorax viridis lineola transversa in medio interrupta fusa. Abdomen viride dorso atro. Elytra viridia macula magna versus apicem suturaque fuscis. Pedes virides.

*roseus.* 257. C. oblongus sanguineus, capite elytrorumque apicibus albidis, alis fuscis.

*tripustu-* 258. C. oblongus niger, scutello maculisque tribus elytrorum coccineis.

259. *C. oblongus niger*, elytris alisque apice puncto nigro. *triguttatus.*
260. *C. oblongus niger*, elytris striatis, alis postice flavo *saltatorius.*  
maculatis.
261. *C. oblongus ater*, antennis apice capillaribus. *ater.*
262. *C. oblongus ater*, rostro femoribusque sanguineis, *tyrannus.*  
antennis apice capillaribus.
263. *C. oblongus ater*, capite scutello maculisque duabus *Schach.*  
elytrorum coccineis, antennis apice capillaribus.
264. *C. oblongus ater*, elytris testaceis: strigis duabus *bifasciatu-*  
albis, antennis apice capillaribus. *tus.*
265. *C. oblongus niger*, elytris flavo lineatis apice fascia *umbratili-*  
alba, antennis apice capillaribus. *tilis.*

*Cimex umbratilis oblongus niger*, elytris albo macula-  
tis. Linn. Syst. Nat. 2. 728. 9. Fn. Sv. 951.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Medius. Antennae nigrae apice setaceae. Caput, tho-  
rax, scutellum, corpus nigra, immaculata. Elytra ni-  
gra lineolis aliquot flavis abbreviatis exarata apice  
fascia nigra. Pedes picei.

266. *C. oblongus niger*, capite thorace pedibusque rufis, *flavicollis.*  
antennis apice capillaribus.
267. *C. oblongus niger*, antennis apice capillaribus, *elytrifasciatu-*  
tris fasciis tribus rufis.
268. *C. oblongus*, elytris fusco ferrugineis apice coccineis; *olivaceus.*  
puncto atro, antennis apice capillaribus.
269. *C. oblongus ater*, elytris fuscis basi pallidis apiceque *seticornis.*  
puncto coccineo, antennis apice capillaribus.
270. *C. oblongus flavescentis*, elytris apice coccineis an- *capillaris.*  
tennis nigris apice capillaribus.
271. *C. oblongus niger*, scutello elytrorumque apicibus *gothicus.*  
coccineis, antennis apice capillaribus.

*tricolor.* 272. C. oblongus ater, elytris apice macula coccinea, antennis apice capillaribus.

Habitat in Hispaniae Vrtica Dom. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas C. gothici at totus ater elytro-  
rum solis apicibus macula magna coccinea. Alae ni-  
grae macula marginali transuersa pallida. Pedes nigri.

*spissicornis.* 273. C. oblongus niger, pedibus flauis, antennis incrassa-  
tis apice capillaribus.

*agilis.* 274. C. oblongus thorace atro: margine postico flauo,  
elytris fuscis basi apiceque pallidis.

*Cimex quadri flauo maculatus* Degeer.

*varius.* 275. C. oblongus flavescentis, capite scutelli margine atris.  
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Paruus. Caput atrum antennis basi pallidis. Thorax  
flavescentis margine postico nigro punctoque laterali  
apicis rufo. Scutellum flauum margine nigro. Ely-  
tra flauo fuscoque varia puncto obsoleto rufo apicis.  
Corpus vti et pedes flavescentia.

\*\*\*\* *Antennis setaceis.*

*laevigatus.* 276. C. oblongus exalbidus: lateribus albidis.

*lateralis.* 277. C. oblongus niger: lateribus albidis.

*holstatis.* 278. C. oblongus exalbidus, thorace lineis duabus, ely-  
tris interne fuscis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Antennae setaceae ex-  
albidae. Thorax lineis duabus dorsalibus fuscis.  
Elytra interne fusca, externe albida. Corpus exal-  
bidum.

*pabulinus.* 279. C. oblongus viridis immaculatus, alis hyalinis.

*viridens.* 280. C. oblongus viridis, plantis antennarumque apici-  
bus rufis.

*pallens.* 281. C. oblongus pallidus capite corporeque atris.  
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Paruus.

Paruus. Caput atrum, antennis pallidis. Thorax, scutellum, elytra, pedes pallida, immaculata. Corpus atrum.

282. C. oblongus elytris ferrugineis latere albidis, antennis nigris, linea thoracis alba. dolabratius.
283. C. oblongus, capite thorace elytrisque nigris, scutello fuluo. calens.
284. C. oblongus, thorace elytrisque atris, linea flavâ fasciam elytrorum formante. Gronouii.
285. C. oblongus griseus immaculatus. ferus.
286. C. oblongus griseus, capite thoraceque linea nigra, vagans. pedibus testaceis.

Habitat in Suecia.

Statura omnino C. feri. Caput et thorax grisea linea longitudinali nigra. Scutellum nigrum punctis duobus paruis rufis. Elytra grisea interdum punctis aliquot obsoletis nigris. Alae exalbidae. Pedes testacei.

287. C. oblongus fuscus, capite thoraceque lineis tribus, cingulata elytris margine omni albo. tus.

Habitat in India orientali Dom. de Slanbusch.

Statura et affinitas C. marginelli. Antennae nigrae. Caput nigrum punctis duobus sub antennis, linea media orbitaque oculorum pallide rufescens. Thorax fuscus lineis tribus albidis lateralibus obliquis abbreviatis. Elytra obscure rufa sive fusca margine omni lineaque media obsoleta albis. Corpus subtus nigrum vtrinque linea alba.

288. C. oblongus niger, thoracis lineis tribus, elytris margine omni albis puncto que apicis coccineo. nillus.

289. C. oblongus niger, elytris flavo fusoque striatis apice pedibusque rufis. striatus.

290. C. oblongus fuluo maculatus, pedibus rufis: femoribus crassis dentatis. Abietis.

291. C. oblongus supra rubiginosus, elytris striis sanguineis, alis posticis albo fusoque variis. Vlmi.

292. C. corpore elongato fuso flavoque vario, femoribus posticis elongatis dentatis. pedestris.

*filiformis.* 293. C. antennis setaceis ferrugineis, corpore lineari pallide virescenti.

\*\*\*\*\* *Linearis, corpore angusto.*

*fossarum.* 294. C. linearis supra fuscus, thoracis scutellique marginibus lineaque dorsali flauis.

*lacustris.* 295. C. linearis niger, pedibus anticis breuissimis.  
Stoll. Cimic. 2. tab 9. fig. 63.

*stagnorum.* 296. C. linearis teretiusculus niger, thorace medio punctis duobus globosis.

*riuulorum.* 297. C. linearis niger albo punctatus, abdomine fuluo.

*pallipes.* 298. C. linearis niger, pedibus pallidis, pectore bispinoso.

*culiciformis.* 299. C. thorace multispinoso griseus, elytris lituris nigris, corpore elongato.

*angustatus.* 300. C. elongatus supra griseus subtus flavescentis, antennis pedibusque subtestaceis.

Habitat in China Dr. Pflug.

Statura omnino C. culiciformis at subtus totus flavescentis, subtus griseus.

*filum.* 301. C. linearis fuscus, alis abbreviatis, pedibus longissimis.

*longipes.* 302. C. linearis ater, thoracis margine elytrorumque fascia sanguinea.

*cursitans.* 303. C. linearis supra fuscus subtus cinerascentis, pedibus longissimis, ano bidentato.

*tipula-rius.* 304. C. linearis exalbidus, pedibus omnibus longissimis, femoribus clauatis, antennis bicaudatis.

*vagabundus.* 305. C. linearis, elytris aliquae fusco alboque variis, pedibus longissimis cinereo annulatis.

*clavipes.* 306. C. linearis cinereus, femoribus clauatis, antennis bioclauatis.

170. REDVVIUS. *Os rostro arcuato.*

*Antennae supra oculos inseratae.*

1. R. niger, thoracis margine elytrorumque fascia obsoleta flexuosa rufis. *gigas.*
2. R. antennis apice capillaribus, corpore subuilloso fusco. *personatus.*
3. R. niger, thorace abdominisque basi oliuaceis. *barbicornis.*  
*Cimex barbicornis* Drury. Ins. 3. tab. 45. fig. 1.
4. R. rufus, thorace maculis quatuor, elytris tribus nigris. *maculatus.*
5. R. glaber niger, elytris fuscis nigro maculatis: margini rufo. *stridulus.*  
Habitat Monspehæ Dom. Broussonet Mus. Dom. Banks primo vere agilis, antennas continuo motitans, thoracis attritu stridens.
- Paruus. Antennæ nigrae, triarticulatae. Thorax niger, nitidus striga transuersa, valde impressa. Scutellum triangulum, fuscum. Elytra intus fusco cinerea punctis tribus atris extus rufa. Alae fuscae macula atra. Corpus nigrum abdominis segmento 2. 3. 4. rufis. Pedes nigri anterioribus incrassatis.
6. R. ater, thorace oliuaceo, femoribus anticis rufis. *nitidulus.*
7. R. ater, thorace elytrorumque apice villosis cinereis, pilipes. pedibus hirtis.  
Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.
- Caput atrum postice attenuatum. Thorax villosus, cirens. Elytra cinerea basi atra. Alae albae. Corpus atrum. Pedes hirti, atri femoribus anticis tibiarumque basi cinereis.
8. R. ruber, elytris nigris basi fasciisque rubris. *longipes.*
9. R. supra rufus, alis nigris, abdomine atro: margine rufo. *marginalis.*
10. R. ater, elytris griseis nigro venosis, abdominis margini pedibusque posticis rufis. *rufipes.*  
Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

**Magnus.** Caput atrum, immaculatum, postice attenuatum. Thorax ater maculis tribus griseis marginalibus minoribus. Elytra grisea venis nigris. Alae obscurae. Abdomen atrum margine sanguineo. Pedes antici nigri, postici quatuor sanguinei.

**pustula-** 11. R. supra niger, elytris puncto apicis rufo.  
**tus.** Abdominis margo rufo maculatus.

**sandius.** 12. R. flavescentis, thoracis cruce impressa, elytris abdominalisque medio nigris.

Habitat in India Dr. Pflug.

**Medius.** Caput cum antennis flavescentis oculis nigris. Thorax flavescentis fascia media lineaque dorsali antica a fascia ad apicem ducta impressis nigris. Scutellum flavescentis. Elytra et alae nigra, immaculata. Abdomen nigrum margine flavescente nigro maculato. Pedes flavescentes.

**annula-** 13. R. antennis apice capillaribus, corpore nigro subtus sanguineo maculato.

**cruentus.** 14. R. rufus, capite pectore abdominalisque striis maculatis rufis.

Schaeff. Icon. 1. tab. 5. fig. 9. 10.

Habitat Monspeliacae Dr. Broussonet.

Statura et magnitudo R. annulati. Caput nigrum gulari striisque basi rubris. Antennae nigrae. Thorax rufus lobo antico nigro punctis duobus magnis rubris. Elytra rufa, immaculata. Alae obscurae. Pedes nigrum. Abdomen rufum lineis tribus punctorum nigrorum margineque nigro vario. Pedes rufi puncto femorum, genubus tarsisque rufis.

**cinctus.** 15. R. rufescens, antennis pedibusque flavo nigroque annulatis.

**bicolor.** 16. R. ater, thorace postice elytris abdominalisque marginie obscure pallidis.

**litura.** 17. R. obscure fuscus antennarum apice elytrorumque litura media albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

**Parvus.** Antennae nigrae apice albae. Caput nigrum, immaculatum. Thorax fuscus cruce media impressa. Elytra fusca venis lituraque media, quae fere fasciam constituit albis. Corpus et pedes fuscus.

18. R.

18. R. testaceo nigroque varius, thorace antice testaceo: *attelaboides.*  
dentibus duobus nigris.
19. R. ater thorace postice scutello, elytrorum margine pilicornis.  
abdomine femoribusque basi rufis.  
Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
- Medius. Antennae hirtae, nigrae. Caput atrum, nitidum tuberculo verticis magno eleuato stemmatibus duobus. Thorax antice ater, postice rufus. Scutellum rufum, apice emarginatum. Alae omnes atrae margine vsque ad medium rufo, Pe<sup>c</sup>tus atrum. Abdomen basi rufum apice nigrum. Pedes atri, nitidi femoribus basi rufis.
20. R. fuscus, capite abdominis margine pedibusque oli. *quadri-*  
*uaceis,* thorace antice quadridentato. *quadridens.*
21. R. elytrorum basi antennis pedibusque rubris, tibiis *nigripes* anticis hirsutissimis.
22. R. thorace subspinoso ater immaculatus, tibiis cylindrica-  
hirtipes.] dricis hirsutissimis.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Statura omnino praecedentis, at totus ater immaculatus. Thorax vtrinque spina breui, obtusa. Tibiae quatuor anticae cylindrica, obtusae, hirtae.
23. R. niger, thorace elytrisque obscure ferrugineis, scutello lineola media alba. *haemorrhoidalis.*  
Habitat in Barbaria Dom. Vahl.  
Statura praecedentium. Corpus nigrum abdominis margine albo vario anno sanguineo. Thorax obscure ferrugineus margine postico ab apice ad scutellum albo. Scutellum nigrum linea media alba. Elytra obscure ferruginea, immaculata. Femora rufa. Tibiae nigrae.
24. R. thorace subspinosa atra, elytris lineola, abdominis *lineola.*  
margine femorumque articulatione sanguineis.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Statura omnino praecedentium. Caput, thorax, scutellum atra, immaculata. Elytra atra lineola sanguinea versus apicem. Alae atrae. Abdomen nigrum margine annoque sanguineis. Pedes atri femorum articulatione sanguinea. Tibiae anticae incuruae, hirtae.

- collaris.* 25. R. ater, elytris postice albis, capite postice attenuato cylindrico.
- varius.* 26. R. rufo nigroque varius, abdominis margine dente medio erecto obtuso.
- sexguttatus.* 27. R. thorace subspinoso niger, elytris maculis tribus albis.
- quadriguttatus.* 28. R. thorace postice testaceo, elytris aliquæ atris: maculis quatuor lacte flavis.
- punctatum.* 29. R. thorace testaceo, elytris aliquæ nigris: macula media flava.
- 2 punctata.* 30. R. niger, elytris pallidis: puncto atro, ab domine rufo: ano atro.
- Habitat in India orientali.
- Parvus. Caput et thorax atra, immaculata. Scutellum nigrum basi albi in primis in medio. Elytra pallida puncto magna atro. Alae pallidae macula magna nigra. Abdomen rufum ano atro. Pedes nigri antice brevibus, compressis.
- hamatus.* 31. R. niger, elytris basi pallidis, alis macula communis rufa, pectore spinoso.
- iracundus.* 32. R. niger, thorace abdominalisque marginibus rubro maculatis, elytris rufis.
- fuscipes.* 33. R. rufus, thoracis fascia, elytrorum margine interiori pedibusque fuscis.
- Habitat in India orientali Dom. Lund.
- Statura R. iracundi at paulio minor. Rostrum basi rufum apice nigrum. Caput postice attenuatum. Thorax rufus fascia lata fusca. Elytra rufa margine interiori fusca. Alae nigricantes. Scutellum basi rufum apice nigrum. Corpus rufum nigro maculatum. Pedes fuscis fechoribus basi parum rufis.
- bifidus.* 34. R. ater, elytris fascia rufa, scutello spina erecta apice bifida.

Habitat in China Dr. Pflug.

Magnus. Caput, thorax, scutellum, corpus atra, immaculata. Caput postice attenuatum, cylindricum. Scutellum in medio spina elongata, erecta, apice bifida. Elytra nigra fascia lata rufa in medio. Abdominis mar-

margo valde eleuatus, carinatus. Pedes atri tibiis anticus ante apicem parum rufis.

35. R. thorace scutelloque acute spinosis, elytris puncto biguttato albo. Stoll. Cimic. 2. tab. 11. fig. 64.

36. R. niger, elytris ferrugineis, rostro antennis tibiisque serratus. flavis, scutello cristato serrato.

Stoll. Cimic. 2. tab. 1. fig. 6.

37. R. fusens, antennarum annulis tibiis abdominisque albipes. punctis lateralibus albis.

38. R. thorace elytrisque obscure ferrugineis, abdome tessellatus atro: in margine albo vario.

Habitat Monspeliae Dr. Broussonet Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentium. Caput nigrum rubro punctatum. Antennae nigrae. Thorax lobo antico nigro testaceo maculato, postico obscure ferrugineo, margine postico acuto albido. Scutellum nigrum linea dorsali alba. Elytra obscure ferruginea, immaculata. Alae obscurae. Corpus subtus fuscum abdome atro nitido margine albo vario. Pedes rufi femoribus intus nigris.

39. R. corpore villoso griseo, abdominis margine nigro aegyptius variegato.

40. R. niger, capite thoraceque spinosis. diadema

41. R. thorace nigro postice spinis quatuor flavis, scutello apice recurvo spinoso. 5 spinosus

42. R. niger elytris apice aliisque medio puncto albo, scutello apice recurvo spinoso. scutellaris

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Medius. Caput et thorax atra, immaculata, inermia. Scutellum apice recurvum, acutum, subspinosum. Elytra nigra apice macula magna alba. Alae fuscae puncto medio albo. Abdomen atrum punctis marginibus albis. Pedes atri.

43. R. capite thoraceque nigris, elytris flavescentibus: fasciatus. fascia, aliis apice nigris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Paruus magis elongatus. Caput atrum, immaculatum spinis duabus pone antennas erectis, subulatis. Thorax ater, immaculatus. Elytra flavescentia fascia lata

nigra. Alae flavescentes apice nigrae. Abdomen rufum ano nigro. Pedes antici flavi, secundi flavi femoribus basi nigris, postici nigri femoribus annulo rufo.

*maurus.* 44. R. ferrugineus, abdominis margine nigro maculato, thorace antice subspinoso.

*Acan-*  
*tharis.* 45. R. thorace spinoso, abdome spinis ciliato.

*guttula.* 46. R. ater nitidus, elytris pedibusque sanguineis, alis puncto albo.

Habitat in Germania Dr. Heisse.

*Medius.* Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Scutellum atrum. Elytra rubra puncto parvo atro ad suturam. Alae nigrae puncto magno marginali albo. Abdomen atrum, immaculatum. Pedes rufi femoribus anticis incrassatis, vnidentatis.

*elongatus* 47. R. elongatus rufus, antennis pedibusque nigris.

171. PVLEX. *Rostrum* vagina quinque articulata, seta vnica.

*Laminae* duae ouatae basin rostri tegentes.

*Antennae* moniliformes.

*irritans.* 1. P. rostro corpore breuiore.

*penetrans* 2. P. rostro corporis longitudine.

172. APHIS. *Rostrum* vagina quinque articulata, seta vnica.

*Labium* fornicatum.

*Antennae* fetaceae.

*longiro-*  
*stris.* 1. A. cinereus, rostro corpore triplo longiore.

Habitat Dresdae sub arborum corticibus formicarum larvis viettans.

Medius.

- Medius. Rostrum longissimum, cylindricum, quo laruarum succum haurit.
2. A. Lychnidis diricæ. *Lychnidis Capreæ.*
  3. A. Salicis Capreæ. *Capreæ.*
  4. A. Sambuci nigrae. *Sambuci.*
  5. A. Solidaginis Virgaureæ. *Solidaginis.*
  6. A. Pruni Cerasi. *Cerasi.*
  7. A. Ribis rubri. *Ribis.*
  8. A. Arundinis Epigeiri. *Arundinis.*
  9. A. Populi nigrae. *Populi nigrae.*
  10. A. Gallii Aparines. *Aparines.*
  11. A. Aceris campestris. *Aceris.*
  12. A. Ruminicis Lapathi. *Ruminicis.*
  13. A. Pastinacæ satiuæ. Linn. Syst. Nat. 2. 734. 3. Fn. *Pastinacæ.*  
Su. 977.  
Habitat in *Pastinaca sativa*.
  14. A. Pruni domesticae. *Pruni.*
  15. A. Cardui Acanthoidis. *Cardui.*
  16. A. flauescens, abdomine viridi, antennis pedibusque *Achilleæ.* albidis.
  17. A. plantarum aquatricarum. Linn. Syst. Nat. 2. 734. 10. *Nymphaeæ.*  
Fn. Su. 983.  
Habitat in *Nymphaeis, Potamogeton.*
  18. A. Corni sanguineæ. *Corni.*
  19. A. Artemisiae Absinthii. Linn. Syst. Nat. 2. 735. 19. *Absinthii.*  
Fn. Su. 991.  
Habitat in *Artemisia Absinthio.*
  20. A.

*Millefolii.* 20. A. fusca abdomine virescente, antennis pédibus corniculisque nigris.

*Euonymi.* 21. A. Euonymi europaei.

*Auenae.* 22. A. Auenae satiuae.

*Fraxini.* 23. A. Fraxini excelsioris.

*Fagi.* 24. A. Fagi syluaticae lunata. Linn. Syst. Nat. 2. 735. 23.  
Fn. Su. 994.

Reaum. Ins. 3. tab. 26. fig. 1.

Geoff. Ins. 1. 497. 2.

- Habitat in Fago syluatica.

*Betulae.* 25. A. Betulae albae.

Costa alae anticae virescens,

*Alni.* 26. A. Betulae Alni.

*Populi.* 27. A. Populi tremulae.

*Viburni.* 28. A. Viburni Opuli.

*Mali.* 29. A. Pyri mali.

*Rosae.* 30. A. Rosae.

*Atriplicis* 31. A. Atriplicis hortensis.

*Picridis.* 32. A. Picridis hieracioides.

*Aegopodii.* 33. A. Aegopodii podagrariae.

*Dauci.* 34. A. Dauci Carotae.

*Vrticae.* 35. A. Vrticae dioicae.

*Tanaceti.* 36. A. Tanaceti vulgaris.

*Vlmi.* 37. A. Vlmi campestris.

*Papaveris.* 38. A. Papaveris somni féri.

*Tiliae.* 39. A. Tiliae europeac.

40. A.

40. A. Iuniperi communis.	<i>Iuniperi.</i>
41. A. Brassicae oleraceae.	<i>Brassicae.</i>
42. A. Quercus Roboris.	<i>Roboris.</i>
43. A. Quercus Roboris.	<i>Quercus.</i>
44. A. Pini sylvestris ramulorum.	<i>Pini.</i>
45. A. Pini sylvestris foliorum.	<i>Pineti.</i>
46. A. Salicis fragilis et viminalis.	<i>Salicis.</i>
47. A. Pistaciae Lentisci.	<i>Pistaciae.</i>
48. A. Romicis Acetosae.	<i>Acetosae.</i>
49. A. Ligustici scotici.	<i>Ligustici.</i>
50. A. Pruni Padi.	<i>Padi.</i>
51. A. Viciae Craccae.	<i>Viciae.</i>
52. A. Lactucae oleraceae.	<i>Lactucae.</i>
53. A. Sonchi oleraceae.	<i>Sonchi.</i>
54. A. Vitis viniferae.	<i>Vitis.</i>

173. CHERMES. *Rostrum* *vagina pectorali*.  
*Setae* *tres inflexae*.  
*Antennae* *cylindricae*.

1. C. Airae flexuosa.	<i>Graminis.</i>
2. C. Vimi campestris.	<i>Vimi.</i>
3. C. Pyri communis.	<i>Pyri.</i>
4. C. Cerastii viscosi.	<i>Cerastii.</i>
5. C. Buxi semper virentis.	<i>Buxi.</i>
6. C. Fagi syluaticae.	<i>Fagi.</i>

7. C.

- Sorbi.* 7. C. Sorbi aucupariae.  
*Amygdali.* 8. C. Amygdali persicae.  
*Calthae.* 9. C. Calthae palustris.  
*Vrticae.* 10. C. Vrticae dioicae.  
*Betulae.* 11. C. Betulae albae.  
*Alni.* 12. C. Betulae Alni.  
*Abietis.* 13. C. Pini Abietis.  
*Salicis.* 14. C. Salicis viminalis et fragilis.  
*Fraxini.* 15. C. Fraxini excelsioris.  
*Aceris.* 16. C. Aceris platanoidis.  
*Ficus.* 17. C. Ficus Caricae.

174. COCCVS. *Rostrum* vagina setisque pectoralibus.

*Antennae* filiformes.

- Hesperidum.* 1. C. hybernaculorum.  
*Aonidum.* 2. C. indarum arborum.  
*capensis.* 3. C. ouatus subtomentosus conico gibbus, apice operculato. Linn. Syst. Nat. 2. 740. 3. Amoen. Acad. 6. 401. 47.  
     Habitat in Gnaphalio muricato Cap. Bon. Spec.  
*Adonis.* 4. C. Adonidum.  
*dum.*  
*Quercus.* 5. C. Quercus Roboris.  
*Ilicis.* 6. C. Quercus cocciferae.

7. C.

7. C. Ficus religiosae et indicae. *Ficus.*  
*Coccus Laccæ Rerr. Act. Engl. 1781. 374. fig. a. b.*  
 Habitat in Indiae orientalis Ficu religiosa, et' indica  
 Gummi Laccani producens.  
 Corpus rubrum. Antennæ ramosæ. Cauda biseta.
8. C. Vlmi campestris. *Vlmi.*
9. C. Coryli auellanae. *Coryli.*
10. C. Betulae albae. *Betulae.*
11. C. Carpini Betuli. *Carpini.*
12. C. Tiliae europeæ. *Tiliae.*
13. C. Ruscii. *Ruscii.*
14. C. Myricaæ querci foliae, Linn. Syst. Nat. 2. 741. 13. *Myricaæ.*  
 Habitat in Myrica quercifolia Cap. Bon. Spei.
15. C. Salicis capreæ. *Salicum.*
16. C. radicis Hieracii Pilosellæ. *Pilosellæ.*
17. C. radicis Vuæ vrsi. *Arbuti.*
18. C. radicum Phalaridis. *Phalari-  
dis.*
19. C. Crataegi oxyacanthæ. *Crataegi.*
20. C. Serratulae arvensis. *Serratu-  
lae.*
21. C. Vitis viniferae. *Vitis.*
22. C. Zosteræ marinae. *Zosteræ.*
23. C. radicis Sileranthi perennis. *polonicus.*
24. C. Cacti coccinelliferi. *Cacti.*

175. THRIPS. *Rostrum* obsoletum intra os  
absconditum.

*Antennae* filiformes.

*physapus.* 1. T. elytris glaucis, corpore atro.

*iuniperi-* 2. T. elytris niueis, corpore fusco.


*na.*

*Vlmi.* 3. T. nigra, alis niueis ciliatis, ano acuminato.

*minutissi-* 4. T. elytris corporeque glaucis, oculis fuscis.  
*ma.*

*Vrticae.* 5. T. flava, elytris albidis.

*fasciata.* 6. T. elytris albo nigroque fasciatis, corpore fusco.



## CLASSIS VIII.

### A N T L I A T A.

176. OESTRVS. *Haustellum retractum intra labia connata poro pertusa.*

*Antennae setariae.*

1. O. griseus, facie alba nigro punctata. *buccatus.*
  2. O. thorace flavo: fascia nigra, alis albis fusco fasciatis. *Bouis.*
  3. O. alis immaculatis, thorace flavo: fascia nigra, abdomine nigro: fulvo apice nigro. *Tarandi.*
  4. O. alis immaculatis, thorace ferrugineo, abdome nigro: pilis flavis. *Equi.*
    - α. *Oestrus nasalis* Sp. Inf. 2. 399. 4.
    - β. *Oestrus haemorrhoidalis* Sp. Inf. 2. 399. 5.
    - α. et β. merae varietates nullo modo specie sed tantum loco diversae.
  5. O. alis subpunctatis, abdome nigro alboque versicolor. *Ovis.*
- Praecedentibus paullo minor.

177. TIPVLA. *Haustellum absque vagina.*

*Palpi duo porrecti, filiformes ad basin proboscidis.*

*Antennae filiformes.*

\* *Alis patentibus.*

1. T. antennis pectinatis, alis macula nigra, abdome basi pectinato rufo, medio flavo fasciato, apice atro. *pectinati cornis.*
2. T. alis hyalinis: riuulis maculaque nivea, riuosa.

- sinuata.* 3. T. alis albis: margine sinuato maculisque fuscis, corpo-  
re cinereo, pedibus ferrugineis.
- macu-  
ata.* 4. T. alis fusco venosis: margine maculisque quatuor fu-  
scis, abdomine supra flauescente.
- crocata.* 5. T. alis macula fusca, abdomine atro: fasciis fuluis.
- hortorum* 6. T. alis hyalinis: maculis sparsis obsoletis.
- oleracea.* 7. T. alis hyalinis: costa marginali fusca.
- tricolor.* 8. T. alis albidis: margine exteriori neruoque apice bifi-  
do fuscis.
- triangu-  
laris.* 9. T. alis dimidiato fuscis: macula triangulari alba.
- variega-  
ta.* 10. T. nigra, abdominis basi lateribusque rubris flauo ma-  
culatis.
- contami-  
nata.* 11. T. atra, alis albis: fasciis duabus punctoque nigris.
- lunata.* 12. T. alis cinerascentibus: lunula marginali alba, corpo-  
re flauescente.
- turcica.* 13. T. alis venosis: lunula marginali alba, corpore cine-  
reo, abdomine linea dorsali nigra.
- Habitat Kiliae Dom. Daldorf.  
Statura omniaco T. lunatae. Corpus cinereum linea  
dorsali lata abdominis nigra. Pedes nigri femori-  
bus testaceis. Alae nigro venosae lunula marginata  
li alba.
- pratenis.* 14. T. thorace variegato, abdomine fusco: lateribus flauo  
maculatis, fronte fulua.
- dorsalis.* 15. T. flauescens, dorso fusco, alis hyalinis: macula mar-  
ginali nigra.
- plumbea.* 16. T. fusco cinerea, alis albis: costa neruisque nigris.
- cornicina.* 17. T. alis hyalinis: puncto marginali fuscus, abdomine  
flauo: lineis tribus fuscis.

18. T. alis glaucis: puncto marginali corporeque atris, *atrata*.  
abdominis segmento primo pedibusque rufis.
19. T. alis fuscis, corpore atro. *nigra*.
20. T. nigra, femoribus testaceis tarsisque posticis albis. *albimana*  
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.  
Media. Caput atrum ore testaceo. Thorax ater, nitidus, immaculatus. Abdomen nigrum macula una alterae obsoleta apicis ferruginea. Pedes elongati nigri femoribus testaceis tarsisque posticis albis.
21. T. fusca, tarsis albo annulatis medio ouatis incrassatis. *clavipes*.
22. T. alis hyalinis: maculis duabus fuscis, abdominis *bimaculata*.  
medio maculato ferrugineo, antennis plumosis.
23. T. alis fuso variegatis, femoribus annulo albo. *annulata*.
24. T. alis albidis: maculis plurimis ocellaribus nigrican- *ocellaris*.  
tibus.
25. T. alis albidis: punctis tribus fuscis, corpore cinereo *cinerea*.  
immaculato.
26. T. alis albidis: fasciis quatuor fuscis flexuosis, abdo- *fasciata*.  
mine flauescente.
27. T. testacea, capite lineaque thoracis dorsali nigra, *melanocera*.  
alis hyalinis: strigis tribus fuscis. *phala*.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Parua. Caput valde porrectum cum antennis nigrum.  
Thorax gibbus, testaceus linea dorsali nigra. Abdomen cylindricum, testaceum linea dorsali baseos nigra. Alae hyalinae strigis tribus abbreviatis fuscis.  
Pedes testacei genubus fuscis.
28. T. alis albis: punctis tribus marginalibus fuscis, tho- *6 punctata*.  
rae compresso fulvo: linea dorsali nigra. *ta*.
29. T. fusca, alis obscuris cinereo maculatis maculisque *flavipes*.  
tribus costalibus fuscis, pedibus flauescensibus: geniculis fuscis.

## Habitat Kiliae.

**Media.** Caput et thorax fusca, immaculata. Halteres flavi annulo fuscō ante apicem. Abdomen fuscum segmentorum marginibus flavis. Pedes elongati flavescentes geniculis fuscis. Alae obscurae maculis cinnereis sparsis maculisque tribus distinctis fuscis in margine crassiori.

*tripunctata.* 30. T. alis hyalinis: punctis tribus marginalibus fuscis, corpore flavo.

*flavescens* 31. T. alis immaculatis, corpore flavo.

*vegetationis.* 32. T. alis hyalinis nitentibus, corpore cinereo fuscō.

*pilipes.* 33. T. cinerea, alis striatis fuscescentibus, tibiis anticis pilosis.

## Habitat Kiliae.

**Media.** Corpus cinereum thorace substriato. Abdomen planum, cinereum anno rufo. Alae fuscescentes nigro striatae punctoque postico fuscō, distincto. Pedes flavescentes tibiis anticis pilosis.

*morio.* 34. T. alis albis: punto marginali fuscō, atra pedibus pallidis.

## Habitat Kiliae.

**Parua.** Corpus atrum, immaculatum. Alae albae puncto marginali fuscō. Pedes pallidi, immaculati.

*replicata.* 35. T. alis hyalinis: margine tenuiori recurvato, corpore fuscō, antennis simplicibus.

*monoptera.* 36. T. nigra pedibus palpisque pallidis,

\*\* *Alis incumbentibus.*

*plumosa.* 37. T. thorace virescente, alis albis: punto fuscō, antennis plumosis.

*motitatrix.* 38. T. pedibus anticis maximis motatoriis: annulo albo.

*pilicornis* 39. T. pedibus anticis maximis motatoriis nigricans thorace lineato, alis albis immaculatis.

Habi-

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Statura omnino T. fasciculatae at paullo maior. Antennae magnae fasciculato plumosae. Thorax obscure cinerascens, nigro lineatus. Abdomen nigrum. Alae albae omnino immaculatae. Pedes omnes nigri.

40. T. pedibus anticis maximis motatoriis nigra, abdō- *fascicula-*  
minis lateribus ferrugineo maculatis. *ta.*
41. T. ferruginea, alis albis immaculatis, pedibus anticis *tendens.*  
longissimis pallidis.
42. T. pedibus anticis longissimis motatoriis nigris: an- *tremula.*  
nulis albis.
43. T. pedibus anticis motatoriis omnibus pallidis, alis *flexilis.*  
fascia fuscescente.
44. T. pedibus anticis maximis motatoriis apice albis. *vibrato-*  
*ria.*
45. T. pedibus anticis elongatis fusca, abdomine flave- *varia.*  
scente, alis albo nigroque variis.

Habitat Kiliae.

Media inter congeneres. Caput et thorax fusca immia-  
culata. Abdomen flauum. Alae albo fusoque val-  
de variegatae. Pedes flavescentes, antici parum  
elongati.

46. T. atra, pedibus rufis, alis medio nigris basi flave- *rufipes.*  
scentibus. Linn. Syst. Nat. 2. 979. 62. Fn. Su. 1778.

Habitat Hafniae Dom. Lund.

Descriptio Faunae suecicae omnino concurrit, at ma-  
gnitudo T. plumosae.

47. T. nigra, abdominis segmentis apice albis, alis pun- *striatica.*  
cto fuso.
48. T. pallida pilosa, pedibus nigro punctatis. *pallida.*
49. T. fusca, thoracis linea laterali pedibusque albidis *pilicernis.*  
immaculatis.

Habitat Hafniae Dom. Lund.

Summa affinitas T. pallidae, at pedes omnino immaculati. Antennae flabellatae. Alae ciliatae albidae.

- flabelli-* 50. T. pallida, ab domine nigro annulato, alis maculatis.  
*cornis.*  
*cincta.* 51. T. liuida, alis maculis tribus marginalibus nigris, ab domine nigro albo annulato.

- Arundi-* 52. T. albida, antennis villosis, oculis atris,  
*neti,*  
*littoralis.* 53. T. virescens, alis immaculatis, pedibus anticis lon-  
*gissimis.*

- monilis.* 54. T. pedibus albis: annulis nouem nigris, alis albo el-  
*nereoque variis.*

- Zonata.* 55. T. pallida, alis fasciis duabus punctisque tribus fuscis,  
*femoribus angulo fuso.*

- inzeroce-* 56. T. virescens, oculis thoracisque tergo nigris.  
*phala.*

- viridula.* 57. T. viridis, antennis verticillato pilosis, pedibus pa-  
*lidis.*

- genicula-* 58. T. subitus flauescens, thorace, lineis, ab domine, dorso  
*ta.* nigris, alis albis immaculatis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Cörper parvum flauescens. Capit flauescens. Tho-

rax supra lineis tribus nigris, lateralibus marginem  
 anticum haud contingentibus. Abdominis dorsum ni-

grum. Alae albae, immaculatae. Pedes pallescen-

tes geniculis nigris.

- pallipes.* 59. T. glabra fusca, alis hyalinis immaculatis, pedibus pa-  
*lescentibus.*

Habitat Kiliae.

Parua. Corpus totum fuscum, immaculatum. Alae hya-

linae, nitidae. Pedes pallescentes.

- pustula.* 60. T. viridis, thoracis tergo maculis tribus nigris, an-
- tennis maris plumosis.

- brevicor-* 61. T. nigra glabra, alis margine nigricantibus, ab domi-
- niis, tibiis anticis spinosis.

62. T. alis hyalinis: margine exteriori nigro. *hortulana.*
63. T. nigra glabra, alis albis: puncto nigro, antennis breuibus, pedibus nigris. *Iohannis.*
64. T. nigra glabra, alis hyalinis: puncto nigro, femoribus ferrugineis. *Pomona.*
65. T. atra glabra, thorace rufo. *ruficollis.*
66. T. atra glabra, abdomine basi rufo, antennis incrassatis pilosis. *Chrysanthemi.*
- Habitat in Hispaniae Chrysanthemo coronario Dom. Vahl.
- Statura omnino et magnitudo T. Thomae. Caput et thorax nigra, glabra, immaculata. Abdomen cylindricum basi rufum, apice nigrum. Alae obscurae. Pedes nigri. Antennae singulares vix huius generis articulo primo maiori, cylindrico, crassiori, piloso, secundo breviori subulato.
- Aliam simillimam itidem e Hispania misit Dom. Vahl, at abdomine nigro toto, forte mera varietas sexus.
67. T. atra glabra, alis nigris, abdominis lateribus linea crocea. Schaeff. Icon. tab. 209. fig. 6, 7. *Thomae.*
68. T. atra oblonga hirta, alis costa nigricante. *febrilis.*
69. T. atra hirta, pedibus ferrugineis, posticis elongatis. *rufipes.*
70. T. abdomine cylindrico atro, alis fusco hyalinis, ano forcipata appendiculato. *appendiculata.*
71. T. cinerea, alis albis: margine villoso. *iuniperina.*
72. T. hirsuta, alis deflexis quatris ciliatis albo nigroque tessellatis. *hirta.*
73. T. alis deflexis cinereis ouato lanceolatis ciliatis. *phalaenoides.*
74. T. atra, alis incumbentibus subciliatis. *Persicariae.*
75. T. cinerea, pedibus pallidis, alis inaculis duabus nigricantibus. *cunicifarmis.*

- palustris.* 76. T. pallida, capite atro, abdomine rufescente.  
*longicor- nis.* 77. T. antennis corpore incarnato longioribus.  
*sericea.* 78. T. nigra, dorso atro, thoracis lateribus caluis, halteribus flauis.  
*pulicaris.* 79. T. nigra, thoracis lateribus, scutello abdome que flauis.  
*pennicor- uis.* 80. T. antennis bipectinatis, corpore atro, halteribus albis.

178. BIBIO. *Haustellum* fetis tribus vaginaque vniuersali.

*Palpi* breuissimi.

*Antennae* basi connatae acuminatae.

- filata.* 1. B. antennis subclauatis nigra, abdominis segmento secundo lateribus pellucido, femoribus posticis serratis.  
*illucens.* 2. B. abdominis nigri segmento secundo lateribus pellucidis, plantis albis.  
*bilineata.* 3. B. atra, thorace lineis duabus albis, tibiis basi ferrugineis.  
*aenea.* 4. B. nigra tomentosa, abdome aeneo.  
*plebeja.* 5. B. cinereo hirta, abdome conico, segmentis margine albis.  
*margina- ta.* 6. B. atra, abdome conico, segmentis margine albis, alis maculatis.  
*nobilita- ta.* 7. B. ferrugineo hirta, abdome conico fulvo, ano atro.  
*lugubris.* 8. B. hirta atra, ore cinereo, tibiis testaceis.

Habitat Kiliae.

Statura omnino B. anilis at tota hirta atra. Os cinereo pilosum. Alae albidae, immaculatae. Pedes testacei femoribus nigris.

9. *B. villosa* albo canescens, alis hyalinis. *anilis.*
10. *B. fusca*, alis nigris albo variegatis, scutello piceo. *nigrita.*
11. *B. hirta fusca*, abdomine vtrinque maculis duabus al- *Lar.*  
bis, alis nigris macula marginali apiceque albis.
12. *B. hirta atra*, alis nigris apice hyalinis. *Morio.*
13. *B. hirta atra* albo fasciata, alis nigris: margine tenuio- *Maura.*  
re sinuato hyalino.
14. *B. hirta atra*, alis nigris apice albis: punctis duobus *Aethiops.*  
ano argenteo.
15. *B. hirta fusca*, abdomine albo maculato: lateribus fer- *capucina.*  
rugineis, alis albo nigroque variis.
16. *B. fusca*, abdomine atro: segmento primo basi, vlti- *Satyrus.*  
mis lateribus albis.  
Habitat et in China.
17. *B. hirta flauescens*, alis hyalinis: costa fusca. *Hotten-*  
*totta.*
18. *B. fusca*, abdomine albo strigoso, alis basi fuscis: pun- *Syluanus.*  
cto albo.
19. *B. hirta atra*, abdomine segmentorum marginibus al- *Sabaeus.*  
bidis, alis albis basi exteriore nigris.  
Aliam simillimam ex Hispania misit Dom. Vahl, at seg-  
mentorum marginibus lateribus tantum flauis.
20. *B. hirta flauescens*, alis fuscis, femoribus testaceis. *Sphinx.*  
Habitat in India orientali.  
Statura et summa affinitas *B. lucifer* at duplo fere ma-  
ior. Corpus supra subtusque totum hirtum, flau-  
scens. Alae fuscæ margine tenuiori pallidiori. Fe-  
mora omnia testacea. Tibiae posticae supra testa-  
ceæ.
21. *B. hirta flauescens*, alis fuscis basi ferrugineis. *Lucifer.*
22. *B. hirta fusca*, alis hyalinis: macula marginali baseos *Troglo-*  
*argentea.* *dyta.*

179. STRATIOMYS. *Haustellum seta vnica  
absque vagina.**Palpi breues, capitati.**Antennae acuminatae,  
basi connatae.*

*testacea.* 1. S. scutello bidentato testacea, abdominis primo segmento fuscescente.

Habitat in America meridionali.

Magna glabra. Caput testaceum oculis nigris. Thorax sublineatus, testaceus scutello bidentato nitido immaculato. Abdomen testaceum, nitidum primo segmento basi fuscescente. Pedes testacei. Alae testaceo colore tinctae.

*chamaeleon.* 2. S. scutello bidentato luteo, abdomine nigro: fasciis lateralibus luteis.

*splendens.* 3. S. scutello bidentato aureo tomentosus, abdomine fasciis nigris.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Statura et magnitudo omnino S. chamaeleontis. Antennae nigrae. Corpus tomentoso aureo splendens abdominis segmentis basi nigris.

*ephippium.* 4. S. scutello bidentato, thorace rufo vtrinque spinoso.

*crucis.* 5. S. scutello bidentato nigro, abdomine atro: maculis duabus lateralibus apiceque flauis.

Habitat in Insula St. Crucis Americae meridionalis Dom. Lund.

Magna. Antennae flavae. Os pube aurea. Oculi magni nigri. Thorax fuscus tomento aureo villosus. Scutellum bidentatum, atrum. Abdomen atrum maculis duabus lateralibus flauis. Anus flauicat. Pedes testacei femoribus nigris.

*microleon* 6. S. Scutello bidentato, abdomine atro: strigis lateralibus albis.

*strigata.* 7. S. scutello bidentato, abdomine atro: subtus strigis albis.  
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

8. S. scutello bidentato, abdomine supra atro : segmento- *pallipes*.  
rum marginibus vtrinque albidis.

9. S. scutello bidentato tomentoso grisea, abdomine basi *mutabilis*  
nigra, alarum costa ferruginea.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Media. Antennae porrectae, nigrae, basi ferrugineae.

Caput et thorax tomentoso grisea proboscide atra.  
Scutellum bidentatum basi pallidum. Abdomen ni-  
grum certo situ tomento griseo splendens apice sub-  
ferrugineac. Alae albidae costa lata ferruginea. Pe-  
des grisei femoribus atris.

10. S. scutello bidentato atra, abdomine supra strigis dua- *fasciata*.  
bus albis, subtus argenteo.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae porre-  
ctae, nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Ab-  
domen atrum supra strigis duabus in medio interru-  
ptis albis, subtus argenteum, nitidulum. Halterum  
clava argentea. Alae albidae costa lata fusca. Pedes  
pallescentes femoribus nigris.

11. S. scutello bidentato atra, abdomine subtus rufo. *tigrina*.

12. S. scutello bidentato nigro, abdomine viridi nigro an- *hydroleon*  
gulato.

13. S. scutello bidentato viridis, abdomine flauescente: *viridula*.  
macula apicis atra.

14. S. scutello bidentato, corpore viridi, thorace lineis *trilineata*  
abdomine fasciis nigris.

15. S. scutello bidentato flavo, corpore nigro flavo varie. *hypoleon*.  
gato. Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 15.

16. S. scutello quadridentato nigra, abdomine albo lineato. *quadrili-*  
neata. Habitat in Sierra Leon. Dr. Pflug.

Statura et magnitudo S. clavipes. Antennae pilosae ni-  
grae apice albae. Caput nigrum orbita oculorum  
alba. Thorax niger tomento violaceo. Scutellum  
quadridentatum nigrum dentibus flavis. Abdomen  
nigrum lineis quatuor longitudinalibus albis exterio-  
ribus, marginalibus. Alae obscurae. Pedes nigri.

- clauipes.* 17. S. scutello sexdentato atra, abdomine ferrugineo.  
*sexdenta-* 18. S. scutello sexdentato, thorace aeneo, abdomine nigro.  
*ta.*  
*margi-* 19. S. scutello inermi nigra, abdominis margine tibiisque  
*nata.* albidis.  
*mutica.* 20. S. scutello inermi atra, abdomine niueo apice atro.

*Musca vliginosa* antennis clavatis mucronatis, abdomi-  
 nis dorso albo: segmentis duobus penultimis: striga  
 alba. Linn. Syst. Nat. 2. 982. 22.

180. RHAGIO. *Haustellum* setis tribus abs-  
 que vagina.

*Palpi* duo basi setarum exte-  
 riorum inserti.

*Antennae* filiformes.

- scolopa-* 1. R. cinereus, abdomine flauescente trifariam nigro pun-  
 ceus. cato, alis nebulosis.  
*tringa-* 2. R. cinereus, abdomine flauescente trifariam nigro pun-  
 riuss. cato, alis immaculatis, thorace vnicolore.  
*vermilio.* 3. R. cinereus, abdomine trifariam nigro punctato, alis  
 iminaculatis, thorace maculato.  
*lineatus.* 4. R. thorace lineato, abdomine nigro, alis hyalinis: ma-  
 culâ apiceque fuscis.  
*fuscatus.* 5. R. thorace cinereo nigro lineato, abdomine fusco, alis  
 macula marginali nigra: puncto cinereo.  
*Tipula fuscata* Spec. Inf. 410. 57.  
*Musca fuscata* nigricans, alis antice albo nigroque va-  
 riis. Fn. Su. 2310.  
*Habitat* in Suecia.  
*fasciatus.* 6. R. testaceus, abdomine nigro fasciato, alis hyalinis:  
 macula apicis fusca.  
*tipulifor-* 7. R. fuscus alis albis apice nigris.  
*mis.*

8. R.

8. R. thorace ferrugineo, abdomine atro: maculis latera- *flavipes*. libus flavis.
9. R. abdomine nigro segmentorum marginalibus albis, *macula-*  
*alis fuscō hyalinis*: maculis duabus nigris. *tus*.
10. R. nigricans, thorace cinereo: lineis duabus nigris, *punctatus*  
*alis hyalinis*: maculis marginalibus nigris.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Parvus. Caput nigrum antennis filiformibus. Thorax cinereus lineis duabus dorsalibus abbreviatis nigris. Abdomen planum, nigrum abdominalis segmentis margine parum pallidis. Alae hyalinae margine crassiori in medio maculis aliquot nigris. Pedes nigri femoribus testaceis.

11. R. testaceus maculis abdominalis lateralibus nigris, *an-* *longicor-*  
*tensis longissimis*.

12. R. testaceus, abdomine nigro fasciato, alis hyalinis ni- *cinctus*.  
gro maculatis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Statura omnino praecedentium. Caput globosum, testaceum antennis filiformibus nigris corpore duplo breuioribus. Thorax testaceus, immaculatus. Abdomen testaceum segmentis basi nigris. Pedes testacei geniculis nigris. Alae hyalinae maculis plurimis paruis sparsis nigris.

13. R. cinereus, alis albis: macula marginali fusca. *diadema*.

Varietatem e Dania duplo maiorem accepi vix distinctam.

14. R. ater immaculatus, alis hyalinis: macula marginali *atratus*.  
nigra.

15. R. ater, abdominalis incisuris tibiis tarsisque albis. *colomba-*  
*schen sis*.  
*Bibio sanguinarius* Pall. Itin. 1. App. 23.  
*Oestrus* Griff. Itin.

Habitat in Seruia, Banatu in initio veris et sub fine aestatis copiosissime proueniens, obruit pecora et intrat partes nobilissimas venenatoque morsu intra 4-5 horas ea enecat. Arcetur fumo.

Culice pipiente duplo minor. Corpus nigrum. Abdomen incisuris albidis. Femora nigra tibiis tarsisque albidis.

181. SYRPHVS. *Haustellum* setis quatuor absque vagina.

*Palpi* duo basi setarum exteriorum inserti.

*Antennae* breues subclauatae, setariae.

\* *Antennis seta plumosa.*

*bomby-lans.* 1. S. antennis plumatis tomentosus niger, abdomine postice rufo.

*Conops pocopyges* Pod. Mus. Graec.

*mystacea.* 2. S. antennis plumiatis tomentosus niger, thorace abdominisque apice flavis.

*muffitans.* 3. S. antennis plumiatis tomentosus, thorace fulvo, abdomine virescente.

*lapponum* 4. S. antennis plumatis tomentosus niger, scutello ferrugineo, abdomine cingulis tribus albidis interruptis.

*apiarius* 5. S. antennis plumiatis tomentosus, thorace antice flavo, abdominis apice albo, alis apice ferrugineis.

*inanis.* 6. S. antennis plumiatis nudus, abdomine ferrugineo pelliculo.

*crassus.* 7. S. antennis plumiatis nudus niger femoribus posticis vnidentatis rufis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Magnitudo et statura S. obesi. Caput crassum, obscurum. Thorax niger, immaculatus, squama halterum alba apice nigra. Abdomen nigrum, nitidulum singulo segmento annulo impresso. Alae albae basi puncto que transverso in medio nigris. Femora et tibiae rufa apice nigra. Tarsi nigri. Femora postica subtus vnidentata.

8. S. antennis plumatis nudus, thorace flavo lineato, ab- *vacuus*, domine flavo pellucido : cingulis nigris.
9. S. antennis plumatis nudus, alis maculis duabus fuscis, *obesus*. corpore aeneo.

\*\* *Antennis seta nuda.*

10. S. antennis setariis nudus, thorace nigro albo macula- *pinguis*. to, abdominē testaceo : fascia alba.
11. S. antennis setariis tomentosus, thorace lineis qua- *pendulus*. tuor, abdomine fasciis tribus flavis.
12. S. antennis setariis tomentosus, thorace nigro fascia- *floreus*. to, abdomine flavo : segmentorum marginibus linea- que dorsali atris.
13. S. antennis setariis tomentosus, abdomine ferrugineo : *subcoleo- dorus*. dorso nigro, alis crassioribus. *ptratus*.

Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 6.

14. S. antennis setariis tomentosus, abdomine atro : *cini- nemorum*. gulis tribus albis; primo segmento lateribus luteo.
15. S. antennis setariis tomentosus niger, scutello abdo- *agrorum*. minisque lateribus ferrugineis.

Habitat in America Dom. Lund.

Statura et magnitudo S. arbustorum. Frons cinereo to- mentosa linea media antennisque nigris. Thorax tomentosus niger, scutello magno ferrugineo, immaculato. Abdomen ferrugineum linea longitudinali atra, quae tertium segmentum totum occupat. Marginis segmentorum in hac linea dorsali atra albidī. Alae hyalinæ. Pedes nigri geniculis nigris.

16. S. antennis setariis tomentosus, thorace lineato, abdo- *arvorum*. mine nigro : cingulis tribus flavis.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas S. nemorum at distinctus. Thorax flavescens lineis quatuor longitudinalibus nigris. Scutellum subaeneum margine flauescente. Abdomen nigrum cingulis tribus flavis. Pedes pal- lidi, postici obscurores. Alae albae.

- hortorum* 17. S. antennis setariis tomentosus, thorace subfasciato, abdomen fasciis tribus albis, pedibus posticis incrassatis ferruginais.
- arbusto-* 19. S. antennis setariis tomentosus, abdomine nigro: seg-  
*rum.* mento primo secundoque latere ferrugineis.
- pratorum* 19. S. antennis setariis tomentosus niger, thorace fasciis punctisque duobus, abdomine maculis vtrinque tri-  
bus flavis.
- Femora postica videntata.
- fruteto-* 20. S. antennis setariis tomentosus, thorace lineis duabus  
*rum.* flavis, abdomine ferrugineo: linea dorsali interru-  
ta nigra.
- ericeto-* 21. S. antennis setariis subtomentosus, thorace aeneo:  
*rum.* lateribus flavis, abdomine fulvo: striis tribus atris.
- tenax.* 22. S. antennis setariis tomentosus, thorace griseo, abdo-  
mine fusco, tibiis posticis compresso gibbis.
- trilinea-* 23. S. antennis setariis tomentosus, thorace pallido: li-  
*tus.* neis nigris, abdomine atro: fascia baseos interrupta  
ferruginea.
- quadrili-* 24. S. antennis setariis, thorace flavescente: lineis qua-  
*neatus.* tuor aeneis, abdomine ferrugineo apice nigro: stri-  
ga alba.
- Habitat Tranquebariae Dom. Lund.
- Magnus. Frons flava antennis ferrugineis seta nuda.  
Thorax flauescens lineis quatuor aeneis nitidis. Ab-  
dominis segmentum primum et secundum rufum mar-  
gine nigro, tertium nigrum striga albida. Alae albae,  
maculatae. Pedes ferruginei tibiis nigris.
- quinqueli-* 25. S. antennis setariis tomentosus, thorace quinquelii-  
*neatus.* neato, abdomine nigro: segmentis basi albis.
- intrica-* 26. S. antennis setariis tomentosus lutescens, abdomine  
*rius.* nigro apice genibusque albis.
- oestraceus* 27. S. antennis setariis nigra, scutello albido, abdominis  
apice lutescente.

28. S. antennis setariis, thorace tomentoso flavescente, *asiliforis*: abdomen atro: segmento primo secundoque albimis.  
cantibus.
29. S. antennis setariis tomentosus, thorace griseo, abd. *lucorum*: mine atro: segmento primo toto albo.
30. S. antennis setariis tomentosus fuscus; fronte flava, *fallax*: abdominis apice tomentoso, fulvo; squama halterum laetea.
31. S. antennis setariis tomentosus niger, abd. vlti- *sylvarum*: mo segmento tomentoso flavo.
32. S. antennis setariis elongatis nudus ater, alis cyaneis. *nigrita*.
33. S. antennis setariis tomentosus cinereus, thorace fa- *clavipes*: scia nigra, abdominis apice fulvo, feinotibus posticis areuatis.
34. S. antennis setariis elongatis niger, thorace lateribus *bicinctus*: punctis abdomineque cingulis duobus flavis.
35. S. antennis setariis elongatis niger; thorace maculis *arcuatus*: lateralibus, abdome cingulis quatuor areuatis flavis.
36. S. antennis setariis tomentosus abdome atro: seg- *cingula-*  
mento primo basi, reliquis punctis albis. *tus*.
37. S. antennis setariis tomentosus niger, fronte thoracis *Zonatus*: antico anoque cinereis, abdominis primo segmento albido.
- Habitat in China Dom. de Schestedt.
- Statura et magnitudo omnino praecedentis. Caput ci-  
nereum vertice nigra. Thorax antice cinereus po-  
stice niger: Abdominis primum segmentum maius  
albido subpellucidum apice nigrum. Anus cinered  
tomentosus. Alaæ albae basi maculaque media fusca;  
Pedes nigri postici compressi.
38. S. antennis setariis tomentosus; thorace cinereo fascia errans:  
scutelloque nigris; abdome nigro: lateribus basi  
flavis.
- Habitat in China Dom. de Schestedt:

Statura et magnitudo praecedentis. Caput tomentosum album vertice parum nigricante. Thorax tomentosus, cinereus fascia media lata nigra. Scutellum nigrum. Abdomen magis glabrum, nigrum segmento primo secundoque lateribus flavis. Alae, aibae basi obscuriores. Pedes nigri geniculis albis femoribusque posticis basi testaceis.

*mutatilis.* 39. S. antennis setariis elongatiis tomentosus, thorace immaculato, abdomine nigro griseoque mutabili.

*decius.* 40. S. antennis setariis tomentosus, thorace coerulecente, abdomine obscure violaceo.

*leucopus.* 41. S. antennis subclauatis niger, plantis albis.

*signis.* 42. S. antennis setariis nudus, thorace aeneo, abdomine ferrugineo apice nigro.

*femora-* 43. S. antennis setariis tomentosus, thorace subaeneo, fe-  
*tus.* moribus posticis clauatis.

*dentipes.* 44. S. antennis setariis nudus, thorace quadrilineato, ab-  
domine clauato, femoribus posticis incrassatis den-  
tatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo S. femorati. Caput magnum glo-  
bosum, nigrum labio villoso albo. Thorax niger  
lineis quatuor integris albis. Scutellum nigrum ma-  
gmine albido. Abdomen elongatum segmento primo  
plano attenuato nigro maculis duabus oblongis dor-  
salibus hyalinis secundo cylindrico nigro basi palli-  
do, tertio ouato, crassiori, purpurascenti atro, nitido.  
Pedes fusi femoribus posticis incrassatis apice  
dente valido acuto armatis.

*conopseus* 45. S. antennis setariis nudus niger, thorace lineis latera-  
libus, abdomine fasciis tribus flavis.

*ichneu-* 46. S. antennis setariis elongatis cylindricis niger, fron-  
*moneus.* te thoracis postico pedibusque ferrugineis.

*sphägeus.* 47. S. antennis setariis elongatis niger, pedibus rufis.

48. S. antennis setariis nudus ater, alis nigris: in margine cylindricus.  
tenuiori albo maculato.
49. S. antennis setariis nudus, thorace aeneo, abdomine elongatus  
clauato nigro: fasciis duabus flavis.
50. S. antennis setariis nudus, thorace maculato, abdomine podagricus.  
ne cingulis sex flavis.
51. S. antennis setariis tomentosus, thorace variegato, abdome crabronius.  
domine flavo: Tegumento primo secundoque apice formis.  
fuscis.
52. S. antennis setariis nudus, thorace maculato, abdomine diophtalmus.  
ne cingulis sex flavis, femoribus posticis dentatis.
53. S. antennis setariis nudus, thorace maculato, abdomine vespiformis.  
ne cingulis sex flavis.
54. S. antennis setariis nudus, thorace lineis lateralibus, festivus.  
abdomine cingulis quatuor flavis interruptis.
55. S. antennis setariis tomentosus, thorace lineato, abdome ruficornis.  
mine aeneo, alis maculatis.
56. S. antennis setariis tomentosus obscure aeneus, anten- flavicornis.  
nis tibiisque flavescentibus.
57. S. antennis setariis tomentosus niger, abdomine atro sepulchralis.  
nitidulo.
58. S. antennis setariis niger immaculatus, alis albis: macula fusca.  
lugabris.
59. S. antennis setariis nigro aeneus, abdomine depresso coemitoriorum.  
atro nitido, alis nigricantibus.

*Musca coemitoriorum* antennis setariis nigra, abdomine supra glabro subuiolaceo. Sp. Inf. 2. 443. 39.

Habitat in Europa.

Statura omnino F. metallini at paullo maior. Caput nigro aeneum, nitidum antennarum clava flava. Thorax nigro aeneus. Abdomen depresso, planum, atrum obscure nitidum. Alae nigricantes. Pedes nigri.

*metallinus.* 60. S. antennis setariis nigro aeneus nitens, antennis nigris.

*glaucus.* 61. S. antennis setariis subtomentosus niger, abdomine basi pellucido, cingulisque duobus altidis interrupatis.

*noctilucus* 62. S. antennis setariis subtomentosus ater; abdominis primo seguento maculis duabus pellucidis.

*gibbosus.* 63. S. anterinis setariis tomentosus fuscus; abdomine subgloboso atro: cingulis quatuor albis, squamis halterum buccatis.

*Nemotelus* Schaeff. Icon. tab. 200. fig. 1.

*globosus.* 64. S. antennis setariis subtomentosus, thorace antice ferrugineo; abdomine subgloboso pallido apice nigro.

*orbiculus.* 65. S. antennis setariis nudus ater abdomine apice albo.

Habitat Killiae:

Parvus. Caput paruum; globosum, atrum. Thorax nudus, ater, nitidus. Squamae halterum magnae buccatae, albae. Abdomen globosum, atrum apice pallidum. Alae albae; immaculatae. Pedes pallidi.

*Ribesii.* 66. S. anterinis setariis nudiusculus; thorace immaculato, abdomine cingulis quatuor flaviis: primo interrupto.

*Pyrastris.* 67. S. antennis setariis nudiusculus niger; thorace immaculato: abdomine bis. tribus lunulis albis recurvatis.

*Menthae* *stiri.* 68. S. antennis setariis nudus niger, thorace inaculato, abdome cingulis quatuor scutelloque flaviis.

*Thymae* *stiri.* 69. S. antennis setariis tomentosus, thorace subaeneo; abdomine atro: fasciis tribus albidis; securida interrupta.

*Salviae.* 70. S. anterinis setariis nudus flavius; thoracis dorso segmentorumque marginibus abdominis nigris.

Habitat in Sierra Leon. Africæ Dr. Pflug.

Statura omnino S. mellini at patillo maior. Os flavium antennis fulvis fronteque inter oculos nigra. Thorax flavius dorso nigro; qui color ad marginem antennam extenditur. Scutellum flavium. Abdomen planum,

num, flauum, nitidum segmentorum in marginibus omnibus atris. Pedes flavi.

71. S. antennis setariis nudus, thorace aeneo nigro, abdomine atro; maculis duabus flavis. *Rosarum.*

Habitat Hafniae Dom. Lund. in floribus.

Statura S. mellini at omnino alius et distinctus. Caput atrum, nitidum. Thorax aeneo ater, nitidus, immaculatus. Abdomen planum, atrum macularum flauarum parvum. Interdum posticae maculae adhuc duas aliae, minores. Pedes nigri tibiis quatuor anticus flavis. Alae albae macula magna obsoleta fusca ad marginem.

72. S. antennis setariis nudus, thorace subaeneo immaculato, abdomine maculis octo lutescentibus. *mellinus.*

Huius plures sunt aut species, aut varietates.

73. S. antennis setariis nudus, thorace lincis abdomine scriptus, que linearī fasciis flavis. *scriptus.*

74. S. antennis setariis tomentosus, abdomine flavo; segmentorum marginibus nigris; fascia flava. *necctareus.*

Habitat in Daniae floribus Dom. Lund.

Statura omnino S. scripti at paullo maior. Caput cinnereum antennis flavescentibus. Thorax subtomentosus, aeneus lineis quatuor albidis. Scutellum flavesens. Alae albae. Abdominis segmenta basi flava apice nigra fascia flava. Primum segmentum et linea media nigra. Pedes flavi.

75. S. antennis setariis tomentosus, thorace aeneo, abdome elongato atro; punctis quatuor albis. *albimanus.*

76. S. antennis setariis nudus ater, alis basi nigris. *dimidiatus.*

77. S. antennis setariis nudus, abdome vtrinque albo maculato, femoribus posticis clavatis dentatis. *pipiens.*

182. MVSCA. *Haustellum* seta vnica absque vagina.

*Palpi* duo porrecti extorsum crassiores.

*Antennae* breues clavatae seta instructae.

\* *Antennis seta plumata,*

*inquis.* 1. M. antennis plumatis fusca, abdomine pellucido; cingulis tribus nigris.

*Conops trifasciatus* Pod. Mus. Graec.

*ieonna.* 2. M. antennis plumatis cinereis, abdomine pellucido; cingulis tribus nigris, pedibus pallidis.

Habitat Tranquebariae Doin. Lund.

Statuta fere praecedentis. Caput et thorax cinerea, immaculata. Antennae valde plumatae, subferrugineae. Abdomen albo pellucidum cingulis tribus nigris. Pedes pallidi.

*pellucens.* 3. M. antennis plumatis nigra, abdominis segmento primo pellucidó albo.

*meridia-ua.* 4. M. antennis plumatis pilosa nigra, fronte aurea, alis basi ferrugineis.

*carnaria.* 5. M. antennis plumatis pilosa nigra, thorace lineis pallidioribus, abdomine nitido tessellato.

*tardaria.* 6. M. antennis plumatis nigra, thorace abdomeque tessellatis.

*rutilans.* 7. M. antennis plumatis, thorace lineato, abdomeque tessellato, ano rufo.

*maculata* 8. M. antennis plumatis cinerea, thorace abdomeque que maculis numerosis atris.

*Musca maculata* antennis plumatis pilosa nigra, thorace nigro lineato, abdome atro maculato, ano bipunctato. Linn. Syst. Nat. 2. 990. 70, hoc pertinere videtur.

*Musca*

*Musca maculata* Scop. Carn. 870.

Habitat in Europae floribus.

Muscae domesticæ paullo maior. Caput cinereum pro-  
boscide antennisque atris. Thorax cinereus macu-  
lis longitudinalibus posticaque semiscutellari atris.  
Abdomen ovatum, cinereum, nitidulum maculis  
plurimis punctisque duobus ultimi segmenti atris.  
Subtus in medio lineaæ duæ nigrae. Alae albidae,  
innocuatae. Pedes nigri.]

9. M. antennis plumatis thorace lineato, abdomine testa-  
follato subtus basi pallido. *domestica*
10. M. antennis plumatis atra, thoracis lateribus Eries nigro punctatis. *america-*  
*na.*
11. M. antennis plumatis pilosa, thorace cinereo aeneo, retusa.  
abdomine subaureo, ano retuso.
12. M. antennis plumatis pilosa viridi nitens pedibus Caesar.  
nigris.
13. M. antennis plumatis, thorace cupreo nitido, abdo- cornicina.  
mine viridi aeneo, pedibus nigris.
14. M. antennis plumatis nitens, thorace coeruleo, ab- cadaueri-  
domine viridi.
15. M. antennis plumatis viridi rufens, abdomine glo- patrida.  
bos cyaneo.
16. M. antennis plumatis pilosa, thorace coerulecente, stygia.  
abdomine obscure aeneo, pedibus ferrugineis.
17. M. antennis plumatis, thorace nigro, abdomine vi- mortuo-  
ridi aenco, pedibus nigris.
18. M. antennis plumatis, thorace aeneo albo punctato, leonina.  
abdomine coeruleo, ano bipunctato.
19. M. antennis plumatis, thorace nigro, abdomine coe- vomitoria  
ruleo nitente, fronte fulua.
20. M. antennis plumatis thorace abdomineque cyaneis, cyanea.  
pedibus nigris.

- macella-* 21. M. antennis plumatis, thorace cupreō nigro lineato, abdomen aeneo, pedibus nigris.
- vulpina.* 22. M. antennis plumatis, thorace lineato, abdomen subferrugineo nigro maculato.
- coruina.* 23. M. antennis pluminatis nigra, abdomen testaceo: linea dorsali nigra.
- testacea.* 24. M. antennis plumatis cinerea, scutello abdome pe-  
dibusque testaceis.
- pallida.* 25. M. antennis plumatis pallide testacea, ano plantisque  
nigris.  
Habitat Hafniae Dom. Lund.
- Statura et magnitudo M. testacea pilis nigris hirta.  
Thorax et abdomen pallide testacea. Ultimum ab-  
dominis segmentum fuscum. Pedes pallidi apice nigri.
- mactans.* 26. M. antennis plumatis testacea, alis punctis duobus ni-  
gris: posteriore transuersa.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Statura omnino praecedentium. Corpus pilosum ta-  
tum testaceum, mox obscurius, mox pallidius.  
Alae obscurae punctis duobus nigris posteriore trans-  
uersa.
- augur.* 27. M. antennis plumatis cinerea, abdome coerule-  
scente: lateribus testaceo diaphanis.
- canina.* 28. M. antennis plumatis setaria cinerea, thorace pu-  
ctis, abdome strigis nigris.
- pleja.* 29. M. antennis plumatis nigra, pedibus rufis.
- rufifica.* 30. M. antennis plumatis grisea, femoribus rufis.
- elata.* 31. M. antennis plumatis setaria pallide testacea, alis pun-  
ctis duobus costaque fuscis.
- lupulina.* 32. M. antennis plumatis setaria nigricans, abdome pe-  
dibusque posticis testaceis.  
Habitat in Scandia Dom. de Schestedt.

Parua. Antennae testaceae seta nigra plumata. Thorax niger cinereo nitidulus. Abdomen testaceum, immaculatum. Pedes anteriores nigri, postici testacei. Alae pallide testaceae.

33. M. antennis plumatis fusco ferruginea, abdomine nigro: funebris, segmentorum marginibus pallidis.

Habitat Hafniae Dom. Lund.

Minuta. Caput obscurum orbita oculorum parum argento nitente. Thorax obscure rufus, immaculatus. Abdomen nigrum, nitidum segmentorum marginibus albidis. Alae magnae, hyalinae, immaculatae. Pedes testacei.

\*\* *Antennis seta nigra. Nuda.*

34. M. antennis setariis nigra, abdominis lateribus testacea, diaphanis,

35. M. antennis setariis pilosa, thorace fusco, abdomen lurida, atro: lateribus basi testaceis.

36. M. antennis setariis rufa, abdomine fasciis duabus bifasciata, aureis.

37. M. antennis setariis pilosa nigra, alis basi ferrugineis. grossa.

38. M. antennis setariis pilosissima atra, ore albicante. hystrix,

39. M. antennis setariis pilosa atra nitens, alarum basi tremula, squama hæteribusque ferrugineis.

40. M. antennis setariis, thorace sublineato, abdomine rotunda, subrotundo ferrugineo: linea longitudinali punctata, nigrorum.

41. M. antennis setariis nigricans, scutelli apice subtesta, ceo, abdomine tessellato. laruarum

42. M. antennis setariis nigra, abdomine cinereo nigro radicum, fasciato.

43. M. antennis setariis nigra, abdomine cylindrico: segmento secundo tertioque rufis. brassica-

Variat rarius ab domine ferrugineo linea dorsali baseos nigra.

*compressa* 44. M. antennis setariis pilosa nigra, thorace lineato, ab domine cylindrico ruso: linea dorsali nigra, femoribus rufis.

Habitat in Hispaniae domibus Dom. Vahl.

Affinis certe M. brassicariae, attamen distincta videtur. Antennae nigrae. Frons utrinque linea argentea, nitida. Thorax niger lineis tribus argenteis nitidulis. Alae albidae basi parum flavescentes. Abdomen compresso cylindricum, rufum segmentorum marginibus argento nitidulis linea dorsali nigra. Pedes nigri femoribus rufis.

*lateralis*. 45. M. antennis setariis nigra, abdominis lateribus basi sanguineis.

*canicula*. 46. M. antennis setariis nigricans abdominis segmento secundo tertioque latere diaphanis.

*pluialis*. 47. M. antennis setariis cinerea, thorace maculis quinque nigris, ab domine maculis obsoletis.

*subfultans* 48. M. antennis setariis tota atra, alis hyalinis, femoribus posticis saltatoriis.

*tigrina*. 49. M. antennis setariis pilosa cinerea, femoribus apice tibiisque ferrugineis.

*chorea*. 50. M. antennis setariis atra, alis albis.

*labiata*. 51. M. antennis setariis pilosa nigricans, labio argenteo nitidissimo, alis albis immaculatis.

Habitat in arboretis Hafniensibus saltatrix Dr. Pflug.

Magnitudo et statura M. roralis. Corpus totum pilosum, nigricans, subtegellatum. Labium villosum, argenteum, nitidissimum. Alae albae immaculatae squama halterum fornicata niuea. Pedes nigri.

*roralis*. 52. M. antennis setariis aterrima, alis apice subalbican-tibus.

*fenestralis* 53. M. antennis setariis glabra atra, ab domine supra rugoso: strigis albis, alis fuscis.

54. M. antennis setariis pilosa obscura, abdomine cincto: punctis quatuor fuscis. meditabunda.
55. M. antennis setariis cinerea alarum costa pilis brevibus serrata. simis serrata, abdomine pedibusque ferrugineis.  
Simillimam at duplo minorem e Succia misit Dom. de Paykull.
56. M. antennis setariis pilosa atra, abdomine maculis quadrangularibus apicis cinereis. maculata.  
Habitat Kiliae.  
Parvo maior M. cellaris. Caput atrum ore albo, nitidulo. Thorax pilosus, ater, nitidus, immaculatus scutello eleuato. Squamae halterum magnae, albae. Abdomen oblongum, atrum vltimis duobus segmentis vtrinque macula cinerea. Pedes atri. Alae albidae; immaculatae.
57. M. antennis setariis nigra, abdomine pallidiore, oculis ferrugineis, cellaris.
58. M. antennis setariis atra, abdomine cinerascente, alis meteorica basi subfuscis.
59. M. antennis setariis nigra, halteribus plantis posticis Frit. abdomineque virescenti pallidis.
60. M. antennis setariis atra nitens, antennis pedibusque Leprae, albis, oculis rufo inauratis. Linn. Syst. Nat. 2. 994. 91.  
Habitat in Elephantiasi Nigritarum Americae.  
Corpus Pediculo minus.
61. M. antennis setariis atra, alis albis: costa nigra. putris.
62. M. antennis setariis glauco aenea, thorace viridi, abdomen oblongo cupreo, halteribus nudis. cupraria. Sehaeff. Icon. tab. 209. fig. 32.?
63. M. antennis setariis nitida, thorace aeneo, abdomen aurata, obtuso aureo.  
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.  
Affinis M. cuprariae at latior magisque obtusa. Caput nigrum. Thorax viridi aeneus, nitidus. Abdomen obtusum, planum, aureum. Alae obscurae.

- polita.* 64. M. antennis setariis nitida, thorace coeruleo, abdome aeneo, halteribus nudis.
- viduata.* 65. M. antennis setariis nigro aenea, abdomine aeneo, squamis halterum ciliatis.
- pubera.* 66. M. antennis setariis nigra, abdominalis ultimo segmento incuruato: pube vtrinque reflexa.
- fasciata.* 67. M. antennis setariis testacea, abdomine nigro, alis apice fuscis: fascia alba, pedibus elongatis.
- petro-*  
*nella.* 68. M. antennis setariis liuida, fronte rubra, pedibus elongatis testaceis; geniculis nigris.
- elongata.* 69. M. antennis setariis testacea, pedibus elongatis; tibiis posticis nigris; plantis albis.

Habitat in Sierra Leon Africae Dr. Pflug.

Statura M. petronellae at paullo maior. Corpus totum testaceum oculis solis magnis fuscis. Alae hyalinae. Pedes testacei tibiis posticis nigris, plantis alis, vnguis fuscis.

- longipes.* 70. M. antennis setariis atra, alis fuscis basi fascia punctisque albis, pedibus elongatis testaceis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentis. Caput magnum, globosum, atrum antennis setariis. Thorax niger, immaculatus. Abdomen elongatum, cylindricum, atrum, nitidum, apice incuruum, humatum. Alae incumbentes fuscae basi fascia media punctisque tribus posticis albis. Pedes elongati, anticis nigris. Postici quatuor testacei ante apicem albi.

- annulata.* 71. M. antennis setariis nigra, alis hyalinis; fascia fusca, pedibus elongatis nigris; femoribus posticis annulis duabus albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statuta omnino praecedentis. Caput nigrum orbita oculorum parum testacea. Thorax niger, coeruleo nitens, immaculatus. Abdomen petiolatum videtur nobis deest. Alae albae fascia pone medium lituraque apicis

apicis fuscis. Pedes elongati nigri, antici ante apicem albi, postici femoribus annulis duobus albis.

72. M. antennis setariis atra, tibiis pallidis, vertice pro-*cristata*: minulo.
73. M. antennis setariis nigra, pedibus elongatis luteis, *corrigeolata*: femoribus annulo nigro.
74. M. antennis setariis atra, pedibus elongatis pallidis, *curlitans*: alis incumbentibus albis.
75. M. antennis setariis atra, alis incumbentibus albis: *cimicoides*: fasciis duabus nigris.
76. M. antennis setariis aeneo viridis, cauda vncinata, *ungulata*: pedibus elongatis liuidis.
77. M. antennis setariis aeneo viridis, cauda vncinata, *nobilitata*: alis macula nigra apice alba.
- Schaeff. Icon. tab. 206. fig. 5.
78. M. antennis setariis aeneo viridis; abdome nigro *equestris*: fasciato, cauda vncinata, alis maculatis.
79. M. antennis setariis pilosa, thorace fusco lineato, ab-*notata*: domine aeneo, alis fusco nebulosis: puncto atro.
80. M. antennis setariis pilosa nigra, alis fuscis: fasciis *arrogans* tribus albis.
81. M. antennis setariis elongatis pilosa aeneo nitens, ab-*longicornis*: domine obscuriore.
82. M. antennis setariis aenea, abdome nigro fasciato, *rostrata*: ore corneo prominulo atro.
83. M. antennis setariis pallida, abdome fasciis quatuor *4fasciata* atris, alis albis.
84. M. antennis setariis, thorace aeneo, abdome cine-*diaphana* reo: primo secundoque segmento lateribus diaphanis.
85. M. antennis setariis pilosa grisea, abdome cinereo: *latro*: segmentorum marginibus nigricantibus,

Habitat in Europa haud infrequens.

Magnitudo M. scybalariae. Caput pallidum antennis testaceis seta nuda. Thorax valde pilosus obscurè griseus punctis aliquot indistinctis fuscis. Abdomen pilosum, cinereum, nitidulum segmentorum marginibus atris, subtus magis obscurum. Pedes testacei apice nigri. Alae obscurae.

*tacularia* 86. M. antennis setariis thorace griseo, abdome ferrugineo, alis punctis tribus.

*scybalaria* 87. M. antennis setariis rufo ferruginea, alis puncto obscuriore.

*ferrucaria* 88. M. antennis setariis grisea hirta, alis puncto obscurio.

*marginalis* 89. M. antennis setariis obscure plumbea, alis reticulatis: costa atrâ.

*simetaria* 90. M. antennis subplumatis liuens glabra, alis puncto obscuriore.

*rufifrons*. 91. M. antennis setariis cinerea, capite ferrugineo: punctis duobus nigris, alarum costa nigra.

*reticulata* 92. M. antennis setariis pilosa cinerea, alis obsolete reticulatis; costa albo nigroque punctata.

*pennipes*. 93. M. antennis setariis pilosa, abdome rufo, alis nigris: macula ferruginea margineque postico albo.

*lugens*. 94. M.-antennis setariis, thorace flavo lineato, abdome cyaneo, alis nigris: fasciis duabus albis extus bifidis.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Statura M. parietinae at triplo maior. Caput ferrugineum lineis duabus verticalibus nigris. Thorax niger lineis duabus dorsalibus flaviis. Abdomen rotundatum, cyaneum macula baseos flava. Alae magnæ nigrae macula magna baseos alba. Pone hunc fasciae duas ad marginem exteriorem bifidae et praeterea puncta duo marginis interioris, altero inter fascias altero versus apicem. Corpus subtus et pedes flava.

95. M. antennis setariis pilosa testacea, abdomine fuscō: *clauata*.  
segmentis basi pallidis stylo ani clauato.

Habitat Kiliae.

Parua. Caput testaceum ore pallidiore. Thorax pi-  
losus testaceus. Abdomen fuscum segmentis basi pal-  
lidis. Ani stylus exsertus, apice capitatus, testaceus.  
Pedes testacei. Alae magnae, exalbidae, immacu-  
latae.

96. M. antennis setariis ciperea, alis fuscis albo puncta- *parietina*.  
tis maculatisque, fronte testacea.

97. M. antennis setariis nigra, alis punctis lineolisque *discoidea*.  
marginalibus albis, capite pedibusque testaceis.

Habitat in Hafniae floribus Dom. de Sehestedt.

Magna in hac familia. Caput testaceum oculis nigris.  
Thorax et abdomen nigra, immaculata. Alae atrae  
punctis baseos lineolisque marginalibus abbreviatis  
albis. Pedes testacei.

98. M. antennis setariis cinerea, abdomini nigro fascia- *umbra-*  
to, alis fuscis albō maculatis. *rum*.

99. M. antennis setariis, alis hyalinis apice nigris, capite *vibrans*:  
rubro.

100. M. antennis setariis, alis apice punto lateralī nigro, *cynipsea*:  
abdomine cylindrico.

101. M. antennis setariis atra, alis nigris apice albis. *grossifica-*  
*tionis*.

102. M. antennis setariis flavescentes, abdomine atro, alis *combi-*  
*nata*.

103. M. antennis setariis fuscō cinerea, capite rufo: pun- *erythro-*  
cto verticali atro. *cephala*.

Habitat in Sueciae floribus Dom. de Paykull.

Parua. Caput rufum punto magno in medio verticis  
atro. Thorax obscure cinereus, immaculatus. Ab-  
domen fuscō griseum, nitidum. Alae albae punto  
lineolaque transuersa nigris. Pedes nigri.

- stylata.* 104. M. antennis setariis cinerea, abdomine atro, alis albis: punctis duobus arcuque apicis fuscis.
- arcuata.* 105. M. antennis setariis testacea; alis inaculis duabus arcuque apicis nigris.
- umbella-* 106. M. antennis setariis cinerea, alis pedibusque ferrugineis; alis maculatis.
- gramini-* 107. M. antennis setariis cinerea, alis fuscis: maculis albi obsoletis.
- dorsalis.* 108. M. antennis setariis; alis punctatis, thorace cinereo; abdomine rufo; linea dorsali nigra.
- femina-* 109. M. antennis setariis, alis atris cinereo punctatis, abdo-  
minatione basi subtus flauo.
- picta.* 110. M. antennis setariis fusca, alis atris: maculis vtrinque duabus oppositis, punctisque duobus interme-  
diis albis.
- flava.* 111. M. antennis setariis flava; antennis apice puncto nigro.
- 4 puncta-* 112. M. antennis setariis flava; abdomine punctis nigris  
*ta.* quatuor.
- aestuans.* 113. M. antennis setariis; alis vnguiculatis aibis: puncto centrali nigricante.
- lineata:* 114. M. antennis setariis subtus flava supra nigra, lineis thoracis scutelloque flavis.
- Serratu-* 115. M. antennis setariis; alis albis; thorace virescente,  
*lae.* abdomine cinereo: lineis quatuor punctorum nigrorum.
- germina-* 116. M. antennis setariis; alis albis: margine maculisque  
*tionis.* nigris.
- Vrticae.* 117. M. antennis setariis nigra; alis albis: puncto terminali fasciisque tribus distinctis fuscis:  
Corpus nigrum fronte ferruginea:

118. M.

118. M. antennis setariis, alis albis: fasciis quatuor distin- *Dauci.*  
ctis nigris, scutello pedibusque testaceis.

Habitat in Sueciae floribus Dom. de Paykull.

Magnitudo M. Vrticae at minor. Caput nobis deest.  
Thorax cinereus scutello pallide testaceo. Abdomen  
nigro stylo elongato. Alae albae fasciis quatuor,  
quarum prima obsoletior, quarta apicis. Pedes te-  
stacei.

119. M. antennis setariis, alis albis: fasciis fuscis inae- *Cerasi.*  
qualibus; posticis externis connexis.

120. M. antennis setariis nigra, alis albis: fascia flexuosa *Cardui.*  
fusca.

121. M. antennis setariis atra, alis albis: fasciis tribus ab- *Syngene-*  
breuiatis maculaque apicis nigris. *fiae.*

122. M. antennis setariis flava, alis albis: fasciis quatuor *Tussilagi-*  
fuscis.

123. M. antennis setariis, alis albis: fasciis quatuor con- *soltstitialis*  
nexis nigris, scutello flavo.

124. M. antennis setariis atra, capite pedibusque flauis, *Lychnidis*  
alis nigris: limbo albo striato.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Media. Caput flavum oculis nigris. Thorax et ab-  
doin glabra, atra, immaculata. Pedes flavi. Alae  
nigrae limbo omni lineolis abbreviatis albis.

125. M. antennis setariis ferruginea, scutello flavo, alis *Onopor-*  
*variegatis.* *dinis.*

126. M. antennis setariis, alis fuscis albo variis: margine *Hieracii.*  
crassiori maculis tribus nigris; pupilla alba.

127. M. antennis setariis flava, thoracis dorso, abdomi- *minuta.*  
neque strigis nigris.

Habitat in Kiliae floribus Dom. Daldorf.

Minuta. Corpus totum flauum. Thorax supra niger.  
Abdomen strigis duabus punctisque duobus ultimi  
segmenti nigris.

183. TABANVS. *Haustellum* vagina vniualui  
setisque quinque.

*Palpi* duo clauato acumi-  
nati.

*Antennae* emarginato acu-  
minatue.

*rostratus.* 1. T. oculis fuscescentibus, haustello longitudine cor-  
poris.

*haustel- latus.* 2. T. oculis fuscescentibus, abdomine atro: margine ful-  
uo pubescente, haustello corpore dimidio breuiore.

*Tabanus mauritanus* oculis nigricantibus, abdominis  
segmento secundo macula nigra, rostro corpore  
aequante. Linn. Syst. Nat. 2. 999. 3.?

*bonitus.* 3. T. oculis virescentibus, abdominis dorso maculis albis  
trigonis longitudinalibus.

*lineatus.* 4. T. oculis virescentibus, thorace lineato, abdomine  
obscure coerulecente, antennis rufis.

*autumnalis.* 5. T. alis hyalinis, abdomine fusco ordine triplici albido  
maculoso.

*fasciatus.* 6. T. oculis viridibus, corpore brunneo, alis fascia  
fusca.

*catens.* 7. T. oculis viridibus, abdominis dorso linea alba, anten-  
nis rubris.

*tarandi- nus.* 8. T. oculis viridibus, abdominis segmentis margine lu-  
teis, pedibus rufis.

*feruens.* 9. T. oculis viridibus, abdomine antennisque luteis, ca-  
pite thoraceque fuscis.

*exae- stuans.* 10. T. oculis viridibus, abdominis segmentis margine al-  
bis, tibiis candidis.

11. T. oculis fasciatis, alis albis: costa fusca, antennis *ruficornis rufis.*

*Tabanus americanus* Forst. nou. sp. Ceng. I. 100.

12. T. oculis fasciatis niger, abdominis primo segmento *pellucens coerulecente*, tibiis candidis.

*atratus.*

13. T. abdomine coerulecente, alis atris.

14. T. oculis fascia purpurea, corpore cinereo. *Bromius.*

15. T. oculis antice fuscis postice viridibus, abdomine *Cajen-*  
- atro: segmento secundo tertioque fuluis, reliquis *nensis.*  
margine albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parvus. Antennae fuluae. Os cinereum proboscide nigra. Oculi virescentes margine antico late fusco.

Thorax obscurus, fuluo pubescens. Abdomen atrum segmentis 2. 3. fuluis immaculatis, reliquis mārgine albis. Alae albidae immaculatae. Pedes nigri femoribus quatuor posticis rufis.

16. T. oculis fuscis cinereus, abdome obscuro basi pal- *italitus.*  
lido pellucido.

17. T. oculis — — — — corpore liido, antennis *mexica-*  
- viridibus, alis virescentibus: punctis anastomosan- *nus.*  
tibus.

18. T. oculis glaucis cinereus, fronte punctis duobus *ruficu-*  
- atris.

19. T. oculis antice viridibus: fasciis tribus fuluis, ab- *paganus.*  
- domine vtrinque ferrugineo maculato.

20. T. oculis testaceis tomentoso cinereus, alis albis ni- *punctatus*  
- gro punctatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo T. rufici. Corpus totum cine-  
- reo tomentosum. Femora viridia. Tibiae albae.  
Alae albae punctis plurimis anostomosantibus fuscis  
costaque subferruginea.

- inanis.* 21. T. oculis: fuscis tomentoso cinereus, abdomine pellucido apice fusco.  
*Habitat* Cajennae Dom. v. Rohr.  
*Praecedenti* nimis affinis. Corpus totum cinereo villosum abdomine inani pellucido apice fusco. Alae albidae immaculatae costa subferruginea. Femora apice virescentia.
- occiden-* 22. T. oculis fasciis binis fuscis, corpore fusco, abdomi-  
*talis.* ne lineis tribus fuluis.
- tropicus.* 23. T. oculis fasciis tribus purpurascensibus, abdominis lateribus ferrugineis.
- borealis.* 24. T. oculis fuscis tribus purpurascensibus, abdomine atro, segmentorum marginibus albidis.
- antarcti-* 25. T. oculis fasciis quaternis fuscis, tibiis albis.  
*cus.*
- pluuiialis.* 26. T. alis fasciis quaternis vndatis, alis fusco punctatis.
- longicor-* 27. T. oculis maculatis, alis dimidiato fuscis: macula  
*nis.* nis. alba, antennis longioribus.
- striatus.* 28. T. oculis — — — — cinereus, abdomine fusco:  
*Habitat* in China Dom. de Sebestedt.  
*Medius.* Os albidum antennis rufescentibus. Thorax cinereus, sublineatus. Abdomen fuseum lineis tribus albis lateribus a basi ad medium ductis, media a medio versus apicem. Pedes obscure cinerei tibiis potticis pallidis.
- bidenta-* 29. T. oculis — — — — ferrugineis, abdomine vtrinque maculis duabus flavis, scutello bidentato.
- bispinosus* 30. T. oculis — — — — fuscus, abdomine ferrugineo basi nigro, scutello bispinoso.
- coecutiens* 31. T. oculis viridibus nigro punctatis, alis maculatis.
- moerens.* 32. T. oculis nigris albido nigroque varius, alis albis: costa fasciaque nigris.

*Habi-*

Habitat Cajennae Dom. v. Röhr.

Statura et magnitudo omnino T. coecutientis. Antennae nigrae basi albidae. Caput albidum lineolis duabus sub antennis punctisque duobus verticalibus glabris atris. Thorax albus, nigro lineatus. Abdomen griseum primo segmento flavescente arcu nigro, 2. 3. maculis duabus baseos nigris, reliquis immaculatis. Alae albae costa fasciaque lata in medio nigra et in hac punctum album. Pedes nigri tibiis testaceis.

33. T. oculis corporeque nigris, alis fuscis: macula alba. lugubris.

184. RHINGIA. *Haustellum* vagina vniuersitatis obtegente setisque quatuor.

*Palpi* filiformes.

*Antennae* breues, setariae.

1. R. thorace sublineato, rostro abdomine pedibusque rotundata. testaceis.

2. R. thorace lineato, abdomine nigro: maculis laterali lineata. libus flavis.

Habitat Hafniae Dom. Lund.

Statura omnino Syrphi at labium elongatum, corneum proboscideum inuolens, flavum, apice emarginatum, nigrum. Antennae breues clavatae, nigrae clava ferruginea seta nigra. Abdomen nigrum. Thorax niger lineis quatuor albis scutelloque testaceo. Abdomen nigrum utrinque maculis tribus ultimoque segmento flavis. Alae albidae. Pedes flavi femoribus cingulo albo.

185. ASILVS. *Haustellum rectum biuale basi gibbum.*

*Antennae filiformes.*

*grossus.* 1. A. hirsutus niger, thorace abdominisquæ basi cinereis.

*maurus.* 2. A. subferrugineus, pectoris lateribus thoracisque dorso lineis tribus nigris.

*Alginis.* 3. A. corpore toto ferrugineo.

*barbarus.* 4. A. fronte thorace pedibusque ferrugineis, alis flavis: apice margineque tenuiori nigris.

*Femora nigra.*

*erabroni-* 5. A. abdomine tomentoso antice segmentis tribus nigris, *formes.* postice flavo inflexo.

*ephip-* 6. A. hirsutus ater, thorace basi albo. *pium.*

*gibbosus.* 7. A. hirsutus niger, abdomine postice albo.

*barbatus.* 8. A. hirsutus niger, barba abdomine postice tibiisque posticis albis.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo A. gibbosæ. Caput atrum pilis densis longioribus circa os albis. Thorax ater, immaculatus. Scutellum hirtissimum, atrum. Abdomen breue, hirtum primis duobus segmentis atris, reliquis albis. Pedes pilosi atri tibiis posticis albis.

*fasciatus.* 9. A. hirtus niger, abdomine basi fasciis duabus niucis.

*aestuans.* 10. A. cinereus, ultimis abdominis tribus segmentis albis.

*ater.* 11. A. hirsutus ater, barba albida.

*diadema.* 12. A. ater, alis nigris, fronte alba.

*calidus.* 13. A. hirtus gilivus, thorace fuscō, abdomine nigro segmentorum marginibus albis.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput hirsutie densa gilua. Antennae nigrae. Thorax supra fuscus, inimaculatus, subtus hirsutie gilua. Abdomen breve atrum segmentorum marginibus albis. Alae albidae. Femora obseura sive fusca. Tibiae hirtae testaceae. Tarsi nigri.

14. A. hirsutus niger, thorace postice cinereo, abdomi- flauus.  
ne supra hirsuto fuluo.

15. A. hirsutus ater, abdomine violaceo. *violaceus.*

16. A. niger, abdomine supra fuluo. *gilius.*

17. A. hirtus, thorace cinereo pubescente, abdomine punctatus atro: punctis tribus marginalibus albis inaculisque duabus dorsalibus rufis.

18. A. halteribus abdominalis incisuris flauis, femoribus marginatis nigris. *margatus.*

19. A. corpore cinereo immaculato. *plumbeus.*

20. A. thorace cinereo nigro lineato, abdomine pedibus. *brunneus.*  
que brunneis nigro maculatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo A. forcipati. Caput albidum rostro atro antennisque brunneis. Thorax pilosus, cinereus lineis tribus nigris lateralibus abbreviatis. Abdomen cylindricum, obtusum, brunneum segmentis macula baseos obscurior. Alae albae. Pedes brunnei apice nigri.

21. A. hirtus cinereus ano pedibusque nigris. *forcipatus.*

22. A. hirtus niger, tibiis rufis, alis fuscis basi albidis. *germanicus.*

23. A. fuscus, abdomine cinereo: fascia apiceque nigris, rufipes.  
tibiis rufis.

24. A. cinereus, abdominalis segmentis macula quadrata macula-  
atra, pedibus piceis: plantis nigris. *tus.*

- margi-* 25. A. cinereo fuscus, pedibus rufis apice nigris, alis mar-  
*nellus.* ging atro.
- annula-* 26. A. cinereus, abdomine apice nigro, femoribus testa-  
*tus.* ceis; annulo nigro.
- stylatus.* 27. A. hirtus cinereus, thorace abdomeque nigro ma-  
culatis, tibiis rufis, ano stylato.
- nigripes.* 28. A. hirtus niger, thorace lineis quatuor, abdome cingulis tribus albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino A. stylati at paullo minor et alius. Ca-  
put pilosum, albidum rostro antenisque setariis  
nigris. Thorax hirtus niger lineis quatuor albis.  
Abdomen apice acutissimum, atrum cingulis tribus  
baseos albis. Alae hyalinae. Pedes atri.

- cingula-* 29. A. cinereus, tibiis rufis nigro annulatis.  
*tus.*
- tipuloides* 30. A. cinereus nudus, pedibus ferrugineis: plantis nigris,
- teutonus.* 31. A. niger, thorace fugaci auro maculato, abdome  
vtrinque maculis quinque albis.

Pedes rufi apicibus nigris.

- cajennen-* 32. A. ater thoracis linea dorsali alba nigro bilineata, cä-  
fis. pite scutelloque albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo A. teutoni. Caput hirtum, al-  
bum rostro, antennis verticeque albis. Thorax  
niger, cinereo nitens linea lata dorsali alba et in hac  
lineae duae nigrae, sub alis albo maculatus. Scu-  
tellum album, immaculatum. Abdomen cylindri-  
cum, atrum, segmento primo secundoque margine  
albo. Alae obscurae. Pedes atri, immaculati. Hal-  
teres clava alba.

- lineatus.* 33. A. testaceus, thorace abdomeque nigro lineatis, alis  
fuscis: macula media testacea.

34. A. cinereus, abdomine atro: segmentorum margini- *cinctus.*  
bus albis.
35. A. fuscus, alis abdomineque cyaneis. *cyaneus.*
36. A. ater nudus, pedibus halteribusque ferrugineis. *oclandi-  
cus.*
37. A. thorace nigro flavo maculato, abdomine atro:  
fasciis rufis. *conopsei-  
des.*
38. A. ater, thoracis dorso cinereo atro lineato, abdo- *linearis.*  
mine linearis: segmentorum marginibus flavis.

Habitat in Daniae Insulis Dr. Pflug.

Parvus. Caput atrum labio tomento argenteo nitidu-  
lo tecto. Thorax ater, nitidus dorso cinereo lineis  
quatuor atris, lateralibus abbreviatis. Abdomen  
elongatum lineare, atrum, nitidum segmentorum  
marginibus flavis. Alae hyalinae, immaculatae hal-  
teribus flavis. Pedes flavi.

39. A. ater glaber, femoribus posticis longitudine abdo- *calicifor-  
minis.*

186. CONOPS. *Haustellum* vagina vniualui  
abbreviata setaque vnica.

*Proboscis* porrecta, ultra ba-  
sin geniculata.

*Antennae* clavato acuminatae.

1. C. nigricans, occipite vesiculari, abdomine flavescenti-  
te basi nigro. *vesicula-  
ris.*
2. C. atra, abdominalis incisuris thoracisque punctis duo- *aculeata.*  
bus anticis flavis.
- Schaeff. Icon. tab. 228. fig. 8.
3. C. atra, abdomine basi ferrugineo segmentorumque *rufipes.*  
marginibus albis, pedibus ferrugineis.

362 CLAS. VIII. ANTLIATA. Stomoxys.

*macrocephala.* 4. C. nigra, abdomine segmentis quatuor margine flavis, antennis pedibusque rufis.

*flavipes,* 5. C. nigra glabra, abdomine cylindrico: segmentis tribus margine flavis.

187. STOMOXYS. *Haustellum* vagina vniuersalui conuoluta basi geniculata setisque duabus vaginantibus.

*Antennae* setariae.

*morio.* 1. S. atra, thorace antice ferrugineo piloso, alis atris albo maculatis.

*parasita.* 2. S. antennis plumatis grisea, abdomine supra fusco maculis baseos testaceo diaphanis.

*fiberita.* 3. S. antennis plumatis grisea pilosa, abdominis lateribus pallido diaphanis.

*calcitrans* 4. S. antennis subplumatis grisea, pedibus atris.

*irritans.* 5. S. cinerea subpilosa, abdomine nigro maculata.

*pungens.* 6. S. cinereus, femoribus nigris.

Habitat in Europa pecorum dorso inhians Dr. Heisse.

Statura omnino C. irritantis at triplo minor. Corpus totum parum pilosum, obscure cinereum, alis albidis, immaculatis.

*Variat* interdum abdomine obscuriore.

188. MYOPA. *Haustellum* basi medioque geniculatum: *vagina* bivalvi; *valuulis* aequalibus.

*Antennae* clauato acuminatae.

1. M. ferruginea, *abdomine cylindrico incuruo, fronte ferruginea*. Schaeff. Icon. tab. 261. fig. 3.
2. M. ferruginea, *thoracis dorso nigro. testacea*.
3. M. *abdomine cylindrico incuruo, corpore atro. atra*.
4. M. *testacea, abdomine humoso albo fasciato. cincta*.
5. M. *ferruginea, abdomine humoso griseo, facie vesiculari alba, alis nebulosis. buccata*.

189. CVLEX. *Vagina* exserta, *vniualuis, flexilis, setis quinque.*

*Palpi* duo triarticulati.

*Antennae* filiformes.

1. C. *cinereus, abdomine annulis fuscis octo. pipiens.*
2. C. *fusca, abdomine pedibusque albo annulatis, alis annulatus maculatis.*

Habitat Hafniæ in fenestris captus die XVIII. Octobr.

Statura et magnitudo C. pipiens. Rostrum porrectum longitudine dimidii corporis. Caput et thorax fusca, immaculata. Abdomen fuscum segmentorum marginibus albis. Primum segmentum linea dorsali alba. Pedes fuchi albo annulati. Alae hyalinae maculis tribus aut quatuor fuscis.

3. C. *fusca, thorace sublineato. bifurcatus.*
4. C. *flavus, alis hyalinis: costa flavescente, lutescens.*

*haemorrhoidalis.* 5. C. fuscus, abdominis margine apice rufo ciliato.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Gigas in hoc genere. Antennae densissime verticillato pilosae, fuscae, primo articulo nudo, coeruleo nitido. Rostrum inter anterinas porrectum vagina bivalui valuuli obtusis. Seta acuta. Caput fuscum vertice coeruleo, nitidulo. Thorax eleuatus, fuscus margine antico punctoante ante alas, coeruleis, nitidulis. Abdomen fuscum apice planum, margine valde rufo ciliatum. Pedes coerulci, nitidi, femoribus subtus testaceis. Alae albae costa fusca.

*pulicaris.* 6. C. fuscus, alis albis: maculis tribus obscuris.

*reptans.* 7. C. niger, alis hyalinis, pedibus nigris: annulo albo.

*morio.* 8. C. ater, alis albis, femoribus posticis clauatis serratis.

*equinus.* 9. C. abdome fuso, fronte alba.

### 190. EMPIS. *Haustellum* et proboscis inflexa.

*Haustellum* vagina vniualui setisque tribus.

*Palpi* breues, filiformes.

*Antennae* setariae.

*borealis.* 1. E. nigra, alis subrotundis fuso ferrugineis.

*marginta-* 2. E. nigra, alis albis: marginalibus nigris.  
*ta.* Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum, nigrum. Alae magnae albae margine anteriori et postico late nigro.

*pennipes.* 3. E. nigra, pedibus posticis elongatis pennatis.

*forcipata.* 4. E. cinerea, alis oblongis: macula costali nigra, cauda appendiculata.

*maura.* 5. E. nigra tarsis anticis incrassato ouatis.

6. E. liuida, thorace lineato, alis basi pedibusque ferrugineis.

7. E. nigricans, alis costa fusca, pedibus atris: posticis ciliata: quatuor pennatis.

Habitat in Europa.

Statura et magnitudo omnino E. liuidae. Caput parvum nigrum rostro testaceo. Thorax pilosus, nigricans, immaculatus. Abdomen conicum, nigrum, cinereo subpubescent. Alae obscurae costa fuscescente. Pedes atri femoribus tibiisque quatuor posticis vtrinque ciliatis pennatis.

8. E. cinerea, thorace immaculato, pedibus pallidis, alis cinerea: apice fuscescentibus.

9. E. cinerea, rostro, abdominis lateribus pedibusque testaceis, alis maculatis.

10. E. testacea, linea dorsali nigra, alis reticulatis. stercorea.

11. E. atra, pedibus testaceis, alis albis. minuta.

Habitat gregatim in Daniae Agaricis Dom. Lund.

Minuta. Corpus totum atrum, immaculatum pedibus solis testaceis.

191. BOMBYLIVS. *Haustellum* longissimum,  
rectum, setaceum,  
biuale.

*Antennae* subulatae, bâ connatae.

1. B. alis dimidiato nigris sinuatis. maior.

2. B. alis dimidiato nigris aequalibus. aequalis.

3. B. alis fusco punctatis, corpore flavescente postice medius. albo.

- capensis.* 4. B. alis nigro maculatis, corpore cinerascente postice nigro.
- minor.* 5. B. alis immaculatis, corpore flauescente hirto, pedibus testaceis.
- minimus.* 6. B. alis basi fusciscentibus, corpore flauescente hirto, rostro pedibusque nigris.  
Habitat in Germania.  
Corpus B. minor duplo minus totum pilis densis flauescientibus hirtum. Rostrum, antennae, pedes nigrantes. Alae albidae apice parum fusciscentes.
- supreus.* 7. B. nudiusculus niger, thoracis lobo antico fulvo, abdome cupreo: linea dorsali punctorum fuluorum.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Medius. Antennae elongatae basi connatae, nigræ. Rostrum antennis breuius, porrectum, setaceum. Thorax niger lateribus, cupro nitidulis loboque antico tomentoso fulvo. Abdomen cupreum certò situ viridi aeneo nitidulo punctorumque fuluorum linea dorsali. Pedes nigri femoribus subtus pallidis, Alae obscuræ.
- ater.* 8. B. alis basi seminigris ater, abdomine albo maculato.  
Schaeff. Icon. tab. 79. fig. 6.
- maculatus.* 9. B. alis basi nigris ater, thorace antice abdomineque postice albis.
- fuscus.* 10. B. ater immaculatus, alis fuscis.
- griseus.* 11. B. alis albis basi fuscis hirtus, thorace nigro albo lineato, abdomine griseo.  
Habitat in Hispaniae floribus compositis Dom. Vahl.  
Statura omnino B. virescentis. Corpus pilis griseis at minus densis hirtum. Thorax niger lineis duabus dorsalibus albis. Alae albae basi ad marginem crassiorem fuscae punctisque duobus in medio nigris.
- virescens.* 12. B. alis albis immaculatis, corpore hirto virescente, rostro abbreviato.

Habitat in Hispaniae floribus Dom. Vahl.

Rostrum breve vix longitudine capitis. Corpus totum pilis densis virescentibus tectum.

13. B. alis dimidiato punctisque nigris, thorace fusco basi pygmaeus.

14. B. alis albis hirtus cinerascens, capite pedibus atris. *verficolor*.

Habitat in Barbariae floribus compositis Dom. Vahl.

Reliquis duplo minor pilis erectis sparsis tectus. Rostrum porrectum, atrum. Thorax cinerascens immaculatus. Alae albae, immaculatae. Abdomen subrotundum, cinerascens maris macula magna dorsali ferruginea, feminae immaculatum.

192. HIPPOBOSCA. *Haustellum* breve, cylindricum, rectum, biualue valuulis aequalibus.

*Antennae* filiformes.

1. H. alis obtusis, thorace albo variegato, pedibus tetradactylis. *equina*.

2. H. alis obtusis, thorace unicolor. *auicularia*.

3. H. alis subulatis, pedibus hexadactylis. *Hirundinis*.

4. H. alis nullis. *equina*.

193. PYCNOGONVM. *Haustellum* tubulosum canonicum absque setis.  
*Palpi* duo ad basin haustelli.

*Balaenarum*. 1. *P.* palpis duobus, corpore ouato.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 18. fig. 7.

*grossipes*. 2. *P.* palpis quaternis, corpore filiformi, pedibus longissimis.

194. PEDICVLVS. *Haustellum* retractile, recuruum.

*Antennae* — — — —

*luminatus*. 1. *P.* abdomine lobato cinereo.

*pubis*. 2. *P.* abdomine postice emarginato, pedibus chiliformibus.

*ricinoidis*. 3. *P.* abdomine orbiculato: linea alba, scutello trilobo, rostro albo.

*Cameli*. 4. *P.* capite porrecto acuminato ferrugineus, abdomine ouato.

*Cerui*. 5. *P.* Cerui.

*Ouis*. 6. *P.* Ouis Arietis. Linn. Syst. Nat. 2. 1017. 8. Fn. Su. 1945. Red. Exper. tab. 22. fig. 1.

*Bufali*. 7. *P.* flavescentes, striis fuscis obscuris, abdomine taberculatis decem conicis marginalibus.

*Bonis*. 8. *P.* abdomine lineis transuersis octo ferrugineis.

*Vituli*. 9. *P.* abdomine acuminato plumbeo.

*Equi*. 10. *P.* Equi Caballi.

II. P.

- 11. P. capite porrecto obtuso, abdomine ouato fuscō *Ajini.*  
striato.
- 12. P. oblongus, abdomine fuscō: lineis duabus flave- *Vulturis.*  
scentibus.
- 13. P. capite sagittato postice vtrinque mucronato. *Tinnun-*  
*cili.*
- 14. P. abdomine marginato: segmentis vtrinque punctis *Buteonis.*  
duobus impressis.
- 15. P. abdomine ouato albo: margine pedibusque rubris. *Strigis.*
- 16. P. abdomine ouato: margine striato. *Corui.*
- 17. P. abdomine ouato pallido: maculis lateralibus ni- *Cornicis.*  
gris, pupilla alba.
- 18. P. thorace angustato, abdomine ouato pallido dia- *Infausti-*  
phano.
- 19. P. capite obtuso fuscō: punctis quatuor nigris. *Picae.*
- 20. P. albus, abdomine linea dorsali fuscā. *Orioli.*
- 21. P. abdomine oblongo albido fuscō fasciato. *Cuculi.*
- 22. P. capite emarginato, abdomine ouato: margine ni- *Cygni.*  
gro striato.
- 23. P. filiformis pallidus: margine nigro punctato. *Anseris.*
- 24. P. albidus, capite flauescente, corpore elongato. *Mergi.*
- 25. P. elongatus filiformis fuscus, pedibus pallidis. *Procella-*  
*riae.*
- 26. P. ouatus pallidus, thorace lineis duabus fuscis.  
Habitat in Procellaria glaciali Dom. Mohr.  
Magnus, ouatus totus pallidus, thorace solo lineis dua-  
bus postice cœuntibus nigris.
- 27. P. capite obtuso albus, abdominis lateribus nigris. *Diome-*  
*deae.*
- 28. P. capite trigono, abdomine ouato pallido, dorso *Sternæ.*  
longitudinaliter nigricante.

370 CLAS. VIII. ANTLIATA. Pediculus.

- Plataeae* 29. P. Plataeae Leucorodiae. Linn. Syst. Nat. 2. 1019. 22.  
Red. Exp. tab. 4.  
Habitat in Leucorodiis.
- Ardeae.* 30. P. Ardeae cinereae. Linn. Syst. Nat. 2. 1019. 23.  
Red. Exp. tab. 6.  
Habitat in Ardeis.
- Gruis.* 31. P. abdomine subclauato pallido: spiraculis niueis.
- Ciconiae.* 32. P. elongatis filiformis, abdomine albo: lateribus nigro punctatis.
- Charadrii* 33. P. Charadrii pluialis. Linn. Syst. Nat. 2. 1019. 26.  
Red. Exp. tab. 9.  
Habitat in Charadriis.
- Fulicae.* 34. P. Fulicae atrae. Linn. Syst. Nat. 2. 1019. 27.  
Red. Exp. tab. 4.  
Habitat in Fulica atra.
- Recurvirostrae.* 35. P. oblongus fuscus, capite trigono canaliculato.
- Haematoopi.* 36. P. glaucus, thorace angustissimo, abdomine quato: incisuris pallidis.
- Pauonis.* 37. P. capite globo maximo, corpore pallido fuscoque striato.
- Meleagridis.* 38. P. capite trigono obtuso, abdomine ouato griseo.
- Gallinae.* 39. P. thorace capiteque vtrinque mucronatis.
- Phascani.* 40. P. capite ouato magno, abdomine globo maximo obtuso.
- Caponis.* 41. P. abdominis margine nigro.
- Tetraonis* 42. R. Tetraonis Tetricis. Linn. Syst. Nat. 2. 1020. 34. Fn. Sv. 1961. Red. Exp. tab. 14.  
Habitat in Tetraonibus.

43. P. Tetraonis Lagopi. Linn. Syst. Nat. 2. 1020. 35. Fn. *Lagopi*.  
Su. 1962.

Habitat in Tetraone Lagopo.

44. P. corpore filiformi ferrugineo' postice clauato. *Columbae*
45. P. pallide fuscus, abdomine albescente: maculis late- *Emberi-*  
ralibus fuscis, capite triangulo. *zae.*
46. P. corpore ouato, cauda quadriseta. *Pari.*
47. P. capite cordato rufō, abdomine albo basi attenuato. *Motacil-*  
*lae.*
48. P. pallescens, abdomine albo nigro maculato. *Hirundi-*  
*nis.*
49. P. sanguineus, pedibus albis. *Gryllo-*  
*talpae.*
50. P. filiformis, ferrugineus. *Apis.*

195. ACARVS. *Haustellum* vagina biualui, cy-  
lindrica.

*Palpi* duo longitudine hau-  
stelli.

*Antennae* filiformes.

1. A. orbicularis depresso liuidus: macula basos ouata *Elephan-*  
*ninus.*  
nigra.
2. A. globoso ouatus: macula baseos rotunda, antennis *Riccinus.*  
clauatis.
3. A. obouatus planus: macula baseos obouata. *Reduuius.*
4. A. ouatus fuscus, antennis pedibusque pallidis. *pallipes.*
5. A. ouatus niger, pedibus ferrugineis: peniculis albis. *Hispanus.*

Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

Maior A. sanguisugo. Antennae breves extorsum cras-  
fiores. Corpus planum, ouatum, nigrum pedibus  
omnibus ferrugineis geniculis albis.

*sanguisugus.* 6. A. ouatus planus niger, abdomine ferrugineo, anten-  
nis clauatis.

*aegyptius* 7. A. obouatus niger, margine albo.

*vndatus.* 8. A. orbiculatus ater, lateribus vndato albis: puncto  
nigro.

*lippiensis.* 9. A. ouatus fuscus: margine incrassato.

*Iguanae.* 10. A. ouatus planus aureo maculatus, abdominis margi-  
ne striato crenato.

*cajennen-* 11. A. ouatus planus griseo alboque varius: margine po-  
*sis.* stico elevato striato.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo A. aegyptii. Rostrum porrectum,  
plenum cum antennis griseum, immaculatum. Cor-  
pus rotundatum, plenum, griseum linea ante mar-  
ginem, duabus dorsalibus abbreviatis atomisque plu-  
rimis indistinctis albis. Margo posterior lineis ele-  
vatis decem obscurioribus striatus. Pedes octo grisei  
immaculati.

*lineatus.* 12. A. ouatus ferrugineus: lineis duabus vndatis albis.

*aureola-* 13. A. obouatus fuscus: lineolis duabus maculaque posti-  
*tus.* ca palmata viridi aureis.

*holzatus.* 14. A. ouatus planus ferrugineus, thorace fuso.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Statura et magnitudo praecedentium. Corpus totum  
ferrugineum thorace solo fuso. Pedes obscuriores.

*indus.* 15. A. oualis ferrugineus: macula baseos ouata atra.

*america-* 16. A. obouatus rubicundus, scutello geniculisque pe-  
*nus.* dum albis.

*vibrans.* 17. A. subrotundus testaceus immaculatus, pedibus anti-  
cis longioribus.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Minutus. Corpus rotundatum, plenum, testaceum,  
immaculatum, Pedes concolores anticis longioribus.

18. A. pedibus secundi paris longissimis. *crassipes.*
19. A. thorace angulato cruciato, pedibus vnguiculatis corpore longioribus. *Vespertilionis.*
20. A. femoribus tertii paris crassissimis. *passerinus*
21. A. flauus pedibus primi paris longissimis motatoriis. *motatorius.*
22. A. ater, lateribus angulato acutis. *coleoptratus.*
23. A. ruber, pedibus primis longissimis cursoriis, ab domine postice bicorni. *aphidioides.*
24. A. rubicundo hyalinus, abdomine vtrinque macula fusca. *telarius.*
25. A. albidus, femoribus capiteque ferrugineis, abdome setoso. *Siro.*
26. A. albus, pedibus rufescens: posticis quatuor seta longissima. *Scabiei.*
27. A. abdomine ouato obtuso postice setis quatuor longitudine corporis declinatis. *lattis.*
28. A. pedibus setis duabus, abdominis ouati postico setis quatuor longitudine corporis horizontalibus. *dysenteriae.*
29. A. niger, senorum geniculis subglobosis. *geniculatus.*
30. A. abdomine distento rubro: lateribus obscurioribus. *baccarum*
31. A. subrotundus albidus, abdomine rufo. *Zosterae.*
32. A. abdomine rufo, pedibus posticis longissimis filiformibus. *Muscarum.*
33. A. sanguineus scabriusculus, pedibus anterioribus longitudine corporis. Linn Syst. Nat. 2. 1026. 25.  
Habitat in Americae Batatas.
34. A. abdomine rubro: vtrinque punctis binis coccinels. *Gynnopterorum*
35. A. ouatus rufus, ano albicante. *Coleoptrato-*
36. A. rum.

- Phalan-* 36. A. ouatus ruber, rostro porrecto, pedibus longioribus.
- gii.*
- Phaeton-* 37. A. ouatus postice acuminatus, pedibus apice fasciculatis.
- rupestris.* 38. A. fuscus, linea dorsali bicolore.
- longicor-* 39. A. ruber, antennis bifidis rostro longioribus.
- nis.*
- litoralis.* 40. A. ouatus ruber, rostro porrecto subulato.
- Fucorum,* 41. A. palliatus, lineis duabus flexuosis nigris, pedibus posticis brevissimis incuruis.
- Fungo-* 42. A. fusco rufescens, abdome subgloboso glabro im-
- rum.* maculato.
- Tremellae* 43. A. subglobosus atro coeruleescens.
- salicinus.* 44. A. ruber, linea dorsali duplii fusca antice bifurca.
- croceus.* 45. A. fuluus, thoracis lateribus puncto rufo.
-

# A P P E N D I X.

# THE CUMBERLAND

WEEKLY JOURNAL OF  
POLITICS, LITERATURE,  
SCIENCE, AND  
ART.

EDITED BY  
JOHN D. COOPER,  
AND PUBLISHED  
AT THE CUMBERLAND,  
IN THE STATE OF PENNSYLVANIA.

PRICE, FIVE DOLLARS  
PER ANNUM.  
VOL. I.—NO. 1.

PRINTED AND PUBLISHED  
BY JOHN D. COOPER,  
AT THE CUMBERLAND,  
PA.

RECEIVED  
JULY 1, 1833.

THE CUMBERLAND,  
PA.

77 — 78. SCARABAEVS scutellatus muticus rufus, capite thoraceque linea carinata elevata. *Veter.*

Habitat in India orientali Dom. Vahl.

Magnitudo Sc. Cephi. Capitis clypeus angulatus, rufus margine lineaque transuersa abbreviata eleuata nigris. Thorax rufus antice lineola transuersa eleuata tuberculisque duobus. Pectus hirtum. Elytra striata, rufa.

125 — 26. SCARABAEVS exscutellatus, thorace subinermi aeneo, occipite cornubus duobus arcuatis, elytris testaceis. *Gazella.*

Habitat — — — — Dom. Lund.

Statura et magnitudo omnino Sc. Tauri. Clypeus rotundatus, niger margine reflexo, integro. In medio stria transuersa, eleuata et pone hanc cornua duo elongata, arcuata. Thorax denticulis duobus anticis paruis vix distinctis, obscure aeneus margine pallescente postice rotundatus. Elytra striata testacea futura aenea. Corpus testaceum nigro maculatum. Femora testacea puncto nigro.

3 — 4. TRICHIUS testaceus, capite thoraceque aeneo gutta nitidulis, abdominis ultimo segmento prominulo bisetato.

Habitat in China Dr. Pflug.

Statura Melolonthae, at huius generis. Caput viridi aeneum ore testaceo. Thorax mox testaceus, viridi nitidus, mox omnino aeneus margine testaceo. Scutellum triangulum, viridi aeneum. Elytra striata, testacea. Corpus testaceum, cinereo villosum, ab domi-

dominis ultimo segmento prominulo punctis duobus albis.

*pallipes.* 18. 19. DERMESTES oblongus planus ater nitidus, antennis pedibusque testaceis.

Habitat in Sueciae floribus Dom. de Paykull.

Minutus totus ater, nitidus. Thorax laevis. Elytra striata. Antennae et pedes testacei.

*lunata.* 18. 19. DERMETES oblongus niger, elytris lunula dorsali cinerea.

Habitat in Suecia sub arborum corticibus Dom. de Paykull.

Statura parua praecedentium. Totus niger, obscurus. Coleoptera lunulis duabus connatis communibus in medio dorfi cinereis.

*capense.* 3 — 4. ANOBIVM ferrugineum, elytris striatis pallidioribus.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lund.

Statura omnino A. pertinacis at duplo minus et aliud. Corpus totum obscure ferrugineum elytris solis paulo pallidioribus, striatis.

*luteum.* 3 — 4. SPHAERIDIVM luteum, elytris pubescentibus laeuiibus.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Statura omnino praecedentium. Corpus totum luteum elytris pubescentibus haud striatis.

*haemorrhoidalis.* 5 — 6. IPS rufa, elytris nigris apice rufis.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Statura et suuima affinitas I. rufipes, at corpus totum rufum exceptis elytris solis nigris apice rufis.

*dentata.* 12 — 13. HISPA antennis filiformibus nigra, thoracis margine, elytrorum ferratorum macula baseos fascia que media flavis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino praecedentis. Caput cum antennis nigri. Thorax niger lateribus late flavis. Elytra ferrata denticulis duobus porrectis longioribus, sulcata, nigra macula baseos suturam haud attingente fasciaque media flavis. Pectus et abdominis basis flava.

12. 13. HISPA antennis fusiformibus flava, capite thoracis linea dorsali elytrorumque margine sinuato nigris. *angulata.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Caput cum antennis nigrum, immaculatum. Thorax flavis linea dorsali nigra. Elytra sulcata, flava margine sinuato nigro, et in hoc margine pone medium punctum flavum, apice truncata, dentata dente exteriori maiori, validiori angulata. Corpus subtus ferrugineum,

- 5 — 6. OPATHRVM nigrum, elytris striatis: striis punctatis. *clathratum.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium at distinctum elytrorum striis punctatis impressis.

51. 2. COCCINELLA coleoptris fulvis: punctis duodecim lunulisque vtrinque duabus connatis albis. *12 guttae.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Corpus medium, rufum. Thorax rufus vtrinque macula magna alba. Elytra rufa puncto ad scutellum lunulisque duabus connatis baseos, et versus apicem puncta quinque 3. 2. alba.

- 58 — 9. COCCINELLA. villosa nigra, elytrorum marginibus flavis. *villofa.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Corpus magnum pilis brevibus densis villosum. Caput, et thorax obscura. Elytra punctato striata, nigra margine et sutura flavis. Pedes nigri.

- 21 — 2. CASSIDA brunnea albo marginata, elytris nigro maculatis basi vnituberculatis. *bituberculata.*

Habi-

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

**A**ttinis C. tuberculatae at duplo minor. Antennae pallidae apice nigrae. Thorax flavescentis margine pallido. Elytra brunnea punctis duobus nigris, anteriori maiori transuerso. Margo pallidus. Corpus nigrum margine pallido. Pedes pallidi.

*taurus.* 29 — 30. CASSIDA atra, elytris angulo antico spina truncata.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino C. bicornis at paullo minor. Caput, thorax, corpus atra aeneo paullo nitida. Elytra atra punctis impressis reticulata angulo antico spina valida truncata.

*retiformis.* 38. 9. CASSIDA nigra, thorace bimaculato, elytris flavis nigro reticulatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Corpus, antennae, pedes nigra. Clypeus niger maculis duabus magnis flavescentibus. Elytra flavescentia margine omni strigisque interruptis fere reticulatis nigris.

*pallidata.* 43. 4. CASSIDA nigra thorace villoso virescente, elytris viridibus: margine lineaque media ferrugineis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Media. Antennae longitudine corporis uti totum corpus nigrae. Thorax subvillosus, minime nitidus, virescente, immaculatus. Elytra viridia margine exteriori sutura dimidiata lineaque disci sanguineis. Pedes atri.

*cuprea.* 45. 6. CASSIDA supra cuprea, thoracis margine elytris que maculis duabus marginalibus rufis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Media. Corpus cum antennis pedibusque atrum. Thorax obscure cupreus margine rufescente. Elytra punctata viridi cuprea maculis duabus marginalibus rufis apice magis laevia.

28.—9. CRIOCERIS cyanea, elytris flauis: maculis duas fucata-  
bus cyaneis.

Habitat in Insula St. Bartholomaei Americes Dom. de  
Paykull.

Statura praecedentium. Caput fuscum antennis flauis.  
Thorax rotundatus, cyaneus, immaculatus. Elytra  
glabra, nitida flava maculis duabus magnis cyaneis.  
Corpus cyaneum abdomine flauo. Pedes obscuri fe-  
moribus cyaneis.

39. 40. CVRCVLIO longirostris femoribus dentatis fu- frigidus,  
scus, elytris striatis subtuberculatis ferrugineo variis.

Habitat in Amboina Dom. de Paykull.

Medius statura praecedentium. Caput fuscum puncto  
ferrugineo ad basin rostri lineaque dorsali albida.  
Thorax rotundatus niger linea dorsali punctoque  
vno alteroue ferrugineis. Elytra punetato striata,  
subtuberculata, nigra, ferrugineo varia, qui color fa-  
scias tres constituit. Pedes pallescentes femoribus  
dentatis.

161. 2. C. breui rostris nigro aeneus, rostro piano pedi- fuluiro-],  
busque flavescentibus. friss.

Habitat in Scania Dom. de Paykull.

Paruus. Rostrum planum, depresso, flavescent. An-  
tennae extorsum crassiores, nigrae, basi flavescentes.  
Thorax, elytra, corpus aeneo nitidula. Pedes  
flavi.

99. 100. ICHNEVMON ater, abdomine compresso: seg- compres-  
mentorum marginibus flauis, antennis pedibusque fus.  
luteis.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Affinis I. variegator. Antennae flavae, articulo primo  
ultimo nigri. Caput et thorax atra, immacula-  
ta. Abdomen compressum, breve, atrum, segmen-  
torum marginibus flavescentibus. Alae albidae. Pe-  
des lutei femoribus omnibus basi, posticis totis nigris.

47. 8. PHALAEVA pectinicornis, alis concoloribus stria- coruaria.  
tis atris apice albis.

Habi-

Habitat in America meridionali Dom. de Paykull.

Media. Statura praecedentium. Antennae nigrae valde pectinatae. Corpus nigrum pectore gulaque ferrugineo lirtis. Alae neruis striatae nigrae omnibus apice albis.

*populana*. 30 — 1. PYRALIS alis anticis fuscis apice auro argentoque strigosis: macula dorsali alba; puncto fusco.

Habitat in Sueciae Populo Dom. de Paykull.

Affinis P. Jaquinianae videtur. Corpus fuscum. Alae anticae basi cinereo fuscæ, immaculatae. In medio dorsi macula magna communis triangularis alba puncto medio fuso, apice auro argentoque strigosæ punctis costalibus albis.


*ferrugatus*. 39 — 40. CIMEX thorace acute spinoso supra griseus, capite spinisque nigris, abdomine ferrugineo.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Medius. Caput nigrum antennis pallidis primo ultimo que articulo nigro. Thorax griseus margine tenuissime flavo spinisque acutis, elongatis nigris. Scutellum obscurum apice flavescentis. Elytra grisea sive pallida punctis numerosis fuscis. Alae albidae arcu apicis fuso. Abdomen ferrugineum. Pedes fusi.



Icanthia	—	278.
Acarus	—	371
Alucita	—	257.
Anthrax		
Aphis	—	314.
Atilius.	—	358.
Bibio	—	328.
Bombylius	—	365.
Bombyx.	—	108.
Ceropis	—	273.
Ceria		
Chermes	—	367.
Cicada	—	268.
Cimex	—	280
Coccus	—	318
Conops	—	361
Coreus		
Coffus		
Culex	—	363
Cytherea		
Empis	—	364.
Fulgora	—	260.
Gerris		
Hepialus	—	134.
Hesperia		
Hyblaea		
Hippobosca.	—	367.
Lygaeus		
Membracis	—	262.
Miris		
Musca	—	342.
Midas		
Mylopa	—	363
Naucaris	—	277.
Nemotelus		
Nepa	—	276.
Notonecta	—	275.
Noctua	—	135.
Nymphon		
Oestrus.	—	321
Papilio	—	7.
Pediculus	—	368.
Phalaena	—	184.
Pterophorus	—	258.
Pulex	—	314.
Ranunculus	—	368.
Pyralis.	—	224.
Ranatra		
Redunus	—	307
Rhagio	—	332.
Rhingia.	—	357.
Sesia	—	98
Sigara	—	26.
Sphinx	—	92.
Stomoxys	—	362.
Stratiomya	—	330.
Syrphus	—	334.
Tabanus	—	357.
Tettigonia	—	265.
Tinea	—	240.
Tipula	—	321.
Trips	—	320.
Volucella		
Zygaena.	—	107



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
فَلَمَّا دَعَاهُ الْمُؤْمِنُونَ

